F. x. f
18
28,391/B/2

FRIDERICI HENNING
MEDICINAE DOCTORIS ET PRACTICI BARDENSIS

ANALECTA LITTERARIA EPILEPSIAM SPECTANTIA.

Multorum diſce exemplo, quae facta ſequaris,
Quae fugias! — —

Cato.

LIPSIAE,
APUD HENRICUM GRAEFF
MDCCXCVIII.

PROOEMIUM.

Ille profecto, qui ſub docti meditantisve medici nomine circumferri velit, inter alia et hiſtoriae medicinae in omnibus partibus conſideratae accuratiſſimum non poteſt non impendere ſtudium; quoniam haec ſola, quae cuivis ſaeculo accepta referenda ſint, juſte dijudicat atque metitur; nec non quanta unicuique ſaeculo, auctori et inventori merita ſint tribuenda, quot et quanti pretii noſtra aetas fecerit progreſſus, ad unguem ſatis demonſtrat et exponit. Defendet nos eâdem cura ab eo, quod veteres nunquam erraſſe putemus, nosque impediet, ne nobis nimis indulgentes majorum opera ludibrio habeamus. Quamobrem quivis medicus, qui, ſanae philoſophiae alumnus, obſcura hujus doctrinae illuſtrare et ex variis ejus commutationibus hiſtoriae humanae ſcientiae materiam ſuppeditare ſtudet, omnia maxima qua poteſt animi gratitudine accipiet, quae praeteritorum ſaeculorum ſtudia nobis ad hanc diſciplinam illuſtrandam praebent emolumenta.

Quae ſi negari non poſſunt, nonnulla huc illuc de hacce materia collecta in chartam conjicere atque in lucem emittere non pudet; nec pudet, haec mea compilata nominare.

Sint enim ſententiae de compilationis pretio a pluribus doctis illuſtribusque viris datae, quorum Baldingerum Grunerumque nominare ſufficiat — ſint, inquam, mihi

palladio, propugnaculo! Ego enim non alienus ſum ab eorum ſententia, qui bonas compilationes ad hiſtoriam noſtrae ſcientiae illuſtrandam eoque facilius intelligendam nonnihil tribuere arbitrantur: conſentio illis, quum bonum compilatorem non modo mechanice agere, ſed quoque materiam pertractandam neceſſario rite cognoſcere et perſpicere jubeant. Itaque, qui ad hoc munus ſuscipiendum his armis paratus eſt vir, hercle riſu et cavillatione docti, quod dicunt, publici non dignus eſt; praeſertim, ſi opera et diligentia ſingulari in priorum temporum ſcriptis perſcrutandis verſatur, et exinde, quae ad rem ſuam pertinent, non modo trahere, ſed etiam in ordinem ſyſtematicum ita redigere ſtudet, ut quivis artis peritus totum hoc opus, et quaenam ex illo ſequuntur, eo facilius perſpicere poſſit. Nec tamen hoc meum opuſculum boni compilatoris imaginem fronti praefixam habere, affirmare audeam, ſed potius juſtis Tribunalis publici ſuffragiis illud dijudicandum ſubjiciam. Ego enim ſum ille, ex quo, licet forſan non omni ad hanc rem propria facultate deſtituto, quia amplae mihi non patent Bibliothecae, opus omnibus numeris abſolutum non exſpectandum confiteor. Ideoque, lectores benevoli, aura lenitatis ac facilitatis Veſtrae haec mea, quae Vobis tradere poſſum tantum pauca, adjuvare haud dedignemini, et quisque utinam Veſtrûm pro ingenio et animo non nihil inveniat, quod magis exponere et provehere ſibi proponat!

„Votum Averrhois et Cratonis, ut noſſent epilepſiae cauſam „et remedium, adhucdum eſt votum medicorum.“

Boissier de Sauvages.

Quod effatum hanc materiam mihi vindicatam contra adverſarios infeſtos defendat! Nec hodie, quae ad originem, decur-

decurſum et medelam hujus morbi pertinent, ita enucleata et diſtincta ſunt, ut non potius, quidquid hoc nomine prodeſſe poſſet, dignum ſit votis noſtris et omnia ejusmodi tentamina noſtro adjumento et auxilio ſint digna. Nemo igitur me vituperabit, quod, diſſertatione mea inaugurali — ſiſt. Analecta hiſtorica ad theoriam epilepſiae. Gryphiae 1788. — publico olim aſſenſu celebrata *), filum iſtius diſſertationis quaſi retexere, ex integro quaſi vires recipere atque in longiorem hujus materiae campum excurrere mihi propoſuerim. Sed quamquam in iſta, quam indigitavi, disputatione, nonnulla ad variorum de epilepſia ſcriptorum definitiones adjecerim critica, hîc, quum non niſi compilandi animus eſt, non judicandum eſſe mihi viſus ſum, ideoque conſulto non ipſe judicavi et quidem eo magis, quia commentis meis ineſſe poſſet nil niſi, quod unicuique meditanti et experto, quem ſolum hîc recogito, medico per ſe ipſum jam liquet. Si autem forſan tempus procedens alia aliaque lugendi hujus morbi obſervanda mihi praebeat et judicium meum cum theoreticum tum practicum magisematureſcat atque ſe excolat: feliciora et utiliora non dubito fore mea practica de hac vel illa hypotheſi commenta; quin tutior ſane erit via, qua incedam hoc vel illud celebratum remedium dijudicaturus, atque ſcriptorum in fine libri adhibitorum dignitatem et utilitatem ſecundum expertas artis criticae regulas ſignificaturus, indicaturus.

Lectoribus meis falſa obtruderem affirmando, me ipſum omnia huc illuc allegata ſcripta legiſſe et omnia citata ex

*) vid. Allgem. Litter. Zeit. 1788. p. 231.
Baldinger's medic. u. phyſ. Journ. St. 27. p. 52.
Stark's Archiv für Geburtsh. B. I. St. 4. p. 170.

ex primis fontibus hauſiſſe; quod enim ne ullus quidem compilatorum vere de ſe praedicet. Quantum vero fieri poterat, perlegendis et comparandis aliis ſcriptis me dedi, ut hoc opuſculum iſta, qua non immerito quaevis compilatio inſtructa ſit, diligentia exaratum ederem. Attamen ubi non ſolum citata, ſed etiam eorum propria adhaerendi poteſtas fuit, verbis parentheſi incluſis pro fine mea tantum attingere conatus ſum.

In oeconomia totius operis vel typographica Celeberrimi Ploucqueti Repertorium, exemplar ſua laude non defraudandum ante oculos habui. Quae licet nimias forſan impleat plagas, oculis tamen celeriter perluſtrantibus non poteſt non eſſe magno adjumento.

Ex etymologica quidem hujus operis parte ad medicum fateor practicum nullum redundaturum eſſe uſum; litteraturae vero cultor non dedignetur, quod illam hic in chartam conjecerim.

Quod ſi animus ſit mihi objurgandi, me cauſſas epilepſiae remotas in juſtas non redegiſſe claſſes, nullo partium ſtudio captus fateor, omnes hucusque tentatas claſſificationes logicis principiis haud accommodatas, easdemque difficultatibus mihi videri expoſitas, quas tantummodo ille aliquando vincat, qui juſtam et naturae cujusvis morbi et naturae effectusque omnium irritamentorum cauſalium ſibi conciliaverit notionem, qua deficiente judicis competentis munere fungi nemo valet. Unumquemque vero artis peritum hanc cauſarum ſeriem non omnino a natura rei alienam, nec non diverſis ſyſtematibus adaptatam invenire, etiam atque etiam velim et putem.

Caeterum in hoc opere et epilepſiam proprie ſic dictam et eclampſiam uno tenore ſimulque tractavi, quia haec diſtin-

ctio

ctio ad alias aliasque deducit devias et quoniam in aliis morbis recenſendis τὰ acuta et τὰ chronica ſaepius diſtinguendi gratia audiuntur, quibus — ſi quid judicem — et hîc non immerito forſan uti liceat.

Brevi porro in fine pathologicae partis adhibito obſervatorum, ex epilepticorum corporum ſectionibus redundatorum, conſpectu me medicorum uſibus non male inſerviiſſe arbitror.

Therapeutica hujus morbi et olim et hodie laudata remedia, ut facilius ſint conſpicua, ex ordine litterarum vulgari commemoravi et quidem τὰ ſimplicia magna ex parte ſub iſtis, quibus in prioribus Syſtematis Linnaeani editionibus audiuntur nominibus, omnibus medicis ſane notis, vel eo potius commemoravi, quo magis recentiorum in hiſtoriâ naturali diſtinctiones et nomina adhucdum inter ſe diſſentiunt. Arcana, ſpecifica, et alia compoſita antepileptica ſub inventorum nominibus poſita, ubi fieri poterat, artem illa praeparandi in eorum comitatu habent. Longiorem forſan me in allegandis, quae olim laudabantur, remediis, finis hujus ſcripti defendat! Quae enim de novis remediis memoratu ſunt digna, uniuscujusque medici animo magis obverſantur, eademque facillime perſcrutari quivis poteſt. Quae majores experti ſunt, diligentius ſunt colligenda, ne tempore rapaci deleatur, quidquid ex iis forſan granulorum inſtar aureorum noſtra cura et diligentia ſit dignum. Sunt, fateor, quae huc illuc occurrunt, Obſoleta, Superſtitioſa etc. deridenda, nec tamen neminem me vituperaturum puto, quod illa commemoravi; forma enim et uſus eorum priſtini temporis genium et hodie non ubique exſtinctum nobis adumbrant. Caeteroquin cuivis medico vel gaudio vel dolori ſit audire, quod multa hodie laudata remedia jam priſcis temporibus,

alia

alia forſan forma induta, maxime in deliciis fuerint, quorum exempla — Columbae applicatio externa et Aſini ſanguis — hoc probabunt.

Chronologicum iſtarum, quae de epilepſia editae ſunt, monographiarum indicem magna ex parte Bibliothecae practicae Hallerianae acceptum refero et huc illuc non nihil de meis ipſe adjeci. Interdum forſan unam eandemque diſſertationem uno eodemque ſub anno collocatam duplici loco et ſub praeſidis et reſpondentis nomine a me eſſe receptam haud negare velim, quum, denegato mihi ſaepius iſtius ſcriptiunculae aſpectu et variante citatorum modo, non ſemper hoc ſat ſatis diſtinguere mihi licuerit.

Verum enim vero, Lectores benevoli, ne nimis veſtra abuti videar patientia, vela praefationis meae hîc contraham pedemque hîc figam, favori et benevolentiae veſtrae me commendaturus. Tantummodo in votis mihi eſt, ut haecce collectio unum alterumve Hippocraticae artis cultorem ad lugendi hujus morbi feliciorem provehat medelam et cuidam futuro hujus morbi illuſtratori quamdam, etſi exilem, offerat ſymbolam! En jam, Lectores benevoli, quae opuſculo meo praemittenda judicavi, ut benignum aſſequerer judicem. Valete faveteque mihi. Dabam Bardiae VIII. Iduum Januarii. MDCCXCVIII.

PARS I.

PARS I.

Etymologica.

Cfr. Bebelii (Henr.) nomenclatura morborum corporis humani graecolatina, quae prodiit cum aliis Ejusd. opp. Argentorat. 1513. 4.

Dietrichii (Joh. Conrad.) Jatropheum hippocraticum, p. 452.

Analempſia v. Epilentia. (citat. e Barthol. Anglico.)

Analepſia a Riverio paſſim nominatur.

Apoplexia parva a Conſtantino medico teſte Barth. Anglic. de propriet. rerum L. VII. cap. IX.

Aſtralis morbus apud

Paracelſ. de morb. caduc. Lib. III. §. 3.

putabatur enim ab aſtrorum conjunctione dependere. vid.

Foreſt. Obſervat. Lib. X. obſ. 60.

Hartmann. introd. in Philoſ. vital. p. 19 et 32.

et ab ſingulis aſtris vid.

Ganivet. amic. medicor. Frfrt. 1614. p. 266. (a Mercurio.)

Cadiva gutta.

Vita St. Praejecti, Lib. II.

Caducus morbus. (a repentino epilepticorum in terram caſu.)

Barthol. de Moor (in Pathologia Cerebri, Amſtelod. 1703. pag. 362.) diſtinguit morbum caducum ab epilepſia, ſub illo intelligens morbum habitualem, ſub hac ſymptomaticas ejus ſpecies.

Cadux paſſio.

Alexand. Jatroſoph. L. I.

Catalempſia v. Epilentia. (citat. e Barth. Anglico.)

Comitialis morbus jam apud Plinium Lib. VIII. 32. ſ. 50. et Celſum L. III. cap. 23.

Seu, quod in comitiis aliisque hominum congregationibus illo morbo laborantes maxime infeſtarentur, ſeu, quod comitia, in quibus aliquis epilepticus cecidiſſet, dirimerentur, quod ſuo ſuffragio etiam confirmat *Quint. Seren. Sammonicus* p. 162.

Eſt ſubiti ſpecies morbi, cui nomen ab illo eſt,
Quod fieri nobis ſuffragia juſto recuſet:
Saepe etenim membris acri languore caducis
Concilium populi Labes horrenda diremit.

Pro ſiniſtro enim habebatur omine ſecundum

Vincent. Alſarium a Cruce de epilepſ. L. IV. Sect. I.

Seu, quia iſte morbus eo infeſtatum a comitiis excludebat.

Seneca, de Ira L. III. 2.

Duretus ab omnibus differt, illamque rationem vult, quod in concionibus publicis propter metum oratoribus identidem eveniat.

Convivalis morbus, quia paroxyſmus in conviviis facile recurrere ſolet.

Langii oper. medic. pract. T. III. p. 58.

Deifica lues,
Divinus morbus } ab Apulejo et Platone,

quia creditur, hunc morbum a numine quodam aut daemone eſſe demiſſum, contra quam opinionem jam multa philoſophatur Autor libri pſeudohippocratici de morbo ſacro.

Cfr. Hieron. Tacquet et Bonaventura Hachette, non ergo in Epilepſia θεῖον τι. Pariſiis 1598.

Eclactiſma ſ. *Eclactiſmus* denotat eclampſiam incipientem, ſeu agitationem iſtam, qua infantes exiliunt et calcitrant propter nervorum et cerebri irritationem, qua voce jam uſus eſt

Hippocrates Coac. Lib. III. aph. 35.

Crf. J. Gorraei Definition. L. XXIII.

Eclampſia denotat epilepſiam acutam.

Eclam-

Eclampſis.

vid. J. Gorraei Definition. l. c.

Epilemticus morbus.

Alexand. Jatroſoph. L. I. cap. 8.

Epilencia in Gloſſario quodam latino-gallico. vid.

Onomatol. med. pract. T. I. p. 2439.

Epilenſia.

Aegidius Corborienſis in *Mſcr. Carm.* de medicamentorum virtutibus. v. Onom. med. pract. T. I. p. 2440.

Epilenſis in *Capitulis general.* Sanct. Victoris Maſſilienſis. (Mſcr.) v. Onom. med. pr. l. c.

Epilentia.

Ugotio v. Onomat. med. pr. T. I. p. 2439.

Barthol. Anglicus de proprietatibus rerum Lib. VII. cap. IX. ubi ſequentia invenies:

„Epilentia fit in capite ex materia exiſtente in cerebro;

Analempſia vero fit ex materia exiſtente in ſtomacho, non in cavitate, ſed in arteriis et nervis ipſius ſtomachi, per quorum medietatem materia ebulliens rapitur ad cerebrum;

Catalempſia vero fit ex materia exiſtente in extremitatibus, ut in manibus et pedibus, quae propriis quidem ſignis dignoſcitur."

Epilentica paſſio.

Bernard. a Breidenbach itinerar. hieroſolymit. p. 106.

Epilenticus morbus.

Du Cange Gloſſarium, p. 97.

Epilentiſcus morbus.

Sanct. Odonis Legenda de Sancto Geraldo L. IV. cap. 8.

Epilepſia, e graeca lingua ortum trahens et Hippocrati II. aphor. 45. III. aphor. 29. et alibi jam uſitatum nomen. Ab ἐπιλαμβάνω, (prehendo, invado,) quia morbus iſte ex improviſo hominem invadat aut prehendat. vid.

Thom. Burnet Hippocrates contractus, Edinburg. 1685. 12. Lib. V. ſect. 4.

Non ab ἐπὶ et laedo, ut latino-barbari putarunt.

Foedus morbus (αἰσχρὸς νοῦσος).

Galen. de loc. affect. Lib. III.

Herculeus ſ. *Heracleus morbus* (Ἡρακλεῖος νοῦσος).

Lib. pſeudohippocr. de morb. mulier. Lib. I. S. XVII. 6.

non confundendus cum mania, cui ſecundum Erotianum idem nomen ſaepius datum eſt. Hocce autem nomine vocatur epilepſia, *aut* propter vehementiam et difficilem ejus curationem.

Galen. comm. in L. VI. Epidem. Ed. Chart. T. IX. p. 550.

quem locum Hippocratis etſi non plane clarum eodem tamen modo jam declarat

Alexander Trallian. Lib. I. cap. 15. Opp. ed. Guinth. Andernac. Baſil. 1556. 8. p. 62.

aut, quia Herculem eo correptum fuiſſe putant, quod demonſtrari videtur ex loco quodam

Sophocl. Trachin. V. 797.

Cfr. Ariſtotel. Problemat. Sect. XXX. Quaeſt. I.

Andr. Reyheri Theatrum Romano-teutonicum, ſub voce: Comitialis.

aut, quia herculeo opus eſt robore, ut aegroti paroxyſmi tempore teneantur. (*διὰ τὸ δυσκαταμάχητον.* Galen. l. c.)

Ger. van Swieten Comment. in Boerh. Aphor. ed. Hilpershuſ. T. III. p. 391.

Infantilis ſ. *puerilis morbus* (*παιδίων νόσημα*), quia huic aetati frequentior.

Hippocr. de aëre, loc. et aqu. ed. Chart. T. VI. p. 190.

Paul. Aeginet. L. III. cap. XIII. p. 29.

Inſputatus morbus, quia epilepticos inſputare ſoliti erant veteres. vid.

Plaut. Captiv. Act. III. Scen. 4.

Plin. Hiſt. nat. Lib. XXVIII. cap. 4. ubi ſequentia verba legis: Ita deſpuimus comitiales morbos, hoc eſt, contagia regerimus.

Cur veteres in epilepticos exſpuerunt? vid.

Camerarii Syllog. memorab. medic. Cent. XVI. part. 12.

Plura de hac re videas in

Wolfg. Wedel Pr. de morb. inſputato. Jenae 1687.

Ejusd. Exercit. med. philolog. ſacr. et profan. Dec. IV. exercit. 8

D. Er-

D. Erneſt. Lud. Nebel epiſt. gratul. ad illuſtr. Thôn de morbis veterum obſcuris. Gieſſae 1794. 8.

Johannis (Sti.) Morbus: ob vires medicatrices Sancto Johanni tributas:

Du Cange. vid. Onomat. med. pract. T. I. p. 95.

aut, quia veteres Catholici morbi originem iratis Sanctis tribuebant, quam opinionem profert

Joh. Storch v. d. Kinderkhten. B. II. Eyſenach 1750. 8. p. 69.

Lunaticus morbus. Eo, quod ad lunae phaſes commoveatur;

Aretaeus de cauſ. et ſign. morb. L. I. cap. 4.

ſeu, quia tempore interlunii nati huic morbo magis obnoxii judicentur.

Alexand. Trallian. L. I. cap. 15.

Fr. Hofmann inſtitut. L. III. cap. 88.

Lunaticorum in ſacris bibliis (e. g. Matthaei IV. 24. et XVII. 15.) nominatorum morbum veram fuiſſe epilepſiam elucere videtur e Marc. IX. 18. Luc. IX. 39.

Major morbus, (μέγας. Hippocr.) ob vehementiam ita vocatus.

Celſus de re medic. L. III. cap. 28.

Mater puerorum, vocatur a Schneidero. Oritur ex arabico idiomate, quo vocatur Alferetia. Marcus Mironius autem putat, matrem puerorum apud Arabes eſſe ſpasmum ex exinanitione.

Marc. Mironii L. II. de infantibus. Turon. 1553. fol.

Menſalis morbus, vid. *Convivalis morbus.*

Peditio: quia pedes in paroxyſmo inordinate moveantur.

Avicenna Lib. de Epilepſia.

C. Gaulken D. de Epilepſia. Erford. 1693.

Primus morbus, vocatur a Lucretio.

Puerilis morbus, vid. *Infantilis.*

Sacer morbus (ἱερὴ νοῦσος), non confundendus cum alio morbo ſacro dicto, qui et Ignis Sti. Antonii vocatur, de quo vid.

Hiſtoire de la Societé royale de Medecine à Paris, 1776. Tom. II. p. 260. ſqu.

Samml. der gemeinnütz. Auffätze a. d. Schrift. d. königl. medic. Geſellſch. zu Paris. Überſ. u. m. Anmerk. von D. C. G. Gruner. Th. I. Halle 1784. 8. p. 354.

Treu-

Tréuner D. ſ. morborum migrationes. Jenae 1783.

Jam a graecis ſcriptoribus uſitatum nomen,

ſeu, quia omne magnum ſacrum quandoque vocatur, vid.

Aretaeus de cauſis et ſignis morborum L. I. cap. 4.

ſeu, quod animi partem rationalem, quae longe ſanctiſſima ſit, violet, vid.

Apulej. in Apologia.

ſeu, quia ſacra illa cerebri penetralia occupare putatur, vid.

Joel. Langelott. D. de epilepſia. Lugd. Bat. 1647.

ſeu, quia ſacer valet idem ac execrabilis, ut apud Virgilium:

Auri ſacra fames quid non mortalia etc.

ſeu, quod crederent, hunc morbum a numine quodam aut daemone eſſe demiſſum. vid. *Divinus morbus.* Antiquitus enim hujusce morbi originem daemonibus eſſe tributum ideoque eo affectos publicis commendatos eſſe precibus, probat locus quidam in

Gregor. Nazianzen. Orat. XVI. p. 242.

— Cfr. Wier. de praeſtig. daemon. L. V. cap. 14. p. 494.

De hacce epilepſiae denominatione cfr.

Mizaldi memorabil. Cent. IV. aphor. 2.

Sceleſtus morbus.

Honor. Bouche Tr. de morbo ſceleſto. Avenionae 1634. 8.

Sideratus morbus; ob aſtrorum influxum in epilepſiam.

Joh. Storch l. c. p. 69. cfr. *Aſtralis morbus.*

Sonticus morbus; ob noxae gravitatem, quae juſtam non comparendi coram judicio excuſationem praebuit.

Plin. Hiſt. nat. L. XXXVI. cap. 9.

Gellii noct. att. L. XX. cap. 1.

ſeu, quia, quos vexabat, ab omni militia immunes reddebat, ne ipſi ſibi vim inferrent.

cfr. Pandect. V. 1. 46. — XXI. 1. 65. — XLI. 1. 60.

Sputatorius morbus; quia homines ſani ad ejusmodi aegroti conſpectum exſputare ſolent, vel, quia ille morbus ſalivationem aliquando comitem habet indeque a chemicis ad morbos mercuriales refertur. vid.

Theoph. a Meza compend. pract. Faſc. V. Havniae 1781. p. 14.

Valen-

Valentini (Sti.) morbus. cfr. *Sti. Johannis morbus.*

Du Cange vid. Onomatol. med. pract. T. I. p. 95.

Viridellus ſ. *Vitriolatus morbus.*

Paracelſ. paramir. L. I. de origine morborum ex tribus primis ſubſtant. cap. 6. (quia vitriolum remedium ejus eſſe putat.)

Anglice.

Epilepſy. The falling ſickneſs.

Arabice.

Alferetia. vid. Chriſt. a Vega opp. omn. Lugd. 1587. fol. p. 311.
Kabat ſ. Kabal. (ſignificat quoque obſeſſionem daemoniacam.)
vid. C. F. Volney's Reiſe nach Syrien und Aegypten, a. d. Franz. Th. II. Jena, 1788. p. 24. not.

Gallice.

Epilepſie. Haut mal. Mal caduc. Mal de St. Jean. Mal de la terre. Vapeurs epileptiques.

Germanic.

Epilepſie. Fallſucht. Die fallende Sucht. Die ſchwere Krankheit. Die ſchwere Noth. Das ſchwere Gebrechen. Das böſe Weſen. Das Unglück. Das Elend. Der böſe Fehl. Die Gichter. Der Feigel (in Saxonia inferiore).

Epilepſiam infantilem praecipue denotant ſequentia nomina:
Der Jammer. Der Fraiſch (in Suevia). Das Scheurchen. Der Ringel (in Salisburg).

Hiſpan.

Gota coral. Morbo caduco.

Derivationem nominis hiſpanici *gota coral* vid.
Chriſtoph. de Vega opp. omn. Lugd. 1537. fol. p. 311.
„Quoniam aegrotantes ferunt in acceſſionis principio, cum thoracis motus vitiatur, animali facultate non transmiſſa libere, veluti guttam aquae frigidae a capite deſcendere in cor, cum tamen nihil aliud ſit, quod ſentiunt praeter impedimentum diſtenſionis thoracis et refrigerii cordis.“

Hol-

Holland.

Fallende Ziekte. Sint Jans euwel.

Stuype denotat epilepſiam infantum.

Ital.

Mal caduco. La bruta (Venetiis).

Suecic.

Fallende Sot. Hjärtſprång, quod autem potius denotat epilepſiam infantilem.

PARS II.

Pathologica.

CAP. I.

Variae definitiones epilepſiae.

1. Terraemotus microcoſmicus ab efferveſcentia ſpiritus vitae ortum trahens.
   Theophr. Paracelſus L. de morb. caduco, p. 596.
2. Motus convulſivus.
   Waldſchmidt praxis. p. 337.
3. Convulſio ſ. concuſſio totius corporis.
   River. praxis L. I. cap. 7.
   Barbette prax. Barbett. L. I. cap. 1.
   Henr. Petraei noſolog. harmon. T. I. diſſ. 6.
   Thom. Willis de morb. convulſ. cap. 2.
   Fernel. pathol. L. V. cap. 3.
   A. E. Büchner rſp. Chr. von Steinen D. de atonia nervorum. Halae, 1749. §. 57.
4. Ablatio et ceſſatio actionum principum ſenſuum motusque.
   Sennert. praxis. L. I. p. 590.
   Plater. praxis. T. I. p. 14.
   Unzer. de epilepſ. L. I. cap. 2.
   Johnſton. univerſ. med. L. VIII. art. 2.
   C. V. Schneider rſp. Sam. Sturm D. de epilepſ. Viteberg. 1650. §. 3.

5. Defectio cum convulſione.
Michaelis oper. pract. Caſ. VI. p. 384.

6. Contractio nervorum cum praeternaturali corporis commotione et ceſſatione.
Gerh. Blaſius in medic. curat. ſpecial. cap. 38.

7. Invita, violenta, praeternaturalis partium nerveo-membranoſarum, hinc muſculoſarum et totius corporis concuſſio, cum ſenſuum abolitione ſtipata, a membranarum, cerebrum, ſpinalem medullam ac nervos cingentium, ſpasmodica ſtrictura et hinc fluidi mobiliſſimi impetuoſiori in organa motoria, parciori in ſenſoria influxu natales ſuos mutuans.
Fr. Hofmann. opp. omn. T. III. p. 9.

8. Membranarum, quae cerebrum, medullam ſpinalem et nervos includunt, ſpasmodica conſtrictio.
Henr. v. d. Beets D. de morbo comitiali. L. B. 1643.
H. P. Juch. rſp. J. G. Hannimann. D. de epilepſia. Erford. 1741.

9. Convulſio cum ſenſuum interceptione.
Petr. Velden D. de epilepſia. L. B. 1648.

10. Aegritudo prohibens membra animata ab operationibus ſenſus et motus.
Savanarola Tr. de epilepſ. p. 88. coroll. 3. litt. E.

11. Subitanea ceſſatio omnium ſenſuum cum motu partium convulſivo a fermento quodam peregrino in corpore cacochymico nervoſum genus irritante orta.
A. H. Faſch rſp. Joh. Fuhrmann D. de epilepſia. Jenae 1679.

12. Varia et mixta actionum praeſertim animalium laeſio cum aliorum ſaepe ſymptomatum concurſu, inprimis motus localis depravatus totius corporis vel certorum ejus membrorum, cumque ſenſuum hebetudine ab aura acida ſpiritus animales et lympham potiſſimum diverſimode inquinante dependens.
J. V. Jägerſchmidt D. ſ. infantem epilepticum. Altdorf. 1684.

13. Detentio principum functionum ſenſuumque quum internorum tum externorum cum motu convulſivo totius corporis per intervalla repetente, ab inſigni membranarum cerebri et nervorum irritatione dependens.
Faſch rſp. Dan. Boeſius D. de epilepſia. Jenae 1686. p. 6.

14. Con-

14. Convulſio repentina et univerſalis per intervalla repetens cum ſenſuum internorum abolitione e repletione potiſſimum ortum ducens.

Barthol. de Moor pathol. cerebr. p. 403.

15. Motus convulſivus, qui materialem cauſam pro fundamento non habet, ſed ſine aliorum morborum complicatione e conſuetudine et ideali tantum ratione, certis plerumque temporibus et non raro circa phaſes lunae occurrit, atque per quascunque cauſas occaſionales, praecipue autem patheticas, facile excitatur.

J. Junker. rſp. Abr. ab Heimbach D. de nova methodo curandi epilepſiam ſine ſpecificis. Halae 1741.

16. Motus convulſivus partium muſculoſarum, tendinearum, membranoſarum et nervoſarum corporis a natura excitatus ad eliminandam materiam nocivam et peregrinam.

Joh. Storch v. d. Kinderkrankh. B. II. p. 70.

17. Invita tonica muſculorum fibrarumque contractio cum mentis functionibus ſimul abolitis novaque cum periodo rediens.

J. de Gorter Compend. medicin. P. I. Francof. et Lipſ. 1744. p. 117.

18. Genus morbi ſpasmodici clonici chronici intermittentis, cujus acceſſus ſubita interceptione ſenſuum, variorum muſculorum agitatione et dyſpnoea notatur.

Fr. Boiſſier de Sauvages noſol. method. T. II. P. II. p. 86.

19. Convulſio major minorve plures paucioresve corporis partes exagitans, rediens cum mentis ſenſuumque interceptione.

Tiſſot v. d. Epilepſie. p. 1.

20. Convulſio cum ſopore.

W. Cullen Anfangsgr. der pr. Arzneiw. Th. III. a. d. Engl. Leipzig 1784. p. 151.

21. Senſuum omnium quam internorum tam externorum ſubitanea interceptio cum violenta alternaque muſculorum prope omnium voluntati famulantium contractione et relaxatione plus minus perdurans, donec tandem homo ita affectus ad priſtinam integritatem et quietem redeat, quid ei contigerit, plane ignarus et neſcius.

Burſer. a Kanilfeld Inſtitut. medicin. practic. Vol. III. Lipſiae 1787. p. 218.

22. Morbus ex impetu vis vitalis nimio in ſenſorium commune directo, ſenſorii functiones, quae motibus voluntariis praeſunt, nimium incitante.
C. G. van der Heüvell tentamen noſologicum. Lugd. Batav. 1787. 8.

CAP. II.

Variae auctorum de parte in epilepſia affecta opiniones.

1. *Cerebrum.*
Autor Libr. pſeudohipp. de morbo ſacro. (paſſim.)
Galen. de loc. affect. L. III. cap. 7.
Paul. Aeginet. L. III. cap. 13.
Carol. Piſo de morb. a colluv. ſeroſ. Sect. II. part. 2. p. 145.
Rolfink. Epitom. method. cognoſc. et curand. affect. cap. 18.
Plater. prax. l. c.
Unzer l. c. Lib. I. cap. 5.
Blaſius l. c. cap. 38.
van Swieten l. c. T. III. p. 401.
Tiſſot l. c. p. 22.
Contra hanc opinionem multa profert
Conr. Vict. Schneider de Catarrho. Viteb. 1661. 4. Lib. III.
2. *Ventriculi poſteriores cerebri.*
Don. Ant. Altomare de medend. corp. hum. malis. Venet. 1558. fol. L. I. cap. 18. p. 168.
3. *Spiritus animales intra cerebri meditullium conſiti.*
Thom. Willis de morb. convulſ. cap. 2.
G. K. Tatai Hercules vere cognitus, p. 10 et 11.
4. *Nervi, alii liberi, alii obſtructi.*
J. Walaeus rſp. Joh. de Schafter de Epilepſia. Lugd. Batav. 1646. §. 5.
J. E. Schaper Progr. de epilepſia. Roſtoch. 1695.

5. *Cor.*

5. *Cor.*

Quercetan. Tetras. cap. 8.

6. *Os ſtomachi* (Cardia).

Helmont. Tr. de ſede anim. §. 7. pag. 274.

CAP. III.

Epilepſiae cauſa proxima.

1. Τὸ πνεῦμα incluſum omnia movens.

Aretaeus de morb. acut. Lib. I. cap. 5.

2. Humor craſſus viſcoſus (pituita ſcil. et μελαχολή, ut cap. 6. ſe explicat) ventriculos ac meatus cerebri replens et obſtruens.

Galen. de loc. affect. Lib. III. cap. 5.

Roder. de Vega opera. Lugd. 1593. p. 368. Plures hujus ſententiae aſſeclas recenſet

Matth. Unzer de epilepſ. L. I. cap. 12.

3. Humor humidus, quo ventriculi cerebri non perfecte opilantur.

Conſtantin. Medicus. vid. Barthol. Anglic. de propriet. rer. Lib. VII. cap. 9.

4. Occluſio ventriculi medii aut poſtremi cerebri vel obſtructio arteriarum, carottidum venarumque jugularium.

Vinc. Alſarii a Cruce de epilepſ. praelect. bononienſ. L. III. Venet. 1603. 4.

5. Nimia repletio aut evacuatio vaſorum capitis.

Barthol. de Moor patholog. cerebri. Amſtelod. 1704.

Archib. Pitcairn Element. medic. Leid. 1737.

Contra hanc ſententiam pugnat

Bazin non ergo a ſola copia humoris epilepſia. Pariſiis 1610.

6. Compreſſio et ſubſidentia cavitatum et meatuum cerebri.

Hercul. Saxonia praelect. pract. P. I. Cap. 15. §. 9.

Duncan. Liddelii art. medic. Lib. III. cap. 6.

7. Lympha acris nervos vellicans.

Barbette praxis. Cap. I. de epilepſia.

8. Lym-

8. Lympha acido auſtera.
Decker vid. Gaulken Diſſ. cit. Sect. X.

9. Moleculae acres volatiles aliquo liquore contentae cerebrum irritantes.
Theod. Zwinger D. de epilepſia. Baſil. 1714.

10. Sanguinis intemperies frigida, craſſa, viſcoſa, ſalinis particulis immixta cum fermento in tubulis ſolidarum partium; non niſi ſingulari de cauſa inde eluendo, non modico, non ſolido, ſed valde peregrino, poros habente omnino abludentes a reliquis ſanguinis et humorum poris et hinc aetherem intra ſeſe fovente, qui non debet non cum ſanguine commixtus ferinum ejus ciere motum et quaſi in ſpumam illum adigere non abſimili ratione atque ovi accidit albumini conquaſſato aut aquae ſalſae ad littora maris valide a vento commotae. Sicut enim illa ſpumeſcit et in bullas vertitur, ſic etiam viſcoſitati exiſtenti in ſanguine dum jungitur id fermentum ſalſum, ſanguinem cum humoribus circulantibus cum ſpiritubus animalibus, qui in cerebri verſantur ventriculis, in ſpumam commutat, cui ſpumae eodem includuntur modo ſpiritus, quo ventus ſive aër aquae ſaponi miſtae.
A. H. Faſch rſp. J. Fuhrmann D. de epilepſia. Jenae 1679. Theſ. IX.

11. Ichoreſcentia humorum inprimis ſanguinis fermentifica.
Wedel. vid. Schaper rſp. Bartholomaei de epilepſia. Roſtoch. 1695. Theſ. IV.

12. Fermentum aceſcens perverſum in liene.
Hogelande in oeconom. animal. p. 186.

13. Acidum nervos irritans.
Waldſchmidt. praxis. p. 10.

14. Vaporoſa et tenuis quaedam materia, qualem Pelops, Galeni praeceptor, πνευματικήν τίνα ὥσπερ αὔραν vocitabat, quae tam acrimonia quam mordacitate ac qualitate venenata cerebri ſubſtantiae prorſus infenſa, meninges ac nervoſum genus ad noxii expulſionem ſtimulat.
Joel. Langelott D. de epilepſia. Lugd. Bat. 1647.

15. Irritatio facultatis expultricis in membranis cerebri, quod exemplo ventriculi a re acri ad ſingultum ſtimulati declarat Galenus (de loc. affect. L. III. cap. 7.), et ſimilitudine ſternutationis, quam et dimi-

nutam

nutam epilepſiam vocat, illuſtrat Avicenna (Fen. I. L. III. Tract. 5. cap. 8.).

Petr. Velden. diſſ. cit. §. IV.

Wolfg. Wedel rſp. Roeſer de epilepſia. Jenae 1673.

Fernel. de abdit. rerum cauſ. L. II. cap. 15.

Sennert. inſtit. med. L. II. P. III. Sect. 2. cap. 6.

16. Diviſio ſeu ſolutio unitatis cerebri a mordicante et vellicante acrimonia.

Hieron. Mercurialis de morb. pueror. L. II. cap. 8.

Lud. Mercatus de intern. morb. curat. L. I. cap. 16.

— — — de affect. mulier. L. II. c. 5.

17. Vapores corrupti et virulenti qualitatis tenuis, mordacis, venenatae.

Foreſt. obſervat. L. X. obſ. 54.

Antiparacelſ. p. 107.

Heurn. L. I. cap. 22.

Henr. van der Beets D. de morb. comitial. Lugd. Batav. 1643. §. 7.

Horſt. quaeſt. therap. Dec. II. quaeſt. 9.

Sennert. inſtit. L. II. P. II. Sect. 2. cap. 6.

18. Mercurialis, ſalinus, vitriolatus liquor.

Paracelſus de morb. caduc. l. c.

— — Schol. ad. 3. paragr. cap. 2. §. 3.

Hieron. Petraeus in noſol. harmon. Diſſ. 6. theſ. 16. ſqu.

Unzer de epilepſia, cap. 4 et 14.

Sennert. prax. med. L. I. P. II. cap. 31. qu. 3.

19. Vapores et humores ſubito in cerebrum ruentes.

Car. Piſo l. c. part. II. p. 146.

20. Spiritus male affectus.

Langii oper. med. pract. T. III. p. 60.

Gaulken. l. c. §. 9.

21. Spiritus acidus acris.

de la Boe Sylvius vid. Gaulken. l. c. §. 10.

22. Spiritus animalis e cerebro in nervos nimia profuſio.

Plater. l. c. T. I. cap. 2.

Hoechſtaetter. obſ. med. rar. Dec. IV. caſ. I. Schol.

23. Ar-

23. Archeus furioſus e ſtomacho prodiens.
Helmont. Tr. de ideis morboſis.
— — de morb. archealib. §. 17. ſqu.
H. Cöller. D. de morb. ſacro. Gieſſae 1658.

24. Heterogeneae et exploſivae particulae nitroſulphureae in cerebri meditullio.
Willis de morb. convulſiv. cap. 2 et 7.
Contra hanc ſententiam:
Michaelis oper. med. p. 574.

25. Spiritus animalis impetuoſior et depravatus motus.
Sylvius in praxi L. II. cap. 20. §. 73.

26. Inordinatus et perverſus ſpirituum animalium motus in cerebro et violenta exploſio in nervos.
Mich. Ettmüller rſp. G. Heintke D. ſ. Valetudinarium infantile. Lipſiae 1675. §. 30.

27. Halitus quidam mixtus e nitroſo et vitriolaceo.
J. V. Jägerſchmidt diſſ. cit. p. 7.
Michaelis oper. med. p. 578. (et ſalinoſo ſtyptico.)

28. Retractio nervorum.
Joh. de Schafter diſſ. cit. §. 4.

29. Violenta ſpasmodica conſtrictio durae matris, quae nervorum omniumque totius corporis membranarum quaſi mater exiſtit, qua conſtricta influxus ſpirituum animalium inordinatus redditur.
F. Hofmann rſp. A. P. Bornemann D. ſiſt. affectus haereditarios. Halae 1699. p. 23.

30. Major variusque fluidi nervei in nervos motorios influxus.
J. C. de Steinen diſſ. cit. §. 58.

31. Spiritus animales omne praeternaturale in corpore humano fugientes introitum impedire tentantes tanto molimine, ut quandoque membra ignobiliora opprimantur.
C. F. Luther rſp. D. H. Höflich D. de epilepſia. Kiloniae 1730. pag. 6.

32. Vis nervorum venas conſtringendi indeque muſculos contrahendi modo nimio aucta.

Mus-

Musgrave Speculations and conjectures on the qualities of the nerves. Sect. I.

33. Is cerebri ſtatus, in quo eae cerebri partes claudantur, quae ad ſenſus reſpiciunt, apertis manentibus iis, quae ad voluntarios motus pertinent, et celerius a ſpiritubus animalibus perfluxis.
H. Boerhave praelect. academ. T. VI.

34. Nimia cerebri in nervos motorios, nulla in ſentientes actio.
J. van Swieten l. c. p. 455.
Tralles de uſu opii. Sect. III. p. 17.

35. Vehemens impulſio fluidi nervei in organa ſenſus et motus et impeditio ejus regreſſus.
C. G. Ludwig inſtitut. clin. p. 309.

36. Aër elaſticus in inteſtinis clauſus.
J. G. Pietſch erklärte Urſach und Cur der fallenden Sucht. Hamburg u. Leipzig 1753. p. 40.

37. Abundantia viſcidae pituitae et aurae elaſticae in primis viis.
Unzer der Arzt. T. VIII. p. 67. ſqu.
cui ſententiae quoque inclinant
Hirſchel, Gedank. die Heilart d. fallenden Sucht betreff. 2te Aufl. Berlin 1770. p. 6—11.
Fothergill in Medical obſervat. and inquiries. Vol. VI. Lond. 1784.

38. Compreſſio aut contractio originum nervorum, qua ſpiritus animales in nervos motorios pari modo, quo cordis contractione ſanguis in arterias, expelluntur, eorundem autem in nervos ſenſorios, aeque ac ſanguinis contracto corde e venis in cor, introitus prohibetur.
Tiſſot l. c. p. 27—29.

39. Digeſtionis functiones laeſae indeque orta humorum ſpiſſitudo.
E. J. P. Houſſet D. ſur les parties ſenſibles du corps animal etc. Lauſann. 1770. 8.

40. Morboſa ſenſus interni mutatio.
Preſſavin nouveau traité des vapeurs, ou traité des maladies des nerfs, dans lequel on developpe les vrais principes des vapeurs. à Lyon 1770. 12. p. 102.

41. Extenſio cerebri.

W. Threlful Eſſay on Epilepſy, in which a new theorie of that diſeaſe is attempted, from which the proximate cauſe is inveſtigated and indications brought from thence, ſhewing clearly the conſiſtency of the method of cure. London 1772. 8.

42. Impetus vis vitalis nimius in ſenſorium commune directus, ſenſorii functiones, quae motibus voluntariis praeſunt, nimium incitans.

C. G. van den Heuvell tentamen noſologicum. Lugd. Batav. 1787. 8.

CAP. IV.

Litteraria ad cauſas epilepſiae remotas pertinentia.

SECT. I.

Diſpoſitio haereditaria, ſ. Parentes epileptici.

Cfr. Auctor libr. pſeudohippocr. de morbo ſacro. S. V. text. 7. 8.

Beaumes v. d. Convulſion. d. Kinder. a. d. Franz. Leipz. 1791. 8. pag. 6.

Boerhave aphoriſm. 1075. — (non ſemper epilepſiam haereditariam generationis ordines proſequi, ſed ſaepius gradus intermedios transſilire contendit.)

Cunningham (Alexand.) D. de epilepſia. Lugd. Bat. 1725. p. 11.

Frank (J. P.) Syſtem der med. Poliz. Th. I. p. 297. ſqu.

Mithof (H. B.) D. de ſede irritamenti in epilepſ. Goetting. 1788. 4.

Rougemont (J. C.) Abh. v. d. erblichen Krankheiten; a. d. Franzöſ. v. F. G. Wegeler. Frankf. 1794. 8.

v. Swieten Commentar. edit. Hilpershuſ. T. III. p. 404.

Tiſſot l. c. p. 31. et not. translat. 13.

Exempla obſervata habent:

Boerhave prax. medic. T. V. p. 30. (omnibus liberis patris epileptici hunc morbum lethalem fuiſſe vidit.)

Brun-

Brunner Conſil. n. 16.
E. N. C. Dec. III. ann. IX et X. obſ. 126.
Erberfeld D. de epilepſia haereditaria caſum exhibens. Duisburg. 1705.
Fernel. Phyſiolog. L. VII. cap. 6.
Holler. Cent. II. curat. 47.
Linnée, rſp. P. Zetzel D. ſ. conſectaria electrico-medica. Upſal. 1754.
Marcell. Donat. med. hiſtor. mirabil. L. IV. c. 18.
Michaelis medic. Bibl. B. I. p. 360.
Poterii Curation. Cent. II. n. 47.
Quarin. animadverſion. p. 15.
Saillant in Memoir. d. l. Societ. roy. d. med. T. III. p. 305.
Stahl (G. E.) D. de haereditaria diſpoſitione ad varios affectus. Halae 1706. p. 48. (omnia cujusdam familiae membra pubertatis tempore epilepſia infeſta vidit.)
Stoll de morbis chronic. T. II. p. 2.
Wepfer obſervat. 131.
Zacut. Luſitan. prax. admir. L. I. obſ. 36. (Patris epileptici filii VIII. et nepotes III. quoque epilepſia laborantes.)

Scholion.

Hic optimus mihi videtur locus ad interponendam opinionem quorundam veterum, epilepſiam nempe fieri, ubi concipitur homo fluentibus menſtruis, uti teſtantur Arabes, ideoque in legibus Moſaicis coitum cum muliere menſtruata eſſe interdictum.

vid. Theoph. de Meza Compend. med. pract. Faſcic. V. Havniae 1781. p. 14.

SECT. II.

Matris partum in utero gerentis variae commotiones.

Cfr. Alberti Jurisprud. med. append. p. 33.
Hofmann (Fr.) D. de morb. foetuum in utero materno. Halae 1702. §. 7. p. 9.
Reiniger (E. S.) D. de prole parentum culpas luente. Lipſ. 1774. p. 37.

Sprengel (K.) in annot. ad Buchan's Hausarzeneikunde. Altenburg. 1792. (negat huncce epilepſiae originem.)
v. Swieten Comment. T. III. p. 406.
Tiſſot l. c. p. 33 — 38. cfr. et not. Ackermanni.

Exempla enarrant:

E. N. C. Dec. II. ann. IV. Append. p. 209. (Congenita epilepſia recurrens ex viſo lepore, ob terrorem matris tempore graviditatis ex lepore perceptum.)
Fabric. Hildan. Obſerv. chirurg. Cent. III. obſ. 8. (Epil. a terrore, quem mater ex aſpectu epileptici perceperat.)
Miſcell. Nat. Curioſ. Dec. I. Ann. III. obſ. 160.
Reiniger l. c.
Tiſſot l. c.

SECT. III.

Capitis vitia.

A) *Commotiones capitis.*

Acta Nat. Curioſ. Dec. II. ann. I. obſ. 92. (Epilepſia ex contuſione capitis.)
Alberti Jurispr. medic. P. I. p. 411. (a concuſſione temporum.)
E. N. C. Dec. I. ann. II. obſ. 259.
— — — — VI et VII. obſ. 107. (a lapſu.)
Greding l. c. Th. II. p. 56.
Hoechſtaetter Obſervat. Dec. II. caſ. 5. (a lapſu.)
Hornung Ciſt. med. p. 290. (a lapſu.)
Meyer Abrahamſon, in Mekel Archiv d. pract. Arzn. B. III. St. 1. n. 2.
Miſcell. Nat. Cur. Dec. I. ann. IV. obſ. 35. (Epilepſia infantis, cujus caput a nutrice contra incunabulas graviter concuſſum erat.)
Ortlob in E. N. C. Dec. II. ann. IV. V. obſ. 198. (Epilepſia a lapſu infantis, hinc perpetua infantia, imbecillitas, dein hydrocephalus, cum tamen annum triceſimum ſeptimum adtigiſſet.)
Pouteau Melanges de Chirurg. Lyon 1760. 8. p. 85. (ab ictu in cranium.)

Schell-

Schellhammer (G. C.) in Act. N. C. Dec. II. ann. VI. obſ. 114. (ab ictu in ſyncipут poſt octennium orta.)

Schenk (Joh.) Lib. I. obſ. 202 et 213. (ab ictu in os temporis.)

Schurig. Chylologia, p. 205.

B) *Cranii vitia et laeſiones.*

Act. Nat. Cur. Cent. VII. p. 299. (a fiſſura oſſis frontis.)

— — — Dec. I. ann. 4. 5. obſ. 35. (ab incurvatione diplois internae.)

Anderſon, vid. Auserl. Abhandl. f. pr. Aerzt. B. XIII. p. 712. (cranium dura matre concretum.)

Baldinger D. de epilepſia ex tumore durae matris ſcirrhoſo et carie cranii. Jenae 1771. recuſ. in Waiz. Auszüg. B. VI. no. 7.

Ballonii (Guil.) paradigmata et hiſtoriae morborum ob raritatem obſervatione digniſſimae, Pariſ. 1648. 4. p. 45. (Calva depreſſa, inde nata epilepſia, dein factum, effracto cranio, ut elevaretur, quod depreſſum erat.)

Bartholini Anatom. reformat. Lib. IV. cap. 5. (Ep. a prava ſuturarum diſpoſitione.)

Berengarii (Jac.) Tr. de fracturis calvariae. Bononiae 1518. 4. p. 71. (a vulnere cranii.)

Binninger. obſervat. medicinal. Cent. IV. obſ. 64. (a vulnere cranii.)

Blegny Zodiac. gallic. Ann. 1679. Febr. obſ. 7. (plura exempla habet.)

Bonet. Sepulchr. anatom. L. I. Sect. XII. obſ. 4. (ſingular. cranii conformatio.)

— — — — app. (Suturarum prava diſpoſitio.)

Boretii (Matth. Ern.) reſp. J. G. Arnold D. de epilepſia ex depreſſo cranio. Regiomont. 1724.

§. 7. Ep. a plica nimis ligatae mitrae cranium premente in infante decem hebdomadum.

§. 19. Ep. a depreſſione cranii ab ictu praeceptoris incauto.

Cloſſy Obſervations taken of morbid bodies. Sect. I. obſ. 9. p. 17. (Ep. a tumore in oſſe frontis ab ictu.)

Cöler, vid. Schmuckers vermiſcht. Schrift. Th. I. p. 259. (a vulnere cranii.)

Didier

Didier Patholog. p. 316. (a globulo ſclopetario intra oſſa cranii haerente et, ſupino jacente homine, paroxyſmum epilepticum ex preſſione cerebri producente.)

Duretus, vid. H. Boerhav. prael. de morb. nerv. p. 118. (Ep. a caſu et inde oborta depreſſione cranii.)

Fernel. de abdit. rer. cauſ. L. I. cap. III. (a vulnere cum fractura cranii.)

Gabelchover Obſerv. Cent. IV. p. 117. (a vulnere cranii.)

Greding (J. E.) ſämmtl. Schrift. herausg. v. Dr. C. W. Greding. Greiz. 1790. Th. I. p. 290. (a tumore cranii inter ſuturam ſagittalem et coronalem nucis juglandis magnitudine a caſu in juventute perpeſſa.)

Hofmann (J. M.) in E. N. C. Cent. VIII. obſ. 29. (E. funeſta a fiſſura oſſis frontis a lapſu oborta.)

Leveling (Henr. Palm.) D. de cranio militis quondam venerei, poſtea epileptici, tandem apoplectici defuncti. Ingolſtad. 1774. 4. c. tab. aeneis.

Lemonnier in Journal de Medec. T. LIX. Pariſ. 1783. p. 421. (Cranium dura matre cohaerens.)

Locher. (Max.) Obſerv. pract. p. 81. (a topho ſyphilitico cranii.)

Loehrl de morbis oſſium in genere, p. 22. (exoſtoſis cranii.)

Mekel Recherches ſur les cauſes de folie. obſ. 14. (a lamina oſſea duram matrem irritante.)

Morgagni, v. Lieutaud hiſtoria anat. med. ed. Schlegel, T. II. Longoſal. 1787. 8. p. 321. (In epileptico poſt capitis contuſionem foramen paulo minus, ut apicem digiti admitteret, dura matre occluſum, ſub quo occurrit fovea magni ovi capax.)

Pew (Rich.) Skizzen a. d. Heilkunde; a. d. Engl. von D. C. F. Michaelis. Leipzig 1787. 8. p. 2. ſq. (Multa profert de inaequalitate oſſium cranii et inde deſtructa harmonia proportionali inter cranium et cerebrum, nec non de exoſtoſibus cranii.)

Pozzis (Ant. de) in E. N. C. Dec. I. Ann. IV. V. obſ. 34. (a lamina oſſea ſinum falciformen premente.)

Quarin (Joſ.) animadv. practic. in diverſ. morb. chron. Viennae 1786.

Cap. II. p. 19. Ep. ab exoſtoſi e lue venerea neglecta.

— — p. 22. Ep. a topho cranii ex eadem cauſa.

Rhodii Obſervat. Cent. I. obſ. 55. (a tumore cranii.)

Stalpart v. d. Wiel Obſervat. Cent. I. obſ. 38. (Ep. a deformitate cranii.)

Vicrac in Verhandelingen vitgeg. d. d. Holland. Maatſchapp. d. Weetenſch. te Haarlem. B. XIV. Haarlem 1773. 8. p. 49. (a carie oſſis occipitis.)

Vieuſſens (Raim. de) Hiſtoir. des malad. intern. à Toulouſe 1774. (E. a feſtuca cranii cerebro impacta.)

Wurm in Schmucker verm. Schrift. T. I. p. 252. (a vulnere cranii.)

Zechius, v. Bonet. Sepulchr. anat. L. I. S. XII. obſ. 3. (a vulnere et depreſſione cranii.)

C) *Cerebri et cerebelli vitia et laeſiones.*

a) *Structurae et maſſae.*

Baader (Joſeph.) Obſervat. medic. inciſionibus cadaverum anatomicis illuſtratae. Friburg. 1762. 8. p. 107. (Cerebri ſubſtantia tam corticalis quam medullaris durior et ſcirrhoſa.)

Baumer (J. W.), rſp. G. J. Pfeffer D. de convulſionibus clonicis. Gieſſae 1778. 4. p. 13 et 15. (Cerebrum duriuſculum.)

Glandorp. Spec. Chirurg. obſ. 6. (Cerebrum ſphacelatum.)

Greding l. c. p. 306. (Exempla cerebri foetidiſſimi.)

— — — p. 309. (Exempla mollitiei cerebri nimiae.)

Guarinoni, v. Lieutaud l. c. p. 355. obſ. 153. (In cadavere venerei ſimul epileptici pars ſiniſtra cerebri fere tota corrupta et gangraenoſa.)

Kortum de vitio ſcrophuloſo etc. T. I. Lemgov. 1789. p. 76. (Induratio cerebri a materia ſcrophuloſa cerebrum occupante indeque epilepſia.)

Marchettis (Petr. de) obſervat. chirurg. Patav. 1664. 4. p. 59. (Mollities nimia maſſae.)

Morgagni de ſed. et cauſ. morb. Epiſt. IX. §. 16. (Hemiſphaerii ſiniſtri pars anterior molliſſima gelatinoſa collapſa.)

— — §. 18. Mollities thalami nervorum opticorum.

Morgagni de ſed. etc. §. 25. Cerebri pars anterior cartilaginea.

— — — §. 26. Subſtantia corticalis plane indurata paſſim ſcirrhoſa, paſſim cartilaginea.

Salmuth (Phil.) Obſervat. med. Cent. III. poſthum. Brunſuic. 1648. 4. Cent. III. obſ. 22. (Cerebrum ſphacelatum.)

Schmidt (Ern. Gottl.) obſervat. chirurg. obſ. 3. (Hemiſphaerium dextrum plane liquefactum.)

Sponius (Jac.) in Act. Erud. Lipſ. Ann. 1689. (Cerebrum ſubdurum.)

Tiſſot l. c. p. 116. §. 46.

b) *Stagnationes et Effuſiones.*

α) *Sanguineae.*

Bartholini Hiſtor. anatom. Havn. 1654. 8. Cent. II. obſ. 92. (in ſupremo cerebro prope cranium ſanguis concretus.)

Drelincourt, in Bonet. Sepulchr. anat. T. I. p. 294. (Vaſa ſanguine turgida rupta.)

Dulac, v. Lieutaud l. c. T. II. p. 361. obſ. 173. (a.) (Vaſa cerebri turgida.)

Johnſtone in Medic. Obſervat. and Inquir. Vol. II. n. 6. p. 115. (Vaſa ſanguine turgida. Guttulae ſanguineae ex ſubſtantia cerebri tranſciſſa abunde ſtillantes.)

Marquiſius in Zodiac. med. gall. Ann. 1682. (Sanguis in ventriculos cerebri effuſus.)

Mekel Recherch. ſur les cauſes de la folie, in Memoir. de Berl. 1760. obſ. 10.

Morgagni l. c. Epiſt. IX. §. 12. 14.

Richter Anfangsgr. der Wundarzn. Vol. II. §. 207. (varicoſa vaſorum expanſio et repletio.)

Rümler (J. Udalr.), in Bonet. l. c. T. I. p. 274. (Effuſiones ſanguinis.)

Sponius (J.) in Act. Erud. Lipſ. Ann. 1682. et in Bonet. l. c. T. I. p. 299. (in lobo cerebri dextro magna effuſi ſanguinis copia.)

Tiſſot l. c. p. 122. ſqu.

Valſalva, vid. Lieutaud l. c. p. 381. obſ. 236.

We-

Wepfer (J. J.) in E. N. C. Dec. III. Ann. I. obſ. 135. (Vaſa turgida ſanguinis & j. effuſa.)

β) Seroſae. Gelatinoſae.

Bang (Fr.) Auswahl aus d. Tageb. d. Königl. Friedr. Krankenhauſ. zu Copenhag. aus d. Lat. von Jugler. Th. I. Copenh. u. Leipz. 1790. 8. p. 129. 165.

Baumer (J. W.) Diſſ. cit. p. 15.

Bontii (Jac.) Obſervat. ſelect. ex diſſectione cadaverum et autopſia deſcriptae. Amſtelodam. 1694. 8. (Materia viſcida in ventriculis.)

Borell. (Petr.) Obſervat. Cent. I. obſ. 78.

Drelincourt, v. Bonet l. c. T. I. p. 296. (Ventriculi flava ſpiſſaque gelatina repleti ſuper totum cerebrum effuſa.)

Lieutaud hiſtor. anatom. T. II.

p. 354. obſ. 150. Morgagni. (in dextra cerebri parte fovea ſero ſubfuſco et ſanguine repleta.)

p. 430. obſ. 414. Mangold. (Seri tanta quantitas, ut omnes cerebri receſſus intus et extus ſubiiſſet.)

p. 443. obſ. 469. Morgagni. (Sub tenui meninge materia gelatinoſa cum bullulis aëreis. Pauca ſeroſa colluvies in ventriculis.)

p. 444. obſ. 470. a. Baader. (Lympha mucoſa, gelatinoſa et copioſiſſima inter cerebri corticem et meninges ſtagnans. Ventriculi ſero pleni.)

p. 448. obſ. 480. a. Baader. (In hemiſphaerio ſiniſtro et ipſa ſubſtantia corticali et medullari copioſa lympha craſſa et mucoſa.)

Piſo (Carol.) de morb. a colluv. ſeroſ. Sect. II. cap. 7.

Poupart, in Memoir. d. l'Acad. d. Sc. à Paris 1705. p. 62. (Gelatina dura firmius durae matri adhaerens.)

Rhodii Obſerv. med. Cent. I. obſ. 49. (Ventriculi cerebri et cavitates medullae ſpinalis ſero repleti.)

Riverii (Lazar.) Obſervat. med. et curat. inſign. Pariſ. 1646. 4. Cent. I. obſ. 37.

Schenk. (Joann.) obſervat. med. L. I. obſ. 222.

Thoneri (Auguſtin.) de admirand. convulſivis motibus Libr. IV.

Ulm. 1651. 4. L. II. obſ. 2. p. 92. (Epilepſia non a ſola vaporoſa materia, ſed humoroſa copioſe in cavitatibus cerebri inventa proveniens.)

γ) *Aquoſae, e. g. Hydrocephalus.*

Bartholin. (Thom.) Hiſtor. anat. Cent. III. hiſt. 80. (Aquae ℔ j. in cerebro.)

Bonet. Sepulchr. anatom. T. I. obſ. 7. 8. 10. 12. 13. 15. 17.

Coiter. (Volcher.) Obſerv. anat. chirurg. Norimb. 1572. fol. p. 57.

Foreſt. (Petr.) de capit. et ventr. morbis L. III. Leidae 1590. 8. (Epil. a hydrocephalo.)

Gavaſetti, in J. B. Morgagni l. c. Ep. IX. §. 3. p. 68.

Greding l. c. p. 294. (▽ inter duram et piam.)
p. 304. (inter piam et ſubſt. corticalem.)
p. 310. (in ventriculis lateralibus.)
p. 316. (in ventriculo tertio.)
p. 326. (in ventriculo quarto.)

Harder. (Jo. Jac.) Apiarium. Baſil. 1687. 4. (Ventriculi aqua repleti.)

Lieutaud l. c. p. 359. obſ. 167. Inter ſubſtantiam corticalem et piam matrem et in ventriculis lateralibus maxima aquae copia. — Acta Londinenſia.
p. 361. obſ. 172. Ventriculus ſiniſter aqua plenus. — Miſcell. curioſa.
p. 375. obſ. 217. ▽ in ventriculis. — Journ. de Medec.
p. 448. obſ. 481. (a.) — — — Fournier.

Riverii Obſerv. Cent. I. obſ. 37. v. Ejus opera med. Genev. 1737. fol. p. 473.

Roche (de la), in Edinburg. med. Comment. B. I. p. 229.

Rucker, in Commerc. litt. Nor. 1739. p. 337. (Ep. a hydrocephalo.)

Sauvages Noſol. method. ed. Daniel. T. III. p. 106.

Vogel (S. G.), in Hufeland Journ. der pract. Arzneik. B. I. St. 2. p. 275.

Walter, in Leske auserl. Abhandl. B. II. p. 7.

δ) *Purulentae. Abſceſſus.*

Bauhin, v. Bonet l. c. p. 371. (Abſceſſus in dextro cerebri lobo.)

Bau-

Baumer. in Diſſ. cit. p. 14.

Borrich. (Ol.) vid. Bonet l. c. p. 293. (Abſceſſus in dextro lobo cerebri ovum gallinaceum magnitudine ſuperans.)

Cloſſy Obſervations taken diſſection of morbid bodies. Sect. I. obſ. 9. p. 17. (Parva ulcera in ſuperficie interna durae matris.)

Fernel. Pathol. Lib. V. cap. 3. (Abſceſſus in cerebro.)

Pouppe Deſportes Hiſtoire des maladies de St. Domingue. à Paris 1770. T. II. p. 209. (Glandula pituitaria magnitudinis ovi fungoſa ad tertiam pure repleta involucro obvoluta.)

Rümler, v. Bonet l. c. p. 274. (Dura mater ulceribus eroſa.)

Salmuth Obſervat. Cent. I. obſ. 17. (Pus in meningibus.)

* * *

Baader (Joſ.) Obſervat. medic. 1762. p. 107. (Abſceſſus ad ovi gallinacei magnitudinem accedens in ſubſt. medullari.)

Comment. Lipſ. Vol. XII. P. IV. p. 615.

— — — Vol. XVI. P. IV. p. 714.

Lieutaud l. c. p. 346. obſ. 118. (Abſceſſus magnitudine ovi columbini, cujus pus album et foetidum viam ſibi cuderat verſus medullam oblongatam.)

Maſſa (Nicol.) Epiſt. medic. Venet. 1550. 4. Lib. II. Ep. 2. (retenta ſanies in vulnere capitis. Cannula immiſſa indeque ſaniei exitu reſtituta, epilepſia eſt ſublata.)

Mekel Recherch. ſur les cauſes de la folie, in Memoir. de Berl. T. XX. p. 85.

Morgagni l. c. Ep. IX. art. 20. 21.

Mutzell Wahrnehm. Th. II. n. 21.

Perotti, v. Comm. Lipſ. Vol. III. p. 651.

Röderer Pr. de cerebri ſcirrho. Gotting. 1762.

Severini nov. obſervat. p. 116.

Vicrac in Verhandelingen van Harlem, B. XIV. p. 49.

D) *Concrementa.*

α) *Scirrhoſa.*

Baldinger (E. G.) Diſſ. de epilepſia ex tumore durae matris ſcirrhoſo et carie cranii. Jenae 1771.

Fantoni (Joa.) opuſc. med. Genev. 1738. 4. p. 37. (Scirrhus in corpore calloſo.)

Lieutaud l. c.

p. 361. obſ. 172. (in plexu choroideo.) — Miſc. curioſ.

— — obſ. 173. (a) idem. — Dulac.

p. 376. obſ. 221. (Corpus glanduloſum fabae magnitudinem aequans in ſubſtantia corporis ſtriati dextri.) — Act. Pariſin.

Moor (Barth. de) Cogitat. medic. L. III. Amſtelod. 1695. 8.

Plater. (Felic.) obſerv. med. Baſil. 1680. 8. Lib. I. pag. 103. (In parte anteriori cerebri ſcirrhus magnitudine ovum gallinaceum ſuperans.)

Roederer Pr. de cerebri ſcirrho. Gotting. 1762.

Sorbait (Paul. de) univerſa medicina theoretica et practica. Norimberg. 1672. fol. (in plexu choroideo.)

β) Carnoſa. Adipoſa.

Borelli Obſervat. Cent. II. obſ. 78. (Materia adipoſa in ventriculis.)

Greding l. c. p. 298. (Corpora mollia alba ſemiglobularia fungoſa in utroque latere regionis frontalis piae meningi obſidentia.)

Güntz (F. G.) de cerebro, Proluſ. II.

Langii opera omn. T. III. p. 62. (adipoſa in ventriculis cerebri.)

Lieutaud l. c. p. 375. obſ. 217. (Septem ſarcomata circa ſinum longitudinalem ſita et piſi molem aequantia.) — Journ. de Medec.

— — — p. 377. obſ. 224. (Varia ſarcomata involucris cerebri annata.) — Miſcell. curioſ.

Rhodii Obſerv. Cent. I. obſ. 55. v. Bonet l. c. p. 283. (Sarcoma in ductu venoſo cerebri.)

γ) Polypoſa.

Blaſius (Gerhard.), v. Bonet l. c. Lib. I. S. XII. addit. obſ. 24. p. 283. (In omnibus fere cerebri venis.)

Greding l. c. p. 298. (in ſinu falciformi.)

Schroek, in Comm. litter. Noric. 1750. p. 165. (in ventriculis cerebri, maxime in ventriculo anter. ſiniſtro.)

Wagner (Frid. Aug.), in Epiſtol. gratulat. de morborum inſanabilium

lium curatione. Lipſiae 1792. 4. p. 8. (Polypus in ſinu longitudinali longitudine trium pollicum craſſitie calamum ſcriptorium ſuperante.)

δ) Lapidea. Arenoſa.

Bonet. Sepulch. anat. L. I. Sect. XII. p. 276. (inter duram et piam matrem in regione occipitali.)

Brieu, in Journ. de Medec. T. XIV. p. 319. Avril 1761. (Septem in dura matre.)

Greding l. c. p. 320.

Güntz (F. G.) Pr. de lapillis in glandula pineali inventis. Lipſ. 1753. 4.

Lieutaud l. c. p. 355. obſ. 153. Guarinonius.

ε) Oſſea.

Faſch (A. H.), rſp. Boeſio D. de epilepſia. Jenae 1686. 4. p. 15.

Greding l. c. p. 295. (Concrementum oſſeum tentorio adhaerens.)

— — — p. 301. (Oſſificationes in corporibus fungoſis ſub β ſupra dictis.)

Hunauld, in Memoir. de l'Acad. d. Sc. à Paris 1734. (prope ſinum longitudinalem.)

Lieutaud l. c. p. 322. obſ. 41. — Miſcell. curioſ.

— — — p. 324. obſ. 50. — Lieutaud adverſar.

Motte (de la) Traité complet de Chirurg. T. II. p. 397. obſ. 171. (pone cerebri falcem.)

Pozzis (Ant. de), in Miſcell. natur. curioſ. Ann. IV. obſ. 34. et in Bonet. Medicina ſeptentr. collatit. L. I. p. 113. (in media cerebri parte.)

ζ) Hydatides.

Greding l. c. p. 315. (in plexu choroideo.)

Johnſtone, in Med. obſ. and Inquir. T. II. n. 6. (ibidem.)

Lieutaud l. c. p. 359. obſ. 167. — Phil. Transact.

— — — p. 361. obſ. 172. — Miſc. nat. cur. (ibid.)

Lyſons practic. Eſſays etc. Bath. 1772. 8. p. 160. (ibid.)

Moritz (F. C.) D. de convulſionum therapia. Francof. ad Viadr. 1792. p. 34. (Hydatis in hemiſphaerio ſiniſtro cerebri, ex qua circiter ſeri uncia effluebat.)

Rhoe-

Rhoetus in Philoſ. Transact. N. 299 et 315. Obſ. II. (in plexu choroideo.)

Valſalva, v. Morgagni l. c. p. 68. (ibidem.)

E) *Corpora aliena in cerebro.*

Bonet. Sepulchr. anat. L. I. Sect. XII. obſ. 25. (gladioli fruſtulum.)

Eraſti Diſput. IV. p. 58. (Mercurius per aures in cerebrum illapſus.)

APPEND. I.

Commotio columnae vertebralis et medullae ſpinalis laeſiones.

Liceat mihi addere huic ſectioni illos epilepſiae caſus, qui e laeſionibus et commotionibus medullam ſpinalem infeſtantibus ortum forſan trahunt. Et in epilepticorum poſt mortem ſectione majori quam hactenus induſtria columnam vertebralem et medullam in ea contentam ſpinalem eſſe explorandam omnino mihi videtur neceſſarium. Forſan aliquando varia quaedam hujus morbi ſpeciei ſymptomaticae cauſa, quae nunc nobis in inferioribus extremitatibus latere videtur, in illa reperiatur.

Cfr. J. P. Frank orat. acad. de vertebralis columnae in morbis dignitate: — in Ej. Delect. opuſcul. medicor. Vol. XI. Ticin. 1792.

Varias epilepſiae a lapſu aut ictu obſervationes, jam ſupra ſub A. et B. commemoratas, forſan et hic collocandas eſſe puto. Specialia exempla enarrant:

Alberti Jurisprud. medic. app. p. 166. (Epilepſia a plagis in dorſo.)

Bonet. Sepulchr. anat. T. I. obſ. 25. (a carie vertebrarum medullam ſpinalem denudatam vellicante.)

Ettmüller Oper. omn. T. III. Francof. 1708. fol. (a verberibus.)

Manardi (Joann.) Epiſtol. Lib. III. Epiſt. 6. (a caſu in nates.)

APPEND. II.

Laeſiones fovearum externarum capitis.

Iſtas quoque huic ſectioni addendas eſſe cenſeo, quum facile opinari liceat, illas etiam aut commotione aut irritatione vicini cerebri produxiſſe epilepſiam.

Boyle vſefullneſs of experim. Philoſophy. P. II. p. 248.

Fabricii Hildani obſervat. Cent. I. obſ. 4. (a globulo vitreo auri immiſſo orta epilepſia.)

Hor-

Hornung Ciſtá medica. p. 394. (ab aurium purulentia.)
Muys Podalirius redivivus. p. 103. (a globulo altius auri inhaerente.)
Salmuth Obſervat. Cap. I. obſ. 74. (ex oculi percuſſione.)

SECT. IV.

Animi Pathemata.

Cfr. Falconer (Will.) Abhandl. von d. Einfluſſe d. Leidenſchaften auf die Krankh. des Körpers. a. d. Engl. von Dr. C. F. Michaelis. Leipzig 1789. 8. Kapit. 15. Epilepſie. p. 87.
Geſenius (W.) mediz. moral. Pathematologie etc. Erfurt 1786. 8.
de Marées D. de animi perturbationum in corpus humanum potentia. Gotting. 1775. 4.
Monjé (J. J.) D. de animi pathematibus eorumque effectibus. L. B. 1785. 4.
Zückert von d. Leidenſchaften.

a) *Triſtitia.*
Alberti Jurispr. med. Suppl. p. 407. §. 30.
Amati Luſitan. Obſervat. Cent. II. Curat. 9.
Auszüge aus dem Tagebuche eines ausüb. Arztes. Berlin. 1791. 8. n. 7. Epilepſia a moerore quartanam ſimulans et dein in febrim quartanam tranſiens.
Grimberg (Nicol.) Obſervat. medic. Havniae 1689. 12. p. 55.
Hofmann medic. ration. T. IV. P. III. p. 39.
Hornung Ciſta medica. Norimb. 1625. 4. p. 415.
Nicolai Patholog. Th. I. p. 276.
Riedlin. Lin. med. obſ. 13. p. 939. (paroxyſmum accelerans.)
Schneider de Catarrho, T. V. p. 252.

b) *Gaudium.*
Boerhave (H.) de morb. nervor. p. 804.
de Marées Diſſ. cit. §. 15.
Marx (M. J.) beſtätigte Kräfte der Eicheln. Hannov. 1781. p. 28.
Swieten (G. van) Comm. in Boerh. aphor. T. III. p. 414.

c) *Amor, praecipue non ſatiatus, prohibitus.*
Aaskow in Collect. Societ. med. Havn. Vol. II. p. 16.

Bor-

Borrich (Ol.), in Th. Bartholin. Act. Havn. Vol. III. obſ. 39. (a repudiato amore paralyſis, epilepſia et fatua oblivio.)
Cornarii (Diomed.) Conſil. med. Lipſ. 1595. 4. Lib. I. conſ. 3.
Dolaeus (J.) in E. N. C. Dec. III. Ann. II. obſ. 75.
Donat. (Marcell.) de hiſtor. med. mirab. Lib. II. cap. 4.
Heucher (J. Henr.), opuſcul. ſiſt. morbos ex nimio veneris uſu. Viteberg. 1700. 4. (Obſervavit virginem, quae ob conſpectum juvenis formoſi epileptica humum decubuit.)
Rolfink (Gu.) Conſultat. et conſil. Jenae 1669. 4.
Schenk (Jo.) obſerv. rarior. Lib. I. obſ. 4.
Tiſſot l. c. p. 76 et 307.

d) *Timor.*

Boerhave de morb. nervor. p. 411 et 803.
Burmeſter (J. J.) D. Conſultatio medica ſuper morbo ſpaſtico etc. Gottingae 1791.
E. N. C. Dec. II. Ann. II. obſ. 149.
Heers (Henr. ab) Obſerv. med. Lugd. Bat. 1685. 12. p. 209.
Lange (J. C.) Diſſ. de morb. caduco. Lipſ. 1706.
Perioux obſervat. med. p. 85.
Pew mediz. Skizzen, p. 30. ſq.
Schenk a Grafenberg obſervat. med. p. 112.
Tiſſot l. c. p. 45.

e) *Terror.*

Ackermann, in verſ. german. Libr. cit. Tiſſot. not. 41.
Act. Erud. Lipſ. 1694. Jan. p. 2.
Albrecht (J. P.), in E. N. C. Ann. III. obſ. 95. (ab inſomnio terrifico.)
Act. N. C. Vol. I. obſ. 25. p. 67.
— — Cent. I. p. 189. app.
— — Dec. I. Ann. VI. obſ. 63.
— — Dec. II. Ann. IV. obſ. 17.
Appel (J. J.) Diſcurſus de epilepſia. Altenb. 1713. 8. p. 10.
Bagliv. prax. medic. Lib. I. Cap. XIV. §. 2.
Bartholin. hiſtor. anat. Cent. III. hiſtor. 41.

Bau-

Baumer Diſſ. cit. p. 17.
Beaumes l. c. p. 90. (ab exploſo tormento.)
Bierling (C. Th.) adverſar. curioſ. Jenae 1679. 4. p. 32.
— — — Medicus theor. pract. ib. eod. p. 577.
Binninger obſervat. med. Cent. I. obſ. 1.
Boerhave de morb. nervor. p. 801. et p. 833.
Breslau. Samml. 1720. II. p. 163. 447.
— — — — 1724. Auguſt. p. 218.
— — — — 1725. May. p. 532. 533.
Büchner, in Miſc. Nat. Cur. 1729. p. 275.
Camerar. Syllog. memorab. medic. Cent. XVI. partic. 26. 33.
Crell. D. de Zinco. Helmſtad. 1780.
E. N. C. Dec. I. Ann. VI. VII. obſ. 32.
— — Dec. II. Ann. III. obſ. 101. 177.
— — — Ann. IV. Append. p. 209.
— — — Ann. VI. Append. p. 71.
— — — Ann. X. obſ. 20.
— — Dec. III. Ann. II. obſ. 93.
— — — Ann. V. VI. obſ. 28. 263.
— — — Ann. IX. X. obſ. 56. 57. 151.
— — Cent. I. Append. p. 189. ſqu.
Fiſcher (J. A.) D. de convulſionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erford. 1727.
Fothergill medic. Obſervat. and Inquir. Vol. VI. p. 79.
Gabelchover Cent. IV. p. 42.
Gesners Beobachtung. Th. I. n. 19.
Greding l. c. Th. I. p. 14, 15, 16, 17, 51, 61, 63, 67, 76, 77, 81, 84, 87, 146, 186.
Gruelmann D. ſ. obſervat. de uſu Cicutae. Gotting. 1788. p. 30.
Haen (de) Rat. medend. P. V. p. 121.
Hagendorn Obſervat. med. Cent. III. Francof. 1698. 8. Cent. I. obſ. 13.
Heers (Henr. ab) obſerv. med. p. 274.
Hemmann (J. A.) chirurg. Aufſätze. Berlin 1778. (ad ſedandam

narium haemorrhagiam aegrotae aqua frigida transfundebatur, indeque epilepſia.)

Hermes, in Verſuch einer chirurg. Privatgeſellſch. v. Tode medic. chir. Bbl. Th. II. St. II. p. 192.

Hiſtoire de l'Acad. des Scienc. à Paris 1753. p. 77.

Hofmann Medic. ration. ſyſtem. T. IV. P. III. p. 25. 27.

Hurlebuſch (G. L.) Diſſ. Zincum medicum inquirens. Helmſtad. 1776. (Obſervat. Cl. Beireis.)

Jacquinelle, in Journ. de Med. T. LXXXIV. Aout, Paris 1790.

Kornzweig D. de epilepſia a terrore orta. Gieſſae 1713.

Langii opp. omn. T. III. p. 35. 62.

Lentilius (Roſin.) Miſcell. med. pract. P. II. Ulm. 1698. 4. p. 309.

Linnée, rſp. P. Zetzel, D. ſ. conſectaria electrico-medica. Upſal. 1754.

Loof (J. A.) Hiſtoria epilepſiae foliis Aurantium perſanatae. Gröning. 1771.

Marx (J. M.) Obſervat. quaed. medic. Berol. 1772. 8. p. 33.

Miſcell. Nat. Cur. Ann. VI. obſ. 24. (ab exploſo ſclopeto.)

— — — — — obſ. 32. (a ſpectro.)

Morgagni de ſed. et cauſ. morb. Lib. I. Epiſt. IX. artic. 6.

Nicolai Patholog. T. I. p. 273.

Paullini (C. F.) Obſerv. med. phyſ. Lipſ. 1706. 8. Cent. IV. obſ. 74.

Peiroux obſervations medicinales, p. 85. (poſt minimum terrorem rediens epilepſia.)

Pew med. Skizzen, p. 30. 39.

Pfündel, in Hufeland Journal der prakt. Arzn. B. II. St. II. p. 272. (a terrore tempore menſtruationis.)

Reil, rſp. J. A. Neumann, D. de criſibus, genuinis morbis nervoſis peculiaribus. Halae 1792.

Reinold, in Samml. auserl. Abh. für prakt. Ärzte, Th. XIII. St. 4. p. 677. 680.

Riedlin nov. Obſerv. p. 939. (paroxyſmum accelerans.)

Salmuth Obſerv. Cent. III. obſ. 41.

Schaarſchmidt, Berlin. Nachricht. Th. I. p. 134.

Schenk obſerv. med. Lib. I. obſ. 215. p. 157.

Seger

Seger (Georg.), in E. N. C. Ann. III. obſ. 95. (ab inſomnio terrifico.)
Selle, neue Beiträge, Th. I. p. 39. ſqu.
Starke, Nachr. v. kliniſch. Inſtitute zu Jena, p. 178.
Stein (G. A.) D. de faba Sti. Ignatii. Erlang. 1793. 8.
Struve (C. A.), praeſ. C. F. Ludwig, D. de vi terroris in corpus humanum. Lipſiae 1790.
v. Swieten Comment. T. II. p. 183. T. III. p. 415.
Thilenius medic. chir. Bemerkungen. Frankf. am M. 1789. p. 129.
Tiſſot l. c. p. 45. 46.
Untzeri ἱερονοσολογία. P. I. cap. 16. P. II. cap. 5.
Weinrich (Mart.) de monſtris. Wratislaviae 1595. 8. cap. 15.
Wepfer Obſerv. med. pract. de affectib. capitis. Scaphuſ. 1727. 4. p. 626.
Wilhelm (F. H. M.) obſervat. electrico-medic. Wirceburg. 1774. 8. p. 148.
Zacuti Luſitani prax. admirand. Lib. I. obſ. 34.
Zimmermann, von d. Erfahrung. Th. II. cap. 11. p. 444.

f) *Ira.*

Crell D. ſ. Zincum medicum. Helmſtad. 1780.
E. N. C. Dec. III. ann. 11. obſ. 6.
Gabelchover Cent. IV. obſ. 59.
Greding l. c. p. 54, 57, 70.
Hoffmann med. rat. ſyſt. T. IV. P. III. p. 39.
Morgagni de ſed. et cauſ. morb. Ep. IX. art. 5.
Nicolai Patholog. Th. I. p. 275, 276.
Riedlein Lin. med. Ann. VI. April. obſ. 27. p. 455. (ab ira reſuſcitata.)
Sauvages noſol. meth. ed. Daniel. T. III. p. 117. (in puero ab ira ob cibum denegatum.)
Schenk. obſ. med. p. 157.
Schneider de catarrho. Viteberg. 1660. 4. T. V. p. 282.
Schurig Sialogia. Lipſ. 1729. 4. p. 377.
Tiſſot l. c. p. 51, 151.
Wieri de ira morbo ejusdemque curatione Liber. Baſil. 1577. recuſ. in Oper. p. 771.

g) *Sympathia.*

Liceat mihi, huic ſubjungere titulo iſta epilepſiae exempla (vel ſic dictam communicativam epilepſiam), quae ex adſpectu epileptici vel aliarum rerum mentem ingrato modo afficientium orta erant. Illa quidem, quae ex ſubitaneo horum horribilium ſymptomatum adſpectu oriuntur, majori jure epilepſiae ex terrore fuiſſent addenda; minime vero ea, quae ex diuturno fere et conſueto epilepticorum adſpectu ortum trahere videntur. In hoc nempe caſu ſaepiſſime accidit, quod aegrotus nullius ex adſpectu percepti horroris ſibi ſit conſcius. Et quum e plurimis a me perlectis obſervationibus non ſatis accurata diſcrimina evolvere poſſim, rectius judicavi, varias et omnes iſtas obſervationes ſub hoc, ut mihi videtur, magis quadrante conjungere titulo.

Aaskow, in Collect. Soc. med. Havn. Vol. II. p. 14—22.

Act. Medicor. Berolin. ed. J. D. Gohlio. T. III. Ann. I. Berolin. 1731. 8.

Act. Nat. Cur. Vol. II. obſ. 133.

— — — Vol. III. obſ. 58.

Buchhave, in Act. Soc. med. Havn. T. I. p. 218.

Commerc. litt. nor. 1735. p. 266.

Dethardiug, rſp. G. H. Stieler, D. de chorea S. Viti. Roſtoch. 1760. 4. p. 29. (Miniſtra virginis cujusdam nobilis, chorea S. Viti laborantis, quotidiano hujus morbi adſpectu commota in epilepſiam incidit)

Duncan médical caſes. Edinb. 1778.

E. N. C. Dec. I. Ann. IV et V. obſ. 43.

Gkachi (i. e. Manitii) Medicus hujus ſaeculi. Dresdae 1693. 8. p. 247. (Ancílla epileptica ab adſpectu cadaveris demortui domini.)

Ledel, in E. N. C. Dec. II. ann. III. obſ. 101.

Lettſom, in Memoirs of the med. Societ. of London. Vol. III. Lond. 1792. 8.

Marcellus Donatus l. c. Lib. II. cap. 4. p. 146.

Meza Compend. med. pract. Faſc. V. Havniae 1781. p. 15.

Miſcell. Acad. Nat. Cur. Ann. IV. p. 74.

Salmuth l. c. Cent. II. obſ. 73. (ex conſpectu phlebotomiae.)

h) *Ni-*

h) *Nimia meditatio.*

Beunie, in Verhandelingen van Vlieſsingen. B. VI.
Galen. de loc. affect. L. V. ed. Chart. T. VII. p. 492.
Hofmann med. rat. ſyſt. Cap. de Epilepſ. §. 19.
Journ. de Medec. T. XII.
Langii oper. omn. Vol. III. p. 62.
Pechlin. obſ. phyſ. med. L. III. Hamburg. 1691. 4.
Plater obſervat. Lib. III. Baſil. 1641. 8. Lib. I. p. 22.
Platner ars medend. §. 647.
Swieten l. c. T. III. p. 413.
Tiſſot l. c. p. 51. (epilepſia recurrens a meditatione breviter poſt prandium inſtituta.)
— — v. d. Krankh. d. Gelehrt. in Sämmtl. Schrift. Th. II. p. 41.

SECT. V.

Nervorum affectiones mechanicae.

1. *Nervorum Vulnera.*

Appel (J. J.) Diſcurſ. de epilepſia. Altenb. 1713. p. 11, 12.
Baumer et G. P. Pfeffer Diſſ. cit. p. 9, 19.
Borrich. vid. Bonet Sepulchr. anat. T. I. p. 294.
Consbruch D. obſerv. faſcic. Stuttgard. 1777.
Fabricii Hildani obſ. chir. Cent. IV. obſ. 22.
Foreſt. l. c. L. X. obſ. 99. (punctura nervi a venaeſect. in brachio.)
Kaempf von d. Krankh. des Unterleib. p. 293. (ab irritato nervo in pollice pedis.)
Maerklin, in E. N. C. Dec. I. Ann. VI et VII. obſ. 77.
Marchetti obſervat. p. 81.
Maret, in Nouv. Memoir. de Dijon. 1784. Prem. Semeſtr.
Rahn medic. Briefw. Th. I. p. 570.
Salmuth l. c. Cent. I. obſ. 35. Cent. III. obſ. 74.

2. *Preſſiones. Tenſiones.*

a) *Tumores aut Concrementa.*

Bonet. Sepulchr. anat. T. I. p. 291. ſqu. (Tumor in regione inguinali.)

Cap.

Cappel D. de tumore nervo vago inhaerente. Helmſtad. 1781.

Haen rat. med. P. V. ed. IIda. Vienn. 1763. p. 117. (durus nodus nervo diaphragmatico in medio ejus decurſu circumcretus aliusque ſimilis priori eo loco, ubi nervus in diaphragma abiturus erat.)

Loeffler, Beiträge zur Wundarzn. B. I. (Concrement. durum in genu.)

Plater obſervat. Lib. I. p. 24. (Tumor in manu.)

Rhaſes Continens L. XV. cap. I. fol. 307. b. (jam concrementa nervis obſidentia epilepſiam producentia obſervavit.)

Rhodii l. c. Cent. I. obſ. 58. (Tumor in genu.)

Sarcone Krankh. v. Neapel. B. III. p. 94.

Short, in Edinb. med. Verſ. B. IV. p. 543. ſq. (Concrem. cartilagineum piſiforme in crure.)

Schmucker chirurg. Wahrn. Th. II. p. 183. (a hydrocele epilepſia.)

Swieten l. c. T. III. p. 419. (tumor in femore.)

Tritſchler D. ſ. obſervat. Trigam. Tubing. 1787. (concrem. lapideum nervo crurali adnatum.)

b) *Artuum luxationes.*

Dictionnaire univerſel de Medecine, T. I. p. 564. (a luxatione pollicis pedis.)

c) *Calculus.*

Bartholin. (Thom.) Opuſc. med. T. I. p. 59. (Calculi renales et veſicales.)

Beaumes, in Journ. de Medec. T. LVII. p. 320. (Cholelithi.)

— — — — — — p. 504. (Signum hujusmodi epilepſiae eſſe dolorem in dextro latere epigaſtrii, nec non in brachio et genu ejusdem lateris.)

Brendel. (J. G.) Progr. de calculi natalibus. (renales.)

v. Ej. opuſc. mathem. et medica, ed. Wrisberg. Gotting. 1769. 4. P. I. p. 59.

E. N. C. Dec. I. ann. II. obſ. 8. (in matrona nephritica ab oleo therebint. dato.)

— — Dec. II. ann. X. obſ. 20. (renales.)

Fabri-

Fabricii (Ph. C.) Progr. ad J. B. Hofmann. Diſſert. Helmſtad. 1756. p. 6.

v. Ej. Animadv. var. argument. Helmſtad. 1783. no. 6. (Cholelithi.)

Helmont de lithiaſi, Cap. 7. (renalis et urethralis.)

Hofmann (Fr.) med. rat. ſyſt. Cap. de Epilepſ. obſ. 3.

Jens, in Mercure Danois. Aout, 1758. p. 99. (Cholelithi.)

Motte (de la) Traité compl. d. Chir. T. II. p. 416, 419. (renales.)

Sauvages noſol. method. ed. Daniel. T. III. p. 100. (Epilepſia nephritica.)

Tiſſot l. c. p. 72.

d) *Dentitio.*

Cfr. clariſſimos de morbis infantum ſcriptores, e. g. Roſenſtein, Armſtrong, Hufeland, etc.

E. N. C. Dec. I. ann. II. obſ. 67.

— — Dec. II. ann. X. obſ. 100.

Heiſter. Compend. med. pract. Cap. XVIII. §. 24.

Sauvages noſol. meth. ed. Daniel. T. III. p. 101. (eclampſia a dentitione.)

Selle medicin. clinic. p. 371.

e) *Funiculi ſpermatici ligatura in caſtrationis encheireſi.*

Bromfield (Will.) Obſervations. T. I. p. 166, 336. (Nervum ſeparandum eſſe, priusquam arteria ſpermatica ligaretur.)

Dran (le) (meram arteriarum et non vaſis deferentis, et nervorum ligaturam ſuadet ex epilepſiae metu.)

Gooch (Benjam.) pract. Treatiſe on Wounds and other chirurgical ſubjects. Norwich. 1767. T. I. p. 429. (Arteriam ſolam eſſe ligandam.)

Guenel, in Journ. de Medec. T. L. p. 528. (funiculum non eſſe ligandum, ſed mere digitis premendum.)

Marſchall (F. G.) von d. Kaſtrazion. Salzburg 1791. 8. (Separationem funiculi ſpermatici usque ad annulum abdominalem neceſſariam eſſe ad avertendas convulſiones contendit.)

Pott (Percival), v. Waſſerbruch. Kopenhag. 1770. 8. p. 77.

Saviard Recueil d'obſervations chirurgicales. à Paris 1784. (funiculum eſſe torquendum.)

Schmu-

Schmucker, chirurg. Wahrnehmung. Th. II. p. 207. (Nunquam ex hacce cauſa motus vidit epilepticos ideoque totum funiculum ſpermaticum ſubligare ſuadet.)

Theden (J. C.), Neue Bemerk. aus der Wundarzn. Berlin 1771. 8. p. 41, 52, 58. (Pluries ex hacce cauſa obortam per totam vitam continuantem obſervavit epilepſiam, ideoque a ligatura plane abhorret, haemorrhagias agarico ſedare curans.)

White (C.) Caſes in Surgery. London. 1770. p. 53.

f) *Partus difficilis.*

Alberti Jurispr. medic. P. I. p. 80. (ventilatur quaeſtio: an foeminae ſub partus negotio in hunc morbum inclinent?)

A. N. C. Dec. II. Ann. II. obſ. 32.

Bagliv. prax. medic. p. 336.

Breslau. Geſchicht. Verſuch X. p. 607.

E. N. C. Dec. I. Ann. II. obſ. 67, 317. Schol. p. 535.

— — — Ann. X. obſ. 14.

— — Dec. III. Ann. VII. VIII. obſ. 124.

Engelmann D. de motibus convulſivis et partu difficili. Altdorf. 1752.

Gehler (J. C), rſp. J. G. Gutſch, D. de eclampſia parientium gravi morbo quidem nec adeo funeſto. Sectio prior pathologica, Lipſiae 1776. 4. Sect. II. therapeutica, rſp. C. A. Geriſcher. Lipſiae 1777. 4.

Fried (G. A.) Element. art. obſtetr. L. II. cap. 11.

Hofmann (G. F.), Verſuch einer Abhandl. über die Urſachen und Heilung der ſogenannt. Gichter bei Schwangern, Gebährenden und Kindbetterinnen. Frankf. am M. 1795. 8.

Mauriceau obſ. ſur la Groſſeſſe. à Paris 1728. T. II. obſ. 552.

Motte (de la) Traité des Accouch. L. III. Cap. XII. p. 307.

Pereboom, in Nov. Act. Nat. Cur. T. III. p. 20.

Petri (G. H. Ph.) D. de convulſion. gravidarum, parturientium et puerperarum. Gotting. 1790. 4.

Püzos Traité des Accouch. à Paris 1759. p. 172.

Röderer, Anfangsgr. der Geburtshülfe, überſ. von Henkenius, p. 402—406.

Sau-

Sauvages noſol. meth. T. III. p. 99. ed. Daniel.

Schafonski D. de gravid. partur. et puerper. convulſionibus. Argentorat. 1763.

Schenk Obſervat. Lib. I. obſ. 206.

Störch, von den Krankh. der Weiber. Gotha 1747. T. III. p. 126. et 240. T. V. p. 706.

Tiſſot l. c. p. 84. 85.

Zacut. Luſitan. Prax. admir. Lib. I. obſ. 26. 33.

Forſan variae hujusmodi epilepſiae obſervationes Sectioni, epilepſiam a congeſtione ſanguinis ad caput continenti, eſſent annumerandae: ſed cui hoc ſat ſatis diſtinguere liceat? Nec minus fere omnes de epilepſia ſic dicta pediſymptomatica enarratae obſervationes, quas infra, ubi de aura epileptica agitur, collexi et heic praecipue ad rubrum 2. a. fuiſſent collocandae. Probabile enim eſt, omnia hujus generis exempla locali cuidam vitio nervum laedenti aut prementi eſſe tribuenda. Sed meum omnino eſt, ab omni hypothetica deſiſtere via et tantum iſta, quae ocularis inſpectio et experientia ſat ſatis dilucidavit, ſuo quodam loco lectoribus tradere.

SECT. VI.

Nervorum minus diſtinctae affectiones.

1. *Titillatio.*

Robinſon new Syſtem of the Spleen, vapours etc. London 1729. 8. p. 148. ſqu. (primo paroxyſmo lethalis epilepſia inde orta.)

Swieten (van) Comment. etc. T. III. p. 415. (inde epilepſia ſaepe facileque rediens.)

Popularibus regionis noſtrae opinionibus quoque annumeranda eſt non contemnenda illa, infantes ob metum epilepſiae ſub planta pedis non eſſe titillandos.

2. *Mutationes tempore pubertatis corpus humanum afficientes.*

Beaumes l. c. p. 253.

Guenault (Fr.) et Ludov. Robillat Ergo epilepſiae aetatis mutatio. Pariſiis 1615.

Meza (S. Th. de) Obſervat. de adfectu ſpasmodico refractario, in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 265. (vidit epilepſiam in juvene

 XVI. an-

XVI. annorum eamque ex ſpermatis confectione proveniſſe cenſet. Omnia et methodica et empirica remedia quamvis recenti morbo incaſſum adhibuit.)

Stahl (G. E.) D. de haereditaria diſpoſitione ad varios affectus. Halae 1706. p. 48. (Omnes cujusdam familiae ac ſinguios, pubertatis tempore epilepſia laborantes, vidit.)

Tiſſot l. c. p. 205. §. 99. (Saepius ex hoc fonte epilepſiam obſervaſſe.)

Willis (Th.) Pathol. cerebr. Oxon. 1667. 4. p. 75.

3. *Coitus.*

Non de nimia veneris exercitatione, corpus paulatim labefaciente, ſermo eſt, de qua nobis infra (ſub rubro Evacuat. nimiae) erit loquendum. Forſan et hujus rubri varia exempla ſectioni, epilepſiam a ſanguinis congeſtione ad caput continenti, eſſent annumeranda. Nemo autem negabit, plerumque morbificum illum triſtemque coitus effectum vi in nervos agenti et nervos concuſſanti eſſe tribuendum.

Cole, in Phil. Transact. n. 174. p. 115. (tres dies poſt nuptias ſine alia explicabili cauſa in femina quadam epilepſia.)

Didier, in Quaeſt. med. an epilepſiae mercurius vitae.

Feurſtein (J. H.) D. de epilepſia. Gotting. 1792. p. 83. (in foemina, quotiescunque rem habuit cum marito.)

Galen. de loc. affect. L. V. c. 6. (in mare.)

Haller Elem. Phyſiol. T. VII. p. 567. (Exempla in coitu mortuorum.)

Lorry, vid. Beaumes l. c. p. 131. (nihil magis, quam coitum, epilepſiam excitare contendit.)

Sauvages noſol. method. Cl. IX. artic. 31. n. 6. (in mare ad unumquemque coitum rediens.)

Swieten l. c. T. III. p. 412. (in mare.)

Tiſſot l. c. p. 75. (per coitum aucta et poſt quemdam coitum.)

— — — p. 207. (foemina primo poſt nuptias die epileptica.)

Vater (E.), in E. N. C. Dec. III. ann. IX. obſ. 163.

4. *Praegnatio.*

A. N. C. Cent. I. p. 115. (conceptionis indicium eſſe epilepſiam.)

A. N.

A. N. C. Cent. IX. p. 296. (conceptioni ſuperveniens.)
Rhodius l. c. cap. I. obſ. 69.
Tiſſot l. c. p. 79.

5. *Graviditas.*

A. N. C. Dec. I. ann. III. obſ. 160. (ſimul foetum infeſtans.)
— — — — — obſ. 161. 162. (cum caecitate et ſtrabiſmo.)
— — Dec. II. ann. X. obſ. 72.
Comm. litter. nov. 1741. hebd. 40. p. 313.
E. N. C. Dec. I. Ann. III. obſ. 317.
— — Dec. II. Ann. X. obſ. 89.
— — Dec. III. Ann. IX. obſ. 208.
— — Cent. X. obſ. 27.
Fernel. pathol. L. V. cap. 3. in Opp. omn. Hanov. 1610. fol. p. 408. (multa de hac re obſervata.)
Gerber (Marc.), in E. N. C. Dec. III. Ann. X. obſ. 72.
Gulbrand, in Act. Soc. med. Havn. Vol. I. Havn. 1777. (absque foetus noxa.)
Hoechſtaetter obſerv. med. Dec. VI. caſ. 5. 6.
Hofmann (G. Fr.), Verſuch einer Abhandl. über die Urſachen und Heilmittel der ſogenannten Gichter bei Schwangern, Gebährenden, und Wöchnerinnen. Frankf. am M. 1795. 8.
Horſtii (Gregor.) obſervat. med. ſingul. L. IV. Ulm. 1625. 4. L. II. obſ. 21.
Jachini (Leonh.) Comment. in IX Libr. Raſis. Baſil. 1574. cap. 14. p. 132.
Jacotius (Deſider.), vid. Magni Hippocratis Coeca praeſagia c. Comment. Hollerii et Jacotii. Lugdun. 1576. fol. Lib. IV. Sect. 2. aph. 24. p. 675.
Mauriceau obſerv. ſur la Groſſeſſe. T. II. obſ. 552.
— — derniers obſervat. obſ. 93.
Meier, in Balding. N. Mag. f. A. B. IV. St. 6. p. 481. (lethalis.)
Motte (de la) Chirurgie complette, T. II. p. 422. obſ. 176. (mulier foetum maſculinum in utero geſtans epileptica, ſi autem foemininum, ab epilepſia plane libera.)

Petri (G. H. Ph.) D. de convulſionibus gravidarum parturientium et puerperarum. Gotting. 1790. 4.

Schafonsky D. de gravidarum etc. convulſionibus. Argentor. 1763.

Schenk (Joann.) obſerv. med. p. 120.

Seger (Georg.), in E. N. C. Dec. I. Ann. III. obſ. 160. (cum motibus foetus in utero vehementibus.)

Storch (Joh.), von den Krankh. der Weiber. Gotha 1747. T. III. p. 126. 240.

Tiſſot l. c. p. 80. ſqu.

Zacut. Luſit. prax. adm. L. I. obſ. 21. 29.

6. *Diſpoſitio ex epilepſia generata epilepſiam generans.*

Saepius jam obſervatum eſt, remota jam omni cauſa materiali remanere tamen talem ſyſtematis nervoſi habitum, ut a leviſſima ſaepius non detegenda cauſa morbus recurrat. Ex eadem quoque cauſa quaevis epilepſia quo diutius hominem infeſtat, eo difficilius evadit curatu.

Feurſtein (J. H.) D. c. p. 21.

Fiſcher (J. A.) D. de convulſionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erford. 1727. 4.

Kaempf l. c. p. 293. (Epilepſia ab irritatione nervi pollicis pedis orta ſublatoque irritamento tamen perdurans.)

Petit (Guil.) et Nicol. Rainſſant Ergo tantum ab habitu epilepſia. Pariſiis 1662.

Richter (A. G.) medic. chirurg. Bemerkung. B. I. Götting. 1793. Cap. 8. p. 130—143. (In epilepſia habituali paroxyſmos tantum ſupprimendos eſſe, ad quem ſcopum vomitorium ante paroxyſmum datum optimum praebere effectum.)

Rumpelt (C. A. F.) D. ſiſt. pathologiam epilepſiae. Lipſiae 1793. 4. pag. 34.

7. *Imitatio et ſimulatio epilepſiae tanquam verae epilepſiae cauſa.*

Cl. Cullen epilepſiae ab animi pathemate ortae annumerat quoque iſtam, ut ait, ſpeciem epilepſiae ſimulatae (the feigned epilepſy), quae jam diutius ſimulata talem ſyſtematis nervoſi habitum generavit, ut ad veri morbi gradum ſit perducta. Jam contigit mihi, varia hujusmodi triſtia obſervare exempla. Ad hanc ſpeciem ab aliis diſtinguendam aptiſſimum mihi vide-

videtur nomen: Epilepſia e ſimulata acquiſita. Optimo jure hisce annumerandas eſſe puto iſtas epilepſiae proximas terribilesque convulſiones non ſemper ſimulatas Quietiſtarum, Exorciſtarum, Schamanorum Sibiricorum, Fanaticorum Gebennenſium (Sauvages noſol. meth. III. p. 115.) et plurium varii hujus generis aut Enthuſiaſtorum aut impoſtorum.

Cullen, Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. Leipzig 1784. p. 157.
Metzger (J. D.), Syſtem d. gerichtl. Arzneiw. Königsb. u. Leipzig 1793. p. 320.

8. *Hyſterica paſſio.*

Epilepſia hyſterica. Epilepſia uterina (Sennert). Epilepſia ab utero (Johnſton).

Act. Berolin. Dec. I. Vol. II. p. 12. (poſt abortum.)
Act. Erud. Lipſ. Ann. 1712. Novemb. p. 520.
— — — Ann. 1727. Sptbr. p. 401. (cum amauroſi.)
Act. Nat. Cur. Vol. I. obſ. 25. p. 67. (cum amauroſi.)
Alberti Juriſpr. medic. P. II. p. 573.
Andree on hyſteric fits, p. 27. (hyſteriam ſaepius in epilepſiam tranſire.)
Bierling (C. Th.) Medicus theor. pract. Jenae 1697. 4. p. 466.
Binninger Obſerv. medic. Cent. III. obſ. 91.
Breslau. Geſchichte. Verſuch VII. p. 83.
— — — — Verſ. X. p. 607.
— — — — Verſ. XXVIII. p. 433.
Brunner (Balthaſ.) Conſil. med. ed. Laur. Hofmann. Halae 1617. 4. no. 13.
Büchner Miſcellan. 1730. p. 1478.
Buſch, in Balding. N. Magaz. f. A. B. X. St. 6. p. 566.
E. N. C. Dec. III. Ann. VII. VIII. obſ. 104.
Eikmeyer D. de epilepſia uterina. Ultraject. 1698.
Falk (J. G.) D. de epilepſia ſeu convulſivis motibus virginum. Gotting. 1754. 4.
Fonſeca Conſil. T. I. n. 15.
Foreſt. Obſervat. et Curat. L. X. obſ. 66.
Foucquet, in Journ. de Medec. T. LVI. p. 441.
Guarinoni Conſil. medica. Venet. 1610. fol. n. 179. et 495.

Gül-

Güldenklee (Balth. Timaei a) Caſus medicinal. Lipſiae 1691. 4. p. 27. 217.

Helwig (Joh.) Obſervat. phyſ. med. Auguſt. Vindel. 1680. 4. obſ. 56.

Hildesheim (Franc.) de cerebri et capitis morbis internis ſpicilegium. Francof. 1612. 4. p. 39.

Lottich (J. P.) Conſil. et obſerv. med. L. VI. Ulm. 1644. 4. p. 194.

Mercati (Lud.) method. medend. Francof. 1608. fol. L. II. cap. 5.

Mercurialis (Hieron.) reſponſ. et conſil. T. II. Venet. 1598. fol. n. 101.

Montani (J. B.) Conſultat. medic. ed. Donzellini, Baſil. 1557. 8. n. 43. 47.

Moor (Barthol. de) patholog. cerebri practica delineatio. Amſtelod. 1704. 4. cap. 5.

Mouram (Didacius) de paſſione hyſterica ſ. de epilepſia hyſterica. Orthoſii 1626. 4.

Nigriſoli (Franc. Maria) Tractatus varii ad recentiorum mentem concinnati. Ferrariae 1690. (Hyſtericum malum veram eſſe epilepſiam contendit.)

Nunn (A.) D. de epilepſia uterina. Erford. 1764.

Piſo (Car.) de morbis e ſeroſa colluvie. n. 24 — 32.

Pomme von den Nervenkrankh. beider Geſchlechter; a. d. Franz. v. Gladbach. Breslau u. Leipzig 1775. p. 124.

Riedlin (Vit.) Obſervat. med. Cent. III. Auguſt. Vindel. 1691. 12. obſ. 52.

Riverii (Lazar.) Obſervat. med. Cent. II. n. 31.

— — — Obſervat. commun. p. 466.

Rubaei (Franc.) exercitat. nocturn. Genuae 1622. 8. p. 45.

Sauvages noſolog. method. ed. Daniel. T. III. p. 115.

Schulze D. caſus hyſterico-epileptici reſolutio. Halae 1736.

Smetii (Henr.) Miſcell. med. Francof. 1611. 8. p. 214. 311.

Tulpii (Nicol.) Obſervat. med. Amſtelod. 1672. 8. Lib. I. cap. 10.

Wedel D. de epilepſia hyſterica. Jenae 1676.

Welſch. Hecatoſt. II. p. 49.

Wepfer Obſervat. p. 590. (ſimul cum mania.)

Zacut. Luſitan. de medic. princip. hiſtor. L. VI. Amſtelod. 1641. 8. Lib. I. hiſt. 32.

Zechii (Joann.) Conſult. medicin. Francof. 1650. 8. n. 92.

9. *Hypochondriaca paſſio.*

Cumme (A. H.), in Act. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. obſ. 85.

Moor (Barth. de) l. c. cap. VI.

Rhodius Cent. I. obſ. 56.

Sylvatici (Bened.) Mercurius compilat. Artic.: Epilepſia. §. 40.

Tilemann (Ad. cognomine Schenk) D. de epilepſia hypochondriaca. Lugd. Bat. 1677.

10. *Idioſyncraſia.*

Act. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX. X. obſ. 92. p. 170. (ab odore ranunculi hortenſis.)

Ammann Medicin. critic. Conſil. 59 (a ſebi et candelae fumantis foetore.)

Beaumes l. c. p. 84. (in juvene quoties oryzam coctam comedit.)

Büchner (J. P.) D. de rachitide perfecta. Argentorati 1755. (in infante ex adſpectu cujusvis ſubjecti rubri.)

Clerc (Gabr. le) Medicus veri amator. p. 139. (ab odore cannabino; it. ab odore Raphani.)

E. N. C. Dec. II. ann. VII. app. p. 133. (a plumis paſſerum in lecto.)

Hannes (Chr. Rud.) über d. Frieſel. Weſel u. Leipzig 1770. (ab adſpectu coloris rubri excitata epilepſia.)

Paullini Cent. I. obſ. 75. (a paſſerum plumis in vitta applicatis.)

— — Lagograph. p. 206. (ab adſpectu leporis, etiam picti.)

Riedlin. Curat. med. curat. 607. (a capite vitulino comeſto.)

Rondelet (Guil.) Method. curand. morbor. Pariſiis 1576. 8. Lib. I. cap. 36. p. 170. (dare homines, qui ab aurium etſi levi refrigeratione epilepſia infeſtantur ideoque hoc incommodum ſerici aurem leviter claudentis ope evitare ſtudent.)

Sauvages l. c. T. III. p. 117. (In muliere, quoties templum ingreditur.)

Schenk Obſervat. L. I. obſ. 117. (a quovis lentium eſu.)

Schubart Medicin. ſeptentrional. Cap. XI. p. 111. (a gratis et ingratis odoramentis pari modo reſuſcitata.)

Tiſ-

Tiſſot l. c. p. 158. (a potu Chocolatae aut Vini.)

Timaeus a Güldenklee l. c. L. VII. caſ. VIII. p. 314. (ab odore foliorum Juglandis.)

SECT. VII.

Plethora et ſanguinis congeſtiones ad caput.

Armot, in Journ. de Medecine, pr. Mſr. Bacher. T. XCI. à Paris 1792. (Epilepſia a tumore glandularum et membranarum trachealium ſanguinis a capite defluxum impedientium.)

Baldinger von d. Krankheit. einer Armee. Th. I. cap. 4. (a congeſtione ex refrigeratione.)

Beaumes l. c. p. 115.

Benivenius de abditis ac mirandis morborum cauſis. Florent. 1502. 4. Cap. 46.

Bierling. adverſar. curioſa. Jenae 1679. 4. p. 218. (a motu nimio.)

Braſſavola (Ant. Muſ.) Comment. in Hippocratis aphoriſm. Baſil. 1541. fol. p. 152. (a potu vini cyprici.)

Comm. litter. Noric. 1736. p. 154. (a potu ſpiritus frumenti in puero trienni.)

Dolaei (Jo.) encyclopaedia medica. Francof. 1691. 4. pag. 126. (a refrigeratione.)

— — — — p. 127. (a vini fortis potu.)

Drelincourt, v. Bonet l. c. obſ. 6. p. 294. (a motu nimio brevi poſt prandium immodice ſumtum.)

E. N. C. Dec. II. Ann. II. obſ. 160. (a refrigeratione.)

Foreſt. (P.) l. c. L. IX. obſ. 27. (ab ebrietate.)

Frankfurt. mediz. Wochenbl. 1782. no. 4.

Gabelchover (Oswald.) curat. et obſervat. Cent. VI. Tubingae 1617. 8. p. 125. (ab ingurgitatione vini.)

Greding l. c. p. 131. (a ſpiritus frumenti nimio potu.)

— — — p. 303. (in variis epilepticorum cadaveribus vaſa cerebri ſanguine turgeſcentia.)

Hagedorn, in Medicin. ſeptentrion. T. I. Cap. XIX. p. 115.

Heers (ab) l. c. obſ. 24. (plures epilepticos ob vini potum conſuetum non poſſe ſanari.)

John-

Johnſtone, in Medic. Obſerv. and Inquiries. Vol. II. n. 6. p. 115.

Ledel (Sam.), in E. N. C. Dec. II. Ann. VIII. obſ. 85. (a frumenti ſpiritu uberius ſumto caecitas, epilepſia et mors.)

Levret Traité des Accouch. p. 224.

Lieutaud l. c. Vol. II. p. 381. obſ. 235. Obſ. Bartholini.
— — — — — obſ. 236. Valſalva.
— — — — p. 392. obſ. 272. Act. Lipſienſ.
— — — — p. 394. obſ. 280. Sponius.
— — — — p. 395. obſ. 282. — —
— — — — p. 399. obſ. 301. Act. Londinenſ. (in variis epilepticorum cadaveribus vaſa cerebri ſanguine turgeſcentia.)

Löffler Beiträge z. Arzneiw. und Wundarzneiw. Th. I. Leipzig u. Altona 1791. (Calidius clima exacerbare obſervavit. Epilepticus quidam, qui vix uno per ſingulos menſes paroxyſmo affligebatur, tricies intra XII horarum ſpatium eo corripiebatur, quum navis, in qua aegrotus erat, aequatori appropinquaret. In Europam redux ſexto quovis menſe una morbi acceſſione vexatus eſt. v. Richter chir. Bibl. B. XII. p. 327.)

Marcard (H. M.) über d. Natur u. Gebrauch der Bäder. Hannover 1793. p. 410. 411. (a balneo frigido.)

Mekel Recherches etc. in Mémoir. de Berlin. 1760. Obſ. 10.

Meza (Sal. Theoph. de), in Coll. Societ. med. Havn. T. I. Havniae 1774. n. 19. p. 154. (a ſaturatiſſimo Coffeae potu lethalis epilepſia.)

Mithof (H. B.) D. de ſede irritamenti in epilepſia. Gottingae 1788. p. 14. (ab ebrietate conſueta.)

Morgagni l. c. Epiſt. IX. §. 12 et 14.

Pelargi medicin. Jahrgänge. Vol. II. p. 183. (a potu ſpiritus vini.)

Ramel Epiſt. ad Dr. Percy de ebrietate cum convulſionibus, in Journ. de Medec. 1793. Aout, n. 2.

Richard (Nicol.) et Phil. Caron, Ergo epilepſiae venarum jugularium ſectio. Pariſ. 1689.

Riedlin (Vit.) Obſervat. med. Cent. III. Auguſt. Vindel. 1691. 12. obſ. 90. p. 216. (a ſpiritus vini potu.)

Saillant, in Mémoir. de l'Acad. d. Sc. à Paris. ann. 1779—1782. T. III. (epilepſia a vera humorum abundantia.)
Saur, in Vetensk. Acad. Handling. Vol. XXXIV. Stockholm. 1773. pag. 92.
Sauvages l. c. p. 102. 113.
Schenk l. c. L. I. obſ. 218. — ex Benedicto. — (ab ebrietate.)
Schneider de Catarrhis, p. 234.
Severini (Marc. Aurel.) de efficaci medicina L. III. Francof. 1671. fol. p. 42. (epilepſia a ſpirituoſorum potu aucta.)
Sponius, in Act. Erud. Lipſ. Ann. 1682. vid. Bonet l. c. T. I. pag. 299.
Tiſſot l. c. p. 121 et 152.
— — — p. 125. (a vini potu et motu nimio.)
— — — p. 136. (a vini potu immodico.)
— — — p. 153. (ab exercitatione nimia in hypocauſto nimis calido.)
— — — p. 155. (a nimio labore.)
— — — p. 157. (a refrigeratione extremitatum inferiorum in aqua frigida.)
Tralles uſ. opii. Pars III. Cap. I. p. 23.
(1. a congeſtione ad caput, ira et motu excitata.)
(2. a congeſtione ad caput ex vita ſedentaria, potu cereviſiae nimio, et frequentiore ciborum aſſumptione.)
p. 32. (epilepſia a vini potu aucta.)
Untzer (Matth.) ἱερονοσολογία. p. 102. (a motu nimio.)
Wedel, in Act. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. obſ. 160. (a congeſtione ex refrigeratione.)
Wiel (Corn. Stalpart. van der) Obſervat. med. Cent. II. Leidae 1687. 8. Obſ. 15. Scholion, p. 177. (a nimio calore.)
Zacut. Luſitan. Prax. admir. L. I. obſ. 21. (a plethora univerſali.)
— — — — obſ. 27. (a plethora in gravida.)

SECT.

SECT. VIII.

Evacuationes nimiae.

1. *Sanguinis.*

Baumer (J. W.) Diſſ. cit. p. 24.

E. N. C. Dec. III. Ann. V. VI. obſ. 263.

Hagendorn (Ehrenfr.) Obſervat. et hiſtoriar. medico-pract. Cent. II. Rudolſtad. 1698. 8. p. 54. (a narium haemorrhagia.)

Hippocratis aphoriſm. Sect. VII. aphor. 9.

Jacquinelle, in Journ. de Medecine. T. LXXIV. Juillet—Septembre. à Paris 1790. (Cl. Richter in Chir. Bibl. T. XI. p. 551. huncce epilepſiae caſum aut terrori aut immodicae venaeſectioni tribuit.)

Morgagni (J. B.) l. c. Lib. I. Epiſt. X. art. 21.

Paul. Aegineta L. III. cap. 19.

Pew (Rich.) Skizzen a. d. Heilkunde. p. 23. ſqu.

Sauvages l. c. T. III. p. 102.

Schroeder D. de convulſionibus ex haemorrhagia nimia oriundis. Marburg. 1752.

2. *Sudoris.*

E. N. C. Dec. III. Ann. II. obſ. 46.

Gabelchover l. c. Cent. IV. curat. 59.

3. *Seminis.*

Fonte (Lael a) Conſult. medic. Venet. 1608. fol. n. 95.

Gaſſeri (Achill. Pyrmin.) Curat. et obſervat. med. una cum Welſchii conſiliis edit. 1668. obſ. 3.

Gazette de Santé 1783. n. 4. p. 13, 76.

— — — — 1784. p. 169. (ab onania.)

Heers (Henr. ab) Obſervat. med. p. 176.

Hofmann (Fr.) Tr. de morbis a nimia et intempeſtiva venere oriundis. Halae 1725. 4.

Journal de Medec. milit. T. II. p. 346. (ex onania.)

Krauſe Beobacht. einer Epilepſie von Onanie, im mediz. Wochenbl. v. Dr. Müller u. Hofmann. Frankf. a. M. 1792. p. 454—460.

Marx (M. J.) beſtätigte Kräfte der Eicheln. Hannov. 1781. p. 24 et p. 35. — Obſervatio Cl. Bloch. — (ex onania.)

Quarin (Joſ.) animadv. med. p. 29. (ab onania cum mucoſi e genitalibus humoris effluxu.)

Reinold, in Samml. auserl. Abhandl. für pr. Ärzte. B. XIII. p. 681.

Schenk l. c. Lib. I. obſ. 208. (ex Alsharavio.)

Sinibaldi (J. Bened.) γενεανθρωπολίας, ſ. de hominis generatione decateuchon. Romae 1642. fol. p. 718. (varia exempla epilepſiae ex immodica venere.)

Tiſſot l. c. T. II. p. 453, 461, 634. (ex onania.)

Zimmermann von d. Erfahrung. Zürch 1764. Th. II. p. 403. (ab onania.)

4. *Seri et muci.*

Feurſtein (J. H.) Diſſ. cit. p. 83. (in femina ab onania.)

Hagendorn l. c. Cent. I. hiſtor. 21. p. 36. (lethalis epilepſia a purgatione nimia.)

Ranoe (A. B.), in Act. Soc. med. Havn. Vol. II. Havn. 1791. 8. p. 108. (a purgatione nimia.)

Tiſſot l. c. Th. V. p. 86. not. 26. (a fluore albo maligno.)

SECT. IX.

Retentio et ſuppreſſio evacuationum naturalium et praeternaturalium.

1. *Haemorrhagiarum variarum.*

Act. Berolinenſ. Dec. I. Vol. II. p. 12. (e retento ſanguine poſt abortum.)

Gabelchover l. c. Cent. II. p. 54.

Hagendorn l. c. Cent. I. hiſtor. 20. p. 35. (a haemorrhagia narium ſuppreſſa.)

Hemmann (J. A.) chirurg. Aufſätze. Berlin 1778. 8. (aut a ſubito ſuppreſſa narium haemorrhagia aut a terrore epilepſia.)

Riedlin (Vit.) Lineae medic. 1695. p. 454.

Tiſſot l. c. p. 134. (a narium haemorrh. ſuppreſſa.)

2. *Men-*

2. *Menſtrui fluxus.*

Baumer Diſſ. cit. p. 23.
Binninger (Joh. Nicol.) obſerv. medic. Cent. V. Mont. belg. 1673. 8. Cent. II. obſ. 99.
Boueix, in Journ. de Medec. T. XXX. p. 440.
Brendel Opuſcul. T. I. p. 178.
E. N. C. Dec. I. Ann. I. obſ. 86.
— — — Ann. III. obſ. 259.
Falk D. de epilepſia ſ. motibus convulſivis virginum. Gotting. 1754. 4.
Feller (C. G.) D. de therapia per electrum. Lipſ. 1785. p. 23.
Franklin, in London. Magazin. May, 1757. p. 211.
Greding l. c. T. I. p. 17.
Guigou, in Journ. de Medec. T. XLIX. p. 427.
Güldenklee (Tim. a) oper. omn. Lipſ. 1677. 4. p. 27, 314.
Heer (Henr. ab) Obſervat. n. 24.
Helwig obſervat. phyſ. medic. poſthum. ed. Luc. Schroekh. Auguſt. Vindelic. 1680. 4. p. 74.
Langii opera omn. Vol. III. p. 62, 63.
Mangin hiſtoire generale de l'Electricité, T. III. à Paris 1752. 12. pag. 85.
Nunn D. de epilepſia uterina. Erford. 1764.
Paulini (C. F.) ſacra herba, ſ. nobilis ſalvia. Auguſt. Vindelic. 1688. 4. p. 127.
Plater (Fel.) Obſervat. Baſil. 1614. Lib. I. p. 19.
Regii (Henr.) praxis medica. Ultraject. 1657. 4. Lib. I. fol. 36.
Riedlin obſerv. med. Cent. III. obſ. 43.
Sauvages l. c. p 115.
Sigwart D. ſiſt. caſum puellae poſt menſium ſuppreſſionem epilepticae. Tubing. 1780.
Spengler (Lor.) Briefe und Erfahrungen über die Würkungen der Electricität in Krankheiten. B. IV. Kopenhag. 1754. p. 39.
Swieten (G. van) Comment. T. III. p. 447.
Tiſſot l. c. p. 131. ſqu.
Walther (C. L.) obſ. med. chir. Lipſ. 1715. 8. obſ. 58.

Welſch

Welſch (G. H.) Sylloge curat. et obſerv. med. Auguſt. Vindelicor. 1667. 4. Dec. IV. n. 6.

Wilhelm (H. M.) Diſſ. ſiſt. obſervat. electrico-medicarum ſemicenturiam. Wirceburg. 1774. p 148.

Willis (Thom.) Patholog. cerebri. Oxon. 1667. 4. p. 96.

3. *Haemorrhoidum.*

E. N. C. Dec. III. ann. I. obſ. 119.

Gazette ſalutaire de Bouillon, 1775.

Langlois (Flor.) et Euſeb. Renaudot D. ergo epilepſiae et melancholiae haemorrhoides ſalutares. Pariſiis 1640.

Rhodius l. c. Cent. I. obſ. 65.

Tiſſot l. c. p. 133. et nota translatoris n. 9.

Zacut. Luſitani prax. admir. P. I. obſ. 25 et 28.

4. *Lochiorum.*

E. N. C. Dec. III. ann. II. obſ. 100.

Greding l. c. T. I. p. 56.

Güldenklee (Timaei a) oper. omn. Lib. I. ep. X. p. 476.

5. *Alvi.*

E. N. C. Dec. I. ann. I. obſ. 88. (diarrhoea ſuppreſſa.)

Gabelchover l. c. Cent. II. obſ. 38. (obſtruct. alv.)

Hollerii Comment. in coacas Hippocratis, p. 876. (dyſenteria ſuppreſſa.)

Medicina ſeptentrion. collatitia, T. I. pag. 26. (diarrhoea ſuppreſſa.)

Tiſſot l. c. p. 61, 133.

Tulpii Obſervat. Lib. I. obſ. 11. (obſtruct. alv.)

6. *Seminis.*

Ackermann in annot. ad l. c. Tiſſoti, n. 25, 26.

Bonet Sepulchret. anatom. Lib. I. Sect. II. obſ. 44.

Frank (J. P.) Syſtem der med. Poliz. T. I. p. 118. ſqu.

Krünitz D. de matrimonio multorum morborum remedio. Francof. ad Viadr. 1749. 4. p. 21.

Stahl Theoria medicin. ver. p. 1355. (deliria et epilepſia cum priapiſmo pollutionibus ſanantur.)

Stege-

Stegemann (Ambroſ.), in E. N. C. Dec. III. Ann. V. VI. obſ. 12.

Virideti (Jo.) Tractat. nov. de prima coctione, praecipue de ventriculi fermento. Genevae 1691. 8. p. 305. (a caſtitate poſt frequentem coitum.)

Zacut. Luſitan. Prax. adm. L. II. obſ. 119. (a caſtitate poſt frequentem venerem. Semen acre poſt mortem in vaſe deferente repertum.)

7. *Salivae.*

Tiſſot l. c. Th. V. p. 138.

8. *Urinae.*

Baumer Diſſ. cit. p. 21.

Graff (Sigism.), in E. N. C. Dec. III. Ann. II. obſ. 212.

Heurnius (Jo.) de morbis, qui in ſingulis partibus capitis inſidere conſueverunt. Lugd. Batav. 1594. 4. Cap. XXII. p. 234.

Hoechſtaetter obſ. med. rarior. Dec. V. Baſil. 1627. 8. p. 695.

Sauvages l. c. p. 102.

Schneider de catarrh. p. 244.

Tiſſot l. c. p. 138.

Wedel, in E. N. C. Dec. I. ann. III. obſ. 15.

Zacut. Luſitan. Prax. admir. L. I. obſ. 35.

9. *Tranſpirationis.*

Baldinger von d. Krankh. einer Armee, Th. I. cap. 4.

Baumer Diſſ. cit. p. 21.

Benivenius (Ant.) de abdit. morborum cauſis. cap. 46.

Dolaei Encyclop. medic. p. 126.

E. N. C. Dec. II. Ann. II. obſ. 160.

— — Dec. III. Ann. III. obſ. 106.

Monro (Donald) Account of Diſeaſes moſt frequent in the Britiſh military hoſpitals. p. 237.

Riedlin Lin. med. Ann. I. Auguſt. obſ. 6. p. 232.

10. *Ulcerum conſuetorum exſiccatio.*

Amati Luſitani curation. medicinal. Centur. altera. Venetiis 1552. 12. hiſtor. VI. (in crure.)

Bartholin (Thom.) hiſtor. medic. Cent. XXX. hiſt. 20. (in crure.)

Bres-

Bresl. Samml. 1721. p. 661.
— — — 1725. p. 532.
E. N. C. Dec. II. Ann. VI. obſ. 201.
— — — Ann. VII. obſ. 144.
Fabricii Hildani Obſervat. Cent. II. obſ. 10. (in crure.)
Lentilii (Roſin.) Miſcellan. med. pract. P. I. Ulm. 1698. 4. p. 3. (in crure.)
Miſcell. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. obſ. 29. (in crure.)
Pechlin (Joh. Nic.) Obſervat. phyſico-med. L. III. Hamburg. 1691. 4. Lib. II. obſ. 30.
Pouteau Oeuvres poſthumes. T. II.
Riedlini (Vit.) Curat. medicin. millenar. Ulm. 1709. 4. p. 88, 574. (pone aures.)
Tulpii Obſervat. L. I. cap. 8. (in capite.)
Zacut. Luſitan. Prax. adm. L. I. obſ. 32. (in lepore naſi.)

11. *Vulnerum praecox occluſio.*

Jacquinelle, in Journ. de Medec. T. LXXIV. à Paris 1790. (poſt vulneris in amputatione facti occluſionem. v. Richt. chir. Bibl. B. XI. p. 457.)
Marchettis (Petr. de) Obſervat. chirurg. Patav. 1664. 8. (Capitis vulnus.)

12. *Variarum.*

Ackermann (J. C. H.) mediz. Skizzen. Heft II. Leipzig 1790. p. 70. (Metaſtaſin lacrymarum ad cerebrum ſtatuit indeque epilepſiam infantum a fletu prohibito derivat.)
Demerehenc de la Conſeillere D. de auditu. Ultraject. 1710. (ab aurium fluxu ſuppreſſo.)
Tiſſot l. c. p. 88. (a ſuppreſſione ſputi purulenti.)

SECT. X.

Ventriculi et abdominis vitia-organica.

Bartholin. hiſtor. anat. Cent. V. hiſt. 61. (renum.)
Beaumes l. c. p. 245. (a lapſu ſcrobiculum cordis laedente.)
Bonet Sepulchr. anat. L. I. Sect. XII. obſ. 42. (Lien ſcirrhoſum.)

Bres-

Bresl. Geſchicht. Verſ. XII. p. 445. (invaginatio ilei in infante.)
Bresl. Samml. 1725. April, p. 421. (carnoſum concrementum in inteſtinis.)
Delii (H. F.) amoenit. medic. Lipſ. 1745. 8. Dec. 5. in praefatione. (Foramen oris calloſis floreni magnitudine prope pylorum.)
E. N. C. Dec. II. ann. II. obſ. 152. Schol. (globuli pingues inteſtinis adhaerentes.)
Galen. de loc. affect. L. V. cap. 6. ed. Chart. T. VII. p. 493.
Graef (Jo. Paul.) D. ſ. caſum de motibus epileptico-convulſivis herniae incarceratae ſupervenientibus per venaeſectionem ſublatis. Altorf. 1747.
Harder Apiarium. Baſil. 1687. 4. obſ. 99. (inteſtina tenuia eroſa.)
Hollerii opera omnia. Cap. XVI. Schol. p. 105. (Lien obſtructum.)
Journal de Medec. T. LXXXI. Novembr. 1789.
Morgagni de ſedib. et cauſ. morb. Ep. LXII. art. 2.
Rhodius l. c. Cent. I. obſ. 61. (Meſenterii vitium.)
Schenk Obſervat. Lib. I. obſ. 193. (Lienis.)
Schmucker Wahrnehm. Th. II. p. 183. (hydrocele.)
Sorbait (Paul. de) univerſa medicina theoret. et pract. Norimb. 1672. fol. p. 115. (Ventriculus eroſus et perforatus in puero.)
Tiſſot l. c. p. 57. (Cardiae ulcus carcinomaticum.)
— — — p. 73. (Ulcus veſicae urinariae.)
Tulpii Obſervat. L. I. obſ. 9. (Lienis.)
Welſch Hecatoſt. II. obſ. 79. p. 49. (hepatis.)

SECT. XI.

Impuritates primarum viarum.

Aëtius, in Tetrabibl. II. Serm. II. c. 13. 17.
— — — — III. Serm. I. cap. 18.
Alexand. Trallian. Oper. Baſil. 1556. fol. T. I. cap. 15. pag. 62. (biliofae.)
Bang (Fr.), in Act. Havn. T. I. p. 98. (biliofae.)
Beaumes l. c. p. 80, 106. (ab oleoſorum eſu.)
Boerhave de morb. nervor. p. 433. (bilioſae.)
Bonet Medicin. ſeptentr. L. I. Sect. XIV. cap. 1. Tom. I. p. 105.

Bonet Sepulchret. anat. Lib. I. Sect. XII. obſ. 40.
— — — — addit. obſ. 9.
Brückmann (C. P.) Enarratio choreae S. Viti et epilepſiae. Francof. 1786. 8. (Epilepſia a ſordibus putridis cum humeri luxatione periodica.)
Brunneri (Balthaſ.) conſil. medic. Halae 1617. 4. conſ. 21.
Burggrav auserleſene mediz. Fälle und Gutachten. Frankfurt 1784. 8. p. 114. (a pituita abundante.)
Chiflet (Jo.) ſingulares ex curationibus et cadaverum ſectionibus obſervationes. Pariſiis 1611. 8. p. 115.
Cledet (du) Ergo ab humore clioſo epilepſia. Pariſiis 1645.
Dolaei Encyclop. medica. p. 119. (a lacte matris corrupto in infante.) p. 127. (a braſſica ſale condita.)
E. N. C. Dec. I. Ann. VI. VII. obſ. 187.
— — — — — obſ. 201. (Meconium.)
Engelhard (J. P.) D. ſiſt. morbos hominum a prima conformatione usque ad partum. Jenae 1792. p. 18. (Epilepſia a nimia preſſione regionis umbilicalis indeque orta bilis effuſione.)
Fernel oper. omn. p. 668. Conſil. 7.
Feurſtein Diſſ. cit. p. 37. (a bile corrupta.)
— — — — p. 84. (a lacte nutricis iratae.)
Foreſt. Obſervat. L. X. obſ. 57. Scholion. (ab eſu anguillae.)
— — — — obſ. 64.
Fothergill medic. and philoſoph. Works. London 1781. p. 21. ſq.
Frankenau Satyrae medicae. p. 153. (a nimio anguillae eſu.)
Gabelchover l. c. Cent. IV. p. 117.
Galen. Comm. in Hippocr. aphoriſm. L. V. aph. I. ed. Charter. T. IX. P. II. p. 195. (a mala ventriculi digeſtione.)
— — p. 296. (a colluvie billoſa.)
Guarinoni (Chrph.) Conſilia medicinalia. Venet. 1610. fol. Conſ. 1. 8.
Haebert (Fr. Xav.) de febrib. annuis etc. Monach. 1784. 8. p. 75. (Epilepſiam, durante conſtitutione bilioſa, eſſe bilioſam.)
Heineke, v. Beaumes l. c. p. 59. (Lac nutricis iratae.)
Hildesheim (Franc.) de cerebri et capitis morbis internis ſpicilegia. Francof. 1612. 4. p. 599. (ab eſu pomorum et lactis.)

Hip-

Hippocrates Epidem. L. VI. cap. 54. ed. Foeſ. p. 1201. (a bilioſa ſaburra epilepſiam oriri.)
Hofmann (Fr.) Medic. rat. ſyſtem. Supplem. p. 50. §. 4. (meconium.)
— — —. Tr. de uſu et abuſu medic. chym. p. 49. (lac matris nimis pingue.)
Kaempf (J. G.) von einer neuen Methode die Krankheiten des Unterleibes zu heilen. 2te Aufl. Leipzig 1786. 8. p. 427, 445. (ab infarct. bilioſ.)
Kaltſchmidt D. de convulſionibus ex atra bile. Jenae 1758.
Kanold, in Breslau. Samml. Verſuch XII. p. 405.
Maſſaria (Alexand.) reſponſa et conſilia diurnalia. Venetiis 1613. fol. Conſ. 13.
Meibom (Brandan.) D. de epilepſia ſtomachica. Helmſtad. 1740.
Mithof (H. B.) D. de ſede irritamenti in epilepſia. Gotting. 1788. 4. p. 12.
Moebii (Gothofr.) fundament. phyſiolog. Francof. et Lipſiae 1678. p. 397. (colluvies bilioſa.)
Montagnana (Barthol. de) Conſilia medica. Venet. 1497. fol. Conſ. 43.
Nov. Act. Nat. Cur. Vol. III. obſ. 80.
Paullini (C. F.) Anguilla. Lipſiae 1689. 8. p. 183. (ab anguilla comeſta.)
Pechlin Obſervat. L. II. obſ. 29. p. 282. (a nimia flatulentia.)
Pietſch von den Ohnmachten und Convulſionen, vornehmlich der fallenden Sucht. Hamburg u. Leipz. 1753. 8. — paſſim. — (praecipuam epilepſiae cauſam in vitiis gaſtricis latere contendit.)
Piſo (Carol.) de morbis a colluvie ſeroſa. Pont-a-Mouſſon. 1618. p. 47. (ab aquae larga copia in ventriculo.)
Rahn de conſenſu. P. III. p. 114. (a ſordibus bilioſis.)
Reneaume (Paul.) ex curationibus obſervationes. Pariſ. 1606. 8. obſ. 47.
Rhaſes Continens L. V. cap. 1. fol. 96. a.
Roſenau (Laur. Scholz. a) Conſilia medica Cratonis aliorumque Cl. Virorum. Francof. 1598. fol. Conſ. 379.
Rümler l. c. obſ. 69. (a fragis large comeſtis.)
Salmuth Obſerv. med. Brunsuic. 1648. p. 35. (colluvies bilioſa.)
Sauvages l. c. p. 101. n. 5. — p. 114. n. 3.
Schenk Obſervat. Lib. I. obſ. 191. 192.
Smetii (Henr.) Miſcellan. medic. Francof. 1611. 8. p. 93.

Starke Archiv für d. Geburtsh. B. I. St. IV. p. 189. (colluv. bilioſa.)
Stoll Ratio medend. P. VII. p. 298.
Storch Abhandl. v. d. Kinderkrankheiten, B. II. p. 92.
Swalwe (Bernard.) querelae et opprobria ventriculi reſpectu abuſus tam diaetetici quam pharmaceutici. Amſtelod. 1665. 12. p. 248.
Thielow, in Comm. praelect. D. 11. Mai. 1794. in ſocietate Erfordina von den der Geſundheit nachtheiligen Folgen der Furcht. v. Mediz. chirurg. Zeit. 1794. B. II. p. 94. (Epilepſia in infante a lacte matris gravi timore affectae.)
Thomaſius (G.), in E. N. C. Dec. III. Ann. III. obſ. 191. (dulciaria infantum.)
Thoneri (Auguſt.) de admirandis convulſivis motibus Libri IV. Ulm. 1651. 4. obſ. 3. 4. p. 93.
Tiſſot l. c. p. 39, 54. ſqu.
Trincavella (Victor.) conſil. medic. Baſil. 1587. fol. Conſ. 10. 12.
Unzer, der Arzt, B. V. p. 520. ſqu. (vitium digeſtionis ſpecificum.)
Valleriola (Franc.) Obſervat. medicinal. Lib. VI. Lugdun. 1573. fol. Lib. VI. obſ. 7.
Woodward (John) Select caſes and conſultations in Phyſik. London 1737. 8. p. 313. (bilioſa ſaburra.)
Zacut. Luſitani Prax. admir. L. I. obſ. 21.
Zückert mediz. Tiſchbuch, p. 178. (a ciborum ſale nimis conditorum eſu. — Knolle, Schaarſchmidt.)

SECT. XII.

Vermes in ventriculo et tubo inteſtinali.

Ackermann (J. G.) D. de epilepſiae motuumque convulſivorum infantum cauſis praecipuis. Gryphiae 1765. 4. §. 7.
Act. Nat. Curioſ. Vol. VI. obſ. 127.
— — — Vol. VII. obſ. 19.
Baldinger von den Krankheit. einer Armee. 2te Aufl. Kap. 3. p. 174.
Bartholin Hiſtor. anatom. Cent. IV. hiſt. 7.
Cent. VI. hiſt. 20.
Baumer, in Diſſ. cit. p. 26.

Beau-

Beaumes l. c. p. 191. ſqu. — p. 331.

Blumenbach medicin. Bibl. B. II. p. 257.

Boſch (Jo. Jac. van den) hiſtoria conſtitutionis epidemicae verminoſae. Lugd. Bat. 1769. 8. p. 132.

Bündell D. ſ. obſervat. morbor. rar. vid. Vogels kleinere academiſche Schrift. n. 2.

Commerc. litter. Noric. Ann. 1735. p. 314.

Comte (le), in Journ. de Medecin 1790. Juillet, n. 4. (taenia.)

Doevern (van) Abhandl. von den Würmern in den Gedärmen. Leipzig 1776. 8. p. 239.

Dupan, in Journ. de Medec. 1789. Septbr. n. 1.

E. N. C. Dec. I. Ann. VI. obſ. 187.

— — Dec. II. Ann. VII. obſ. 135. Schol. 189.

— — — Ann. X. obſ. 166.

— — Dec. III. Ann. II. obſ. 133.

— — — Ann. III. obſ. 191.

Foreſt. (Petr.) Obſervat. L. X. obſ. 64.

Gockelii (Eb.) Conſil. et obſerv. Decad. VI. Auguſt. Vindel. 1683. 4. Dec. IV. obſ. 8. (Animalculum lacertiforme per alvum egeſtum.)

Gordack Geſchichte der Krankheit und Kur eines ſiebzehn Jahre mit der Epilepſie geplagten Frauenzimmers. Königsberg 1770. (vermes in ventriculo.)

Güldenklee (Timaei a) l. c. L. VII. caſ. 19. p. 324. (hirudines deglutitae.)

Hamburg. Magaz. B. XV. Hamburg 1755. 8. p. 313.

Hauteſierk (Rich. de) Recueil etc. T. II. p. 443.

Heers (Henr. ab) obſ. med. p. 280.

Heiſter (Laur.) med. chirurg. Wahrnehm. p. 64.

— — — comp. medic. pract. Cap. XIV. §. 55.

Hirſchel (Leonh.) Gedanken üb. die Heilart der fallenden Sucht. Mietau 1774. 8. (paſſim.)

Horſt (G.) epiſtol. medicinal. Sect. VII.

Jaeniſch D. ſ. pentas obſervationum medicarum. Halae 1768. vid. Balding. Auszüg. Th. I. p. 119.

Lachmann (Joſ.) obſervat. nonnull. pract. Regiomont. 1783. p. 46.

Loeff-

Loefflers Beiträge. B. II.
Mack (J. C.), in E. N. C. Ann. X. obſ. 103.
Medical obſervat. and Inquir. Vol. VI. p. 68, 70. ſqu.
Melle (de) D. de vi vitali, Lugd. Bat. §. 107.
Mithof Diſſ. cit. p. 8.
Pechlin l. c. Lib. I. obſ. 65.
— — — Lib. II. obſ. 29.
Phelſum (van) hiſtoria aſcaridum. Leoward. 1762. p. 212.
Philoſ. Transact. Vol. L. P. II. p. 212.
Pietſch, in libr. cit. paſſim.
Ranoe (A. B.), in Act. Soc. med. Havn. Vol. II. Havniae 1791. 8. p. 342. (Trichurides.)
Rhodius Obſervation. Cent. I. obſ. 59.
Richter chirurg. Bibl. B. IX. p. 373.
Riedlin l. c. Cent. III. obſ. 42.
Riverii Obſervat. Cent. IV. obſ. 28. 59.
Rougeres (de), in Journ. de Medec. T. XXX. p. 51.
Sauvages l. c. T. III. p. 98.
Scheidt (J. Val.) D. de epilepſia verminoſa. Argentorat. 1708.
Schenk l. c. L. III. obſ. 110.
Schmucker vermiſchte Schriften, Th. III. p. 19, 27.
Stahl (G. E.) theor. medic. p. 1018.
Tiſſot l. c. p. 60. ſqu.
Wepfer (J. J.), in E. N. C. Ann. II. v. Bonet. Sepulchret. anat. T. I. pag. 304.
Zacut. Luſitan. de medic. princip. hiſtor. Lib. VI. Amſtelod. 1641. 8. Lib. II. p. 884.

SECT. XIII.

Materia morboſa retenta, egreſſum moliens, retrogreſſa, metaſtatica.

1. *Exanthemata varia.*

Allioni vom Frieſel. Mühlhauſen 1785. (varia exempla epilepſiae a miliaribus.)

Bang

Bang Auswahl aus dem Tagebuche des Königl. Friedrich. Krankenhauſes, Th. I. aus dem Lat. v. Jugler. Kopenhag. u. Leipzig 1790. p. 165. (Metaſtaſis ſeri ad cerebrum a ſcabie retropulſa.)

Baraillon obſ. de quadam epilepſiae ſpecie a miliaribus nata, in Hiſtoire de l'Acad. d. Scienc. à Paris 1779. p. 217. (a miliaribus epidemica.)

Beaumes l. c. p. 162. ſq.

Berchelmann Fragm. z. Arznei-Naturkunde u. Geſchichte. Heft I. p. 5. (a ſcabie antegreſſa.)

Bierling adverſaria curioſa. Jenae 1679. 4. L. I. p. 40. (a variolis.)

Bresl. Samml. Verſuch XXIX. p. 84. (a purpura.)

— — — 1725. May, p. 532.

Cartheuſer (J. Fr.) patholog. T. I. cap. de epilepſia (in Suecia epilepſiam infantum ob conſuetam tineae capitis per lotionem cum aqua frigida repulſionem eſt frequentiorem.)

Clarke (Th.), in Medic. Journ. June. London 1781. p. 428. vid. Samml. auserl. Abhandl. Th. VII. p. 201. (poſt variolarum inoculationem.)

Coſchwitz D. de exanthematum ſeroſo-lymphaticorum retrocedentium noxis. Halae 1728. p. 13. §. 16. (ab achoribus repulſis.)

Diemerbroek (Isbr.) Obſervat. et curat. centur. in Oper. omn. Ultraject. 1685. (a tinea capitis retropulſa.)

Dufour, v. Beaumes l. c. p. 172. (a ſcabie retrogreſſa.)

E. N. C. Dec. II. Ann. IV. obſ. 89. Schol. (ab achoribus repulſis.)

Gazette ſalutaire de Bouillon. 1775. p. 42. (a ſcabie retrogreſſa.)

Güldenklee (Tim. a) oper. omn. p. 1075. (ab achoribus repulſis.)

Hagendorn l. c. Cent. I. hiſtor. 8. p. 14. (ab achoribus repulſis.)

— — — — hiſtor. 9. p. 17. (a ſcabie retrogreſſa.)

Heiſter (L.) comp. med. pract. Cap. XVIII. §. 24. (Variolae eruptionem molientes.)

Herz üb. den Schwindel. 2te Ausg. Berlin 1791. p. 385. ſq. (a ſcabie repulſa.)

Hofmann (Fr.) Med. ſyſtem. P. III. cap. 12.

Len-

Lentilii (Roſin.) Miſcell. med. pract. Ulm. 1698. 4. (a ſcabie retrogreſſa.)
Linnée, in Abhandl. der Königl. Schwed. Acad. der Wiſſ. B. IV. p. 309. (ab achoribus repulſis.)
Loeffler Beiträge zur Wundarzneik. B. I. (a ſcabie retrogreſſa.)
Martii (Jerem.) obſervat. med. Cent. edit. a G. H. Welſch, in Syllog. curat. et obſ. med. Ulm. 1668. 4. obſ. 24.
Meza (S. Th. de), in Collect. Soc. med. Havn. Vol. II. p. 261.
Otto (B. C.), rſp. J. G. Kretſchmer D. ſ. tres ſcarlatinae obſervationes. Francof. ad Viadr. 1793. (a ſcarlatina.)
Rhodius l. c. Cent. I. obſ. 62. (a herpete retropulſ.)
Riedlin Lin. med. 1696. p. 205. (a ſcabie retropulſa.)
Roboel, in Handelingen van het Geneeskondige Genootſchapp: Servandis civibus. Deel II. 1776. (a tinea capitis retrogreſſa.)
Rochard, in Journ. de Medec. T. XXV. à Paris 1766. pag. 46. (a ſcabie.)
Sauvages l. c. p. 103. n. 10.
— — — p. 119. n. 11.
Schenk l. c. L. I. obſ. 199. (a ſcabie retrogreſſa.)
Sennert (Dan.) Paralip. ad Lib. V. Inſtitut. med. Viteberg. 1642. 4. n. 2. (a ſcabie repulſa.)
Stahl (G. E.), in Colleg. caſual. minor. pag. 335. (ab achoribus repulſis.)
Sydenham opuſc. med. p. 80, 661. (a variolis.)
Tiſſot l. c. p. 140, 142. (a ſcabie repulſa.)
— — — p. 172. (a ſcabie retenta.)
Titius (Sal. Conſt.) de pellagrae morbi inter Inſubriae auſtriacae agricolas graſſantis pathologia. Vitebergae 1792. 4. p. II. (a pellagra.)
Trincavella (Vict.) Conſil. medic. Baſil. 1587. fol. Lib. I. conſ. 29. (a ſcabie repulſa.)
Villar, v. Beaumes l. c. p. 171. (a tinea capitis retrogreſſa.)

2. *Febris.*

Act. Nat. Cur. Vol. VI. obſ. 39. (a putrida neglecta.)

Ahle-

Ahlefeld (J.), rſp. Jo. Andr. Schreiber, D. de epilepſia febrium intermittentium comite. Gieſſae 1765. 4.

Becker (J.), in app. obſervationum ad Tr. de morte ſubmerſorum. Gieſſae 1704. 8. obſ. 10.

Berchelmann Fragmente zur Arznei-Naturkunde und Geſchichte. Heft I. p. 5.

Bournainville, in Journ. de Medec. Janvier, 1758. p. 43.

Caldera, v. Beaumes l. c. p. 237. (febr. intermitt.)

Cardani (Hieron.) de ſubtilitate L. XXI. Norimb. 1550. fol. L. II. (a febre peſtilentiali.)

Coiteri (Volch.) obſerv. med. chirurg. Norimb. 1572. fol.

Diverſi (Petr. Sal.) Tr. de febre peſtilentiali. Francof. 1586. 8. cap. 5. (a febre peſtilentiali.)

Finke (Leonh. Lud.) von den Gallenkrankheiten. Nürnberg 1787. 8. p. 74. (a febre biliofa.)

Gualdo (Ferd.), in epiſt. ad Cl. Turra. vid. Turra oſſervazione mediche e chirurgiche intorno alla faccolta febrifughe e antiſettiche della corteccia dell' ippocaſtano. Vicenza 1788. pag. 33. (a febre tertiana.)

Hagendorn l. c. Cent. I. obſ. 11. (poſt quartanam.)

Hoven (Fr. Wilh. van) über d. Wechſelfieber. Winterthur 1789. 8. p. 42. (periodica in febr. interm.)

Journal de Medecine, T. XXI. p. 224. T. 8. art. 6.

Lanzoni, in Manget. Bibl. med. pract. .... (a vehementi febris paroxyſmo.)

Lautter (Fr. Joſ.) Hiſtor. medic. biennal. morbor. ruralium. Vindobon. 1761. 8. (a febr. intermitt.)

Lyſons (Dan.) pract. Abhandl. von den Wechſelfiebern. a. d. Engl. Leipzig 1774. 8. p. 107.

Maſſa, v. Beaumes l. c. p. 237. (a febr. quotidiana.)

Medicus (Fr. Caſim.) Samml. von Beobacht. aus d. Arzneiw. B. II. Zürch 1764. 8. p. 373, 387, 409.

Morton (Rich.) Pyretolog. Cap. IX. hiſt. 14. 15.

Sauvages l. c. p. 97. n. 1. (Eclampſia typhodes.)

— — — p. 107. n. 17. (Eclampſia febricoſa.)

Sauvages l. c. p. 118. n. 9. (Epilepſia febricoſa.)

Sennert (Dan.) de febribus L. IV. Viteberg. 1619. 8. L. IV. c. 14. (a febre maligna epidemica.)

Solenandri (Reiner.) Conſilior. medicinal. Sect. V. Francof. 1596. fol. Sect. I. conſ. 25. (a febre quotidiana.)

Torti (Fr.) Reſponſiones iatro-apologeticae. Francof. et Lipſ. 1756. 4. Lib. IV. Cap. IV. hiſt. 3. (a febre intermittente.)

Valleriola (Franc.) Locorum communium L. III. Venet. 1553. 8. L. III. cap. 18. (a febre peſtilentiali.)

3. *Varia.*

Acta Berolinenſ. Dec. I. Vol. V. p. 19. (materia podagrica.)

Aſtruc de morb. venereis. L. IV. cap. 2. §. 9. p. 359. (lues venerea.)

Ballon (Guil.) oper. omn. Genev. 1762. 4. T. I. p. 21. (hydrops.)

Blochs mediz. Bemerk. Berlin. 1774. 8. p. 178. (lues venerea.)

Bonet Sepulchr. anat. Lib. I. obſ. 7. 14. (Scorbutica acrimonia.)

— — — Lib. I. Sect. XII. add. obſ. 3. (venerea.)

Bontè, in Journ. de Medec. Janvier, 1764. p. 41. (rachialgica.)

Boucher, vid. Beaumes l. c. pag. 178. (metaſtaſis ſcorbutica ad cerebrum.)

Charles (Hug.) et Dion. Bazin Ergo epilepſia hydropi ſuperveniens lethalis. Pariſ. 1629.

Drawitz (J.) de ſcorbuto. Lipſiae 1647. 8. p. 125. (ſcorbutica.)

E N. C. Cent. I. p. 272. (venerea.)

— — Dec. II. Ann. VI. obſ. 42. Schol. pag. 112. (arthritis retrogreſſa.)

— — Dec. III. Ann. IX. X. obſ. 200. (eryſipelas repulſa.)

Eugaleni (Sev.) Lib. de ſcorbuto morbo. Bremae 1588. 8. p. 57. (ſcorbutica.)

Fabre nouvelles obſervations ſur les maladies veneriennes. à Paris 1779. p. 73.

Fontaine (F. L. de la) medicin. chirurg. Abhandlungen. Breslau u. Leipzig 1792. (a materia plicae polonicae ante metaſtaſin hujusce materiae ad crines hinc inde circumvagante ſaepius epilepſia.)

Gardane Gazette de Santé. à Paris 1773. p. 47. (venerea.)

Gua-

Guarinoni (Chr.) Conſilia medica. Venetiis 1610. Conſil. 13. (venerea.)

Kaempf, in Act. philoſ. med. Societ. acad. Scient. princip. Haſſiacae. Vol. I. Gieſſ. 1771. 4. p. 152. (venerea.)

Pelargi (Huld.) medicin. Jahrg. Th. II. Leipzig 1724. 4. p. 317. (venerea.)

Plenk (Joſ.) de morb. venereis. p. 132. (venerea.)

Sauvages l. c. p. 119. n. 12. (Epil. ſyphilitica.)

— — — p. 120. n. 14. (Epil. rachialgica.)

— — — — — (ab arthritide retenta.)

SECT. XIV.

Acria (mechanica, chemica) — Narcotica. — Venena vel ingeſta, vel externe applicata.

Ackermann, in annot. ad Tiſſot. l. c. p. 58. not. 20. (a Laudano liqu. Sydenh.)

Baldinger Neues Mag. für Ärzte. B. II. p. 254. (a ceruſſa infanti per incuriam data.)

Barbette prax. medic. p. 3. (ab oleo Juniperi ingeſto.)

Bartholin (Th.) Hiſtor. anatom. Cent. V. hiſt. 66. (a vitro deglutito.)

Bauhin (Joh.) Hiſtor. T. III. p. 101. (ab apii graveolentis eſu.)

Baumer diſſ. cit. p. 22. (ab oleo therebinthinae ingeſto.)

Becker, in app. ad Tr. de morte ſubmerſorum. obſ. 6. (ab opio.)

Boehmer (Fr.), rſp. Titius, D. de exanthematum differentia et origine. Viteberg. 1766. p. 7. (a nimia doſi piperis longi ad fugandam febrim.)

Bresl. Geſchicht. Verſ. XVI. p. 413. (Epilepſia lethalis a deglutita moneta in valvula coli haerente.)

Bresl. Samml. 1722. p. 286. 511. (a cicuta viroſa.)

Camerarii (Jo. Rud.) Memorab. med. Cent. XX. Tubingae 1683. 8. Cent. IV. n. 94. (a Mercurio.)

— — — Cent. X. n. 90. (ab eſu radicis angelicae ſylveſtris.)

Donat (Marcell.) de hiſtor. med. mirab. Francof. 1613. 8. L. II. c. IV. p. 155. (a Mercurio.)

E. N. C. Dec. I. Ann. III. obſ. 15. (ab ol. Junip. ingeſto.)

E. N. C. Dec. II. Ann. II. p. 470.
— — — Ann. III. obſ. 77. (a clysmate acri.)
— — — Ann. VI. obſ. 116. (a cicuta viroſa.)
— — — Ann. VII. obſ. 162. (a purgante draſtico.)
— — — — obſ. 196. (a fumatione tabaci excitari.)
— — Dec. III. Ann. I. obſ. 65. } (a veratro.)
— — — Ann. III. obſ. 88. }
— — — Ann. IV. obſ. 30. (a vino lithargyriſato.)
— — — Ann. VII. VIII. obſ. 171.

Garmann (C. Fr.) de miraculis mortuorum. Lipſiae 1681. 4. Lib. I. Tr. V. §. 17. p. 54. (a petroſelino comeſto.)

Güldenklee (Tim. a) oper. omn. p 324. (a cantharidibus devoratis.)

Hagendorn l. c. Cent. I. obſ. 2[illegible] (a purgante draſtico.)

Hannemann, in E. N. C. Dec. III. Ann. III. p. 78. (a petroſelino.)

Hoechſtaetter (Phil.) Obſerv. med. Dec. VII. caſ. 9. (a vapore aquae fortis naribus excepto.)

Hofmann (Fr.), rſp. G. L. Schott, de medicamentis inſecuris. Halae 1713. p. 33. (a Mercurio.)

Mardorff (J. J.) de maniacis nuperis Gieſſenſibus a Solano furioſo. Gieſſae 1691. 4. (a Solano epilepſia.)

Mariotte, in Journ. de Med. T. XXIII. p. 545. (a petroſelino comeſto.)

Moegling, v. Zeller docimaſia, ſigna, cauſſae et noxa vini lithargyrio mangoniſati. Tubingae, p. 18. (a plumbi venenata facultate.)

Montani (Jo. Bapt.) Tr. de morb. gallico; recuſ. in Collect. Luiſin. et in Ej. Opp. variis cura Hier. Donzellini. Baſil. 1558. T. II. (e mercurialium longiore uſu quosdam aegrotos in epilepſiam incidiſſe.)

Mutzell medic. und chirurg. Wahrnehm. Berlin 1772. Samml. II. n. 20. (ab opio.)

Nov. Act. Nat. Cur. Vol. VII. obſ. 39. (a Mercurio.)

Negendorp Cent. III. hiſtor. 84. p. 395. ſq. (a hyoſcyamo.)

Paul. Aegineta L. III. cap. de epilepſia. (Colicae pictonum per romanam ditionem graſſantis a convulſionibus epilepticis concomitatae mentionem facit.)

Quarin l. c. (Pulverem ſternutatorium Nicotianae epilepticis interdicendum eſſe ob metum excitationis paroxyſmi.)

Rai-

Raiger, in E. N. C. Dec. III. Ann. II. obſ. 23. (ab Opio in podagrico adhibito.)
Raymond Traité des maladies, qu'il eſt dangereux de guerir. Avignon 1757. T. II. p. 303. (a Mercurio.)
Riedlin Lin. med. 1700. p. 512. (a majori emetici doſi.)
Rochard, in Journ. de Medec. Novemb. 1758. p. 430. (ab oenanthe crocata.)
Roggert, in Joh. Cl. Tode med. chir. Bibl. B. VII. p. 199. (ab infuſo Theae ſaturatiſſimo.)
Sauvages l. c. p. 103. n. 11. (ab atropa belladonna.)
— — — p. 105. n. 15. (a coriaria.)
Schenk l. c. p. 117. (ab allii eſculenti diuturno eſu.)
Seger, in Medic. ſeptentr. collat. Lib. I. Sect. XIV. c. 10. (a nimia doſi olei deſtill. Juniperi.)
Seeliger, in Miſcell. Nat. Curioſ. Dec. II. Ann. I. obſ. 138. pag. 240. (a fomentatione capitis cum decocto Hyoſcyami.)
Sennert Prax. med. L. VI. p. 300. (a fungorum venenatorum eſu.)
Schwenke over de waare gedaante Aart en Uitwerking der Cicuta aquatica Gesneri. 1756. (a Cicuta viroſa.)
Tiſſot l. c. p. 57. (a majori doſi balſami canadenſis excitata.)
Valentinus (M. B.), in E. N. C. Ann. X. obſ. 118. (a comeſtis baccis belladonnae.)
Verdries (Jo. Melch.) D. de convulſionibus, ſpeciatim quatenus a remediorum mercurialium vel ſaturninorum abuſu provocantur. Gieſſae 1732. 4.
Welſch (G. H.), in E. N. C. Dec. I. Ann. II. obſ. 8. (ab oleo therebinthinae matronae nephriticae dato.)
Wendt (Fr.) Nachr. von dem Krankeninſtitute zu Erlangen. Erlangen 1783. 8. (ab aſperſione ceruſſae ad excoriationes.)
Wepfer (J. J.) Cicutae aquaticae hiſtoria et noxae commentario illuſtratae. Baſil. 1679. p. 5 et 24. (a cicuta viroſa.)
Widenfeld D. ſiſt. obſervationum medicarum trigam. Gottingae 1768. v. Baldinger Auszüg. Th. I. p. 70. (ab acu deglutita.) —
Zannetti (F.), in N. A. N. C. T. VII. p. 184. (a Mercurio.)

Anno-

Annotat. Huic ſectioni addendum mihi videtur ſic dictum contagium epilepticum ſive ſpuma in ore epilepticorum conquaſſata et quaſi effervescendo durante paroxyſmo inter labia egrediens ab alio deglutita; illa enim olim magni in producenda epilepſia habebatur. Quae apud medicos exempla proſtant, haec ſunt:

Bresl. Samml. Verſ. XXII. p. 573. (excitata per contagium.)

Comm. litt. noric. 1731. p. 29. } (per morſum epileptici.)
— — — — 1732. p. 406. }

Rayger (Car.), in not. ad Paul. Spindleri obſervat. medic. Francof. 1691. 4. (per ſalivam ſpumaſcentem communicata.)

Riedlin (Vit.) Obſervat. Cent. I. n. 33. (per pocula communicata.)

Sauvages l. c. T. II. p. 583. (aut ab ira aut a ſaliva per morſum communicata.)

Ejusdem fere argumenti ſunt ſequentes in animalibus factae obſervationes:

Langeolotti, in Miſc. Natur. Cur. Ann. VI. et VII. 1675. obſ. XII. (Epilepſia lethalis in cane, qui juxta ancillam epilepticam durante paroxyſmo in lecto decubuerat.)

Winter (Joh. Jul.), in Hamburg. Adreſscontoirnachrichten. 1793. n. 97. p. 774. (Jusculum, cujus partem mulier epileptica comederat, a cane quodam plane comeſtum in eo frequentes paroxyſmos epilepticos produxit.)

APPEN-

APPENDIX I.

Eorum, quae epilepticorum ſectiones docuerunt, ſecundum partium ordinem brevis expoſitio.

Scriptores.

Bauder (Joſ.) obſerv. medic. inciſionibus cadaverum medicis illuſtratae. 1762. 8.
Bartholin (Thom.) Hiſtor. anatom. Cent. II. et III.
Bonet Sepulchret. anatom. Lib. I. Sect. XII.
E. N. C. (paſſim.)
Fernelii (Jo.) de abditis rerum Cauſis Libr. II. Pariſiis 1548. fol. L. II.
Greding (J. E.), in Adverſar. med. pract. Vol. II. et III.
— — — ſämmtl. Schrift. Th. I. p. 289. usque ad finem.
Leveling (Henr. Palm.) D. de cranio militis quondam venerei, poſtea epileptici, tandem apoplectice defuncti. Ingolſtad. 1774. 4. c. ſigg.
Lieutaud (Joſ.) Hiſtor. anatom. medica. edit. Schlegel. Vol. II. Longoſaliſſ. 1787. 8. Lib. III.
Metzger Pr. ſiſtens hiſtoriam ſectionis anatomicae in cadavere foeminae maniaco-epilepticae. Regiomont. 1781. recuſ. in Ejusd. exercitat. academ. Regiom. 1792.
Morgagni de ſed. et cauſ. morb. Ep. IX.
Tiſſot l. c. (paſſim.)
Thom. Willis pathologia cerebri. Oxoniae 1667. 4. (Utique convulſionum cauſam ſaepe quoque cadavere inciſo fugere. Frequentem eſſe aquam in cerebro absque epilepticis motibus.)

SECT. I.

Caput.

Cfr. Part. II. Cap. IV. Sect. III. Capitis vitia.

a) *Capitis magnitudo.*

Greding l. c. Th. I. p. 289. (Capitis magnitudinem praecipui in hac re eſſe momenti minime ei videtur. E XXVI. epileptico-furi-

furioſis erant IV. et ex XVI. epileptico-fatuis II. quibus caput nimis parvum. Ex XX. epilepticis nemini caput nimis grande.)

b) *Cranium.* (Cfr. P. II. Sect. III. Litt. B.)

α) *Diameter.*

J. B. Fontani obſervat. anat. med. Turin. 1699. 12. (in cadavere epileptici nihil vitiatum invenit in encephalo praeter miram cranii craſſitiem.)

Greding l. c. p. 289. (in plurimis epilepticorum cadaveribus diſſectis cranium juſto craſſius et valde ſolidum. E XXVI. epileptico-furioſis XIX. exhibuere crania valde craſſa et IV. ex iis e contrario tenuiori cranio erant praediti.

E XVI. epileptico-fatuis XIV. valde craſſa.

E XX. epilepticis XVI. valde craſſa et ex iis I. cujus cranii dimidia pars valde craſſa, altera dimidia valde tenuis reperta.

β) *Superficies.*

Act. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV. V. obſ. 35. (Incurvatio diploes internae.)

Baader, v. Lieutaud l. c. p. 448. Obſ. 480. a. (foveae cranii.)

Bonet Sepulchr. Lib. I. Sect. 12. obſ. 3. Tom. I. p. 273. (Interna diploe partis ſuperioris oſſis occipitis eroſa.)

— — — obſ. 32. Tom. I. p. 285. (Incurvatio diploes internae oſſis frontis.)

Greding l c. p. 291. (In nonnullis epilepticorum cadaveribus locus paululum elevatus valde tenuis in angulo anteriore ſuperiore oſſis bregmatis. In medio hujus loci foramen parvum.)

— — (Cranium in regione ſuturae coronalis et ſagittalis ab ampulla in caput delapſa valde depreſſum. Interne elevatio magnitudine nucis juglandis.)

— — p. 292. (In plurimis epilepticorum cadaveribus multa in cranio reperta ſunt foramina. Sic ex XXVI. epileptico-furioſis XVIII. ex XVI. epileptico-fatuis XI. et ex XX. epilepticis X. ſecanti hoc teſtabantur. In cadavere epilepticae cujusdam VI. foramina permagna.)

Leveling (H. P.) D. de carie cranii militis quondam venerei, poſtea epileptici. c. icon. Ingolſtad. 1774.

Rüm-

Rümler (J. Udalr.) poſthum. obſ. med. obſ. 100. (Calvaria paſſim ita eroſa, ut dura cerebri membrana cum ipſo cerebro per ea foramina emineret.)

NB. *Proceſſus clinoideus.*

Greding l. c. p. 330. (E XXVI. epileptico-furioſis in VIII. repe-riuntur acuti et mucronati.

In I. ex iis media e parte baſis cranii ſeſe obtulit prominentia acudis inſtar. Idem in II. epilepticis obſervatum eſt.)

γ) *Suturae.*

Morgagni, v. Lieutaud l. c. p. 443. obſ. 469. (In cadavere hydropici, poſtea epileptici, ſuturae cranii ad ſemi-digiti latitudinem pellucidae.)

c) *Meninges.*

Bonet Sepulchr. Lib. I. Sect. 12. obſ. 9. (Concrementum lapideum inter duram et piam.)

— — — obſ. 27. (offificatae.)

Bartholin, v. Lieutaud l. c. p. 381. obſ. 236. (Inter meninges praeter ſeri copiam portio effuſi ſanguinis.)

Fantoni, v. Lieutaud l. c. p. 309. obſ. 3. (Meninges aridiſſimae.)

Greding l. c. p. 294. (Aquae copia inter duram et piam obſervata eſt e XXVI. Epileptico-furioſis in XIII., e XVI. epileptico-fatuis in VIII., e XX. epilepticis in XII.)

Lieutaud l. c. p. 377. obſ. 224. (varia ſarcomata involucris cerebri adnata.)

Morgagni l. c. Ep. IX. §. 2. (aquae ſtagnationes inter meninges.)

Poupart, in Mémoir. de l'Acad. d. Scienc. 1707. p. 62. (pituita alba inter meninges.)

Rhoetus, in Philoſoph. Transact. n. 315. p. 399. (aquae ſtagnationes inter meninges.)

α) *Dura.*

Baumer diſſ. cit p. 13. (offificata et protuberantiis offeis acutis verſus cerebrum directis obſita.)

— — — p. 14. (Foraminulum in dura matre communicans cum cavea humore fuſco plena.)

Bertram (A. G.) D. de ſpasmo ab inanitione conjecturae. Halae 1781. (cranio firmiter adhaerens.)

Bricu, in Journ. de Medecine. T. XIV. p. 319. (Septem concretiones ſcirrhoſae lapideae in dura meninge.)

Cappel D. de epilepſia e tumore nervo vago inhaerente. Helmſtad. 1781. (concrementum magnitudine nucis avellanae durae matri et nervo vago annexum.)

Cloſſy obſervations taken diſſection of morbid bodies. Sect. I. obſ. 9. p. 17. (ulcuſcula in ſuperficie interna dur. matris.)

Fantoni opuſcula medica. Genevae 1738. 4. p. 37. (dura mater firmiter cum cranio concreta.)

Lieutaud l. c. p. 314. obſ. 18. (craſſior tuberculis exaſperata et piae firmiter agglutinata.)

— — — p. 444. obſ. 470. (In cadavere epileptici, dein fatui, poſtea hydropici dura meninx hinc inde hydatides ciceris magnitudine exhibens. Glandulae Pachionianae ſolito majores et numeroſiores totum ſinum longitudinalem comitantes. Lympha mucoſa, gelatinoſa et copioſiſſima inter meninges et cerebri corticem ſtagnans.)

— — — p. 446. obſ. 476. (In cadavere epileptico-cachectici cum hebetudine materia copioſiſſima craſſa, albicans et gelatinoſa durae matri firmiter adhaerens.)

Mekel Recherches ſur les cauſes de la folie. obſ. 14. (prominentia oſſea in parte durae matris inferiore.)

la Motte Traité complet de chirurg. T. II. p. 397. (oſſificationes.)

Pew (Rich.) Skizzen. p. 38. (ſolito craſſior.)

Poupart, in Mémoir. de l'Academ. Roy. des Scienc. 1705. (Sub dura meninge magna copia gelatinae duriuſculae firmiter durae matri agglutinatae.)

Rümler, v. Bonet Sepulchr. p. 280. (dura meninx puſtulis obſita, nonnullis locis eroſa, cerebro paſſim per foramina erumpente.)

αα) Proceſſus falciformis.

Baumer diſſ. cit. p. 13. (in oſſeam laminam mutatus.)

Boerhave prax. med. T. V. p. 36. (Protuberantiis oſſeis obſitus.)

Lieutaud l. c. p. 323. et 324. obſ. 45. 48. 50. 51. (oſſificationes.)
de Pozzis, in Eph. N. C. Dec. I. Ann. IV. V. obſ. 34. (prominentiae oſſeae.)

ββ) Tentorium.

Greding l. c. p. 295. et Th. II. p. 71. (In quibusdam epileptico-fatuorum cadaveribus obſervavit ſarcoma ad magnitudinem fructus rubi idaei ſiniſtrorſum prope cranium tentorio ſubſidens, hiſpidum, membrana firma involutum, ſine dubio a pia meninge ortum trahens. Interior pars exhibet concrementum oſſeo-lapideum aequalis figurae et magnitudinis, quod lobos cerebri poſteriores facile potuit irritare, etſi exinde nullam detegerit laeſionem. Talia ſarcomata minime antea in hominibus ſunt obſervata. In cane tamen epileptico obſervavit A. H. Faſch [v. Ej. et rſp. Boeſii D. de epilepſia. Jenae 1686. p. 15.] oſſiculum lamellatum, ſcutiforme, a pollicis magnitudine firmiter inter cerebrum et cerebellum meningibus et vaſis inſitum.)

β) Pia.

Greding l. c. p. 297. (In X. e XXVI. epileptico-furioſis nimis condenſata et pituitoſa. In caeteris horum XXVI. ne quidem minimum ejus veſtigium apparebat.

In VI. e XVI. epileptico-fatuis modice condenſata et pituitoſa. In caeteris nihil ejus reſtabat.

Omnibus XX. epilepticis plus minusve pituitoſa ac mollis.)

— — — p. 298. (Concrementa iſta mollia, alba, ſemiglobularia, fungoſa, de quibus jam Cel. Günz in Proluſ. II. de cerebro tractat, plerumque ſolitoque in utroque latere regionis frontalis piae meningi ſubſidentia, magnitudini dimidiae partis ſeminis cannabini, interdum quoque dimidii ciceris aequantia in XV. e XXVI. epileptico-furioſis in quantitate modicam ſuperante apparebant.

In VIII. e XVI. epileptico-fatuis in nimia quantitate. In VI. ex iis rariora.

In omnibus XX. epilepticis et quidem in XII. in nimia quantitate, in VIII. autem in minore quantitate reperiebantur.)

Greding l. c. p. 301. (In hisce concrementis obſervatae oſſificationes in XXVI. epileptico-furioſis et XVI. epileptico-fatuis nunquam reperiebantur. In varia autem quantitate extitere in IX. ex XX. epilepticis, quorum unus erat ſomnambulus.)

— — — p. 34. (In V. e XXVI. epileptico-furioſis aquae copia inter piam meningem et ſubſtantiam corticalem. In III. e XVI. epileptico-fatuis. In nemine autem XX. epilepticorum.)

Johnſtone, in Medical obſervat. and Inquiries. Vol. II. n. VI. p. 115. (Vaſa piae ſanguine repleta et extenſa.)

Lieutaud l. c. p. 359. obſ. 167. (Inter ſubſtantiam corticalem et piam meningem maxima aquae copia.)

— — — p. 443. obſ. 469. (Sub tenui meninge materia gelatinoſa cum bullulis aëreis.)

— — — p. 445. obſ. 473. (In cadavere epileptici, cum ſenſuum hebetudine e capitis gravitate univerſus cerebri ambitus gelatina fulva erat obductus ad intimos ejus usque gyros, quae etiam anfractus cerebri complebat. Tota eminebat ſuper cerebri corticem griſeum digiti auricularis altitudine ad baſin usque praedicti viſceris et ſic piam matrem a ſede ſua expulerat.)

Pew l. c. p. 38. (Particula piae in regione laterali hemiſphaerii dextri inflammata et opaca. In parte anteriore hemiſphaerii dextri orbitae ſuperſedente arteriae piae meningis dilatatae et rubicundae.)

d) *Vaſa cerebri.*

Drelincourt, vid. Bonet Sepulchr. anat. p. 294. addit. obſ. 6. (Arteriae totius cerebri nigro ſpiſſoque cruore repletae.)

Greding l. c. p. 303. (Vaſa cerebi ſanguine turgida in IV. e XXVI. epileptico-furioſis, in nullo e XVI. epileptico-fatuis et XX. epilepticis.)

Johnſtone l. c. p. 115. (ſanguine turgida.)

Lieutaud l. c. p. 328. obſ. 62. (ſumma vaſorum turgeſcentia.)

— — — p. 376. obſ. 221. (Vaſa cerebri ſanguine turgida.)

Mekel Recherches etc. obſ. 10. (ſanguine repleta.)

Morgagni l. c. Epiſt. IX. §. 12. et 14. (ſanguine repleta.)

Mor-

Morgagni l. c. Epiſt. IX §. 18. (arteria baſillaris paululum extenſa.)

Wepfer, in E. N. C. Dec. III. Ann. I. obſ. 135. (ſanguine turgida et circa occiput ſanguinis ℔ j. effuſa.)

α) *Sinus falciformis (longitudinalis).*

Greding l. c. p. 295. (E X. epileptico-fatuis in VII. et e XII. epilepticis in VIII, polypi in ſinu falciformi.)

Lieutaud l. c. p. 324. obſ. 48. (Circa ſinum longitudinalem oſſa echinata.)

— — — p. 375. obſ. 217. (Septem ſarcomata circa ſinum longitudinalem ſita et piſi molem aequantia.)

Pozzis (Ant. de), in E. N. C. Dec. I. Ann. IV. V. obſ. 34. (Lamina oſſea ſinum falciformem premens.)

Wagner (F A.) epiſt. gratulat. de morborum inſanabilium curatione. Lipſiae 1792. 4. p. 8. (Polypus in ſinu longitudinali, e rubro albeſcens, longitudine trium pollicum, craſſitie vero calamum ſcriptorium ſuperans. Caro polypi maximam quoad partem denſa et compacta inprimis media parte, qua parvo cuidam calvariae tuberculo aſpero ita erat agglutinatus, ut nonniſi cultro abſcindi poſſet.)

β) *Plexus choroideus.*

Greding l. c. p. 315. (E XXIII. epilept. furioſis VI, quibus plexus choroid. tumeſcens et tendinis inſtar erat.

E XX. epilept. III. quibus tumeſcens et atropurpureus.

— — — V. quibus valde tumeſcens et durus.

— — — IV. modice tumeſcens caeteriſque valde tumeſcens et hydatidibus refertus.)

Johnſtone, in Medic. Obſerv. and Inquiries l. c. (Hydatis magnitudine globuli ſclopetarii in plexu choroideo.)

Lieutaud l. c. p. 359. obſ. 167. (Plex. choroid. hydatidibus ſumme conſpicuis refertus. — Acta Londinenſia.)

— — — p. 361. obſ. 172. (glandulis ſcirrhoſis exaſperatus. — Miſcellan. curioſa.)

— — — obſ. 173. (a) (variis granulis duris et ſcirrhoſis repletus. — Dulac.)

Lieu-

Lieutaud l. c. p. 381. obſ. 236. (Glandulae turgidae in plexu choroideo. — Valſalva.)

Rhoetus, in Philoſoph. Transact. n. 315 et n. 399. (Hydatidibus repletus.)

Sorbait (Paul. de) univerſa medicina theoretica et practica. Norimb. 1672. fol. p. 117. (Scirrhi in plexu choroideo.)

Wepfer l. c. p. 303. (ſanguine turgeſcens.)

e) *Maſſa cerebri.*

α) *dura.*

Baader (J.) obſervat. medic. inciſionibus cadaverum anatomicis illuſtratae. Friburg. 1762 8. p. 107. (tam corticalis quam medullaris cerebri ſubſtantia in doloris, de quo in dextro capitis latere querebatur aegrotus, ſede durior et ſcirrhoſa.)

Baumer diſſ. cit. p. 15. (cerebrum duriuſculum.)

Fantoni l. c. (in corpore calloſo durum concrementum a magnitudine nucis.)

Greding l. c. p. 306. (contra Boneti, Meadii et aliorum ſententiam in nemine e XXVI. epileptico-furioſis, XVI. epileptico-fatuis et XX. epilepticis durum aut friabile reperit cerebrum.)

Lieutaud l. c. p. 335. obſ. 84. (in dextra parte prope criſtam galli dura et calloſa cerebri maſſa. — Morgagni.)

— — — p. 395. obſ. 282. (cerebrum ſubdurum. — Sponius.)

— — — p. 399. obſ. 301. (circa criſtam galli durum et calloſum.)

Morgagni l. c. §. 25. (pars cerebri anterior cartilaginea. — Gualthieri.)

— — — §. 26. (ſubſtantia corticalis indurata. — Kaaw Boerhave.)

Plater (Fel.) obſervat. medicinal. Baſil. 1680. 8. Lib. I. p. 103. (in cerebri parte anteriore concrementum calloſum conſiſtentiae ovi diutius cocti et magnitudinis ovi gallinacei.)

β) *mollis.*

Greding l. c. p. 309. (Ex XXVI. epileptico-furioſis erant XVIII, quorum cerebrum juſto mollius et quidem in quibusdam molliſſimum, aquoſum atque axungiae inſtar erat.)

E XVI.

E XVI. epileptico-fatuis I. cujus cerebrum juſto mollius, et V. quorum molliſſimum, aquoſum atque axungiae inſtar erat.

E XX. epilepticis VIII. quibus molliſſima cerebri conſiſtentia. In caeteris quoque mollities ſolitam valde ſuperans conſiſtentiam.)

Morgagni l. c. §. 16. (Collapſio partis anterioris hemiſphaerii ſiniſtri a mollitie nimia orta. Subſtantia corticalis jam juſto mollior, medullaris autem plenarie gelatinam aemulans.)

— — — §. 18. (Mollities plenaria thalamorum nervorum opticorum gelatinae ſemicorruptae nigreſcenti aequantium.)

Sauvages noſolog. meth. ed. Daniel. T. III. p. 107. (Cerebrum molle, pultaceum.)

Schmidt (E. G.) Obſervation. chirurg. obſ. 3. (Hemiſphaerium dextrum plenarie gelatinoſum a leviſſimo quodam attactu liqueſcens. Hemiſphaerium ſiniſtrum ſparſim aequali modo ſeſe exhibens. In alio cadavere dextrum hemiſphaerium pituitoſum cultelli ope in filos extenſibile.)

γ) *putrida.*

Baader l. c. p. 107. (Abſceſſus ad ovi gallinacei magnitudinem accedens.)

Baumer Diſſ. cit. p. 14. (Cavea, ovi capax, humore fuſco plena; partes vicinae ſemicorruptae fuſco colore infectae.)

(Cavea in ſiniſtro cerebri hemiſphaerio a magnitudine nucis juglandis, lividis e medullari ſubſtantia parietibus comprehenſa, e qua humor nigricans filamenta quaedam continens effluxit.)

Bonet Sepulchr. anat. Sect. XII. addit. obſ. 5. p. 293. (Abſceſſus magnitudine ovi gallinacei in lobo dextro. — Borrichius.)

— — — Sect. XV. obſ. 18. p. 371. (Abſceſſus in lobo dextro. — Bauhinus.)

Greding l. c. p. 306. (E quinque epileptico-furioſis in cadavere foeminae epilepticae phtiſi demortuae cerebrum ſeſe obtulit foetidiſſimum.)

Lieutaud l. c. p. 346. obſ. 118. (Cerebrum abſceſſum magnitudine ovi columbini recondens, cujus pus album et foetidum viam ſibi cuderat verſus medullam oblongatam. — Diaria eruditorum.)

Lieu-

Lieutaud l. c. p. 350. obſ. 137. (Abſceſſus in cerebro, ventriculis inculpatis. — Fernelius.)

— — — p. 352. obſ. 144. (Dimidium fere cerebrum ſphacelatum. — Salmuth.)

— — — — obſ. 149. (Cerebrum ſideratum. — Glandorp.)

— — — p. 354. obſ. 150. (Cavea magni ovi capax, plena ſanguine concreto et ſero ſubfuſco, cujus latera ſubſtantiam cerebri ſemiputrem oſtendebant. — Morgagni.)

— — — — obſ. 152. (Pars hemiſphaerii ſiniſtri molliſſima in ſeſe conſidens, in gelatinam ex cinereo ſubfuſcam mutata, quod vitium ad partem anteriorem ventriculi ſiniſtri protendebatur. — Morgagni.)

— — — p. 355. obſ. 153. (In cadavere venerei epileptici, ſimul febre acutiſſima et affectu comatoſo laborantis, pars ſiniſtra ferme tota corrupta et gangraenoſa et in media illa corruptione tria corpuſcula tanquam gummata virentia. — Guarinoni.)

— — — p. 460. obſ. 528. (Cultro anatomico ſubjecta corpora nonnullorum epilepticorum exhibent purulentiam, cerebrum et ejus involucra defoedantem. — Fernelius.)

Mekel l. c. Obſ. XII. p. 85.

Morgagni l. c. Epiſt. LXII. §. 15. 17. 18.

Vicrac (Joann.), in Verhandelingen vitgegeeven door de Maatſchappye der Weetenſchappen te Harlem. XIV. Deel. Harlem 1779. p. 49. (Abſceſſus cerebri.)

d) Sanguine aut ſtagnante aut effuſo repleta.

Bonet l. c. p. 294. (Turgeſcentia vaſorum cerebri et ſanguinis effuſio.)

Johnſtone l. c. p. 115. (idem.)

Lieutaud l. c. p. 335. obſ. 84. (In ſiniſtro et anteriore cerebri latere aliqua ſanguinis copia effuſa. — Morgagni.)

— — — p. 392. obſ. 272. (Hemiſphaerium dextrum phlogoſeos notam prae ſe ferebat.)

— — — p. 394. obſ. 280. (Inflammationis notae in parte dextra cerebri. — Sponius.)

Lieu-

Lieutaud l. c. p. 395. obſ. 282. (Cerebrum quaſi inflammatum. — Sponius.)

— — — p. 448. obſ. 481. (a) (Cortex cerebri ſanguine infarctus cum vaſis varicoſis et materia quadam viſcida vel gypſea obductis. — Fournier.)

Mekel l. c. obſ. 10. (Turgeſcentia vaſorum cerebri et ſanguinis effuſio.)

Wepfer l. c. p. 303. (idem.)

ε) *aquoſa.*

Bartholin (Thom.) Hiſtor. anat. Cent. III. hiſt. 80.

Bonet l. c. obſ. 7. 8. 10. 12. 13. 15. 17.

Lieutaud l. c. p. 415. obſ. 363. (E cerebri ſubſtantia transverſim ſciſſa effluxerunt aquae citrinae, majori copia ſtagnantes circa nervorum conjugationes. — Bonetus.)

— — — p. 430. obſ. 414. (Omnes cerebri receſſus intus et extus ſero pleni. — Mangolt.)

— — — p. 440. obſ. 454. (Cerebrum quinque libras pendens et copioſa aqua circumfuſum; aderant quoque puſtulae aqua plenae. — Bonetus.)

— — — p. 448. obſ. 480. (a) (In hemiſphaerio ſiniſtro et ipſa ſubſtantia corticali et medullari copioſa lympha craſſa et mucoſa. — Baader.)

Morgagni l. c. Epiſt. IX. §. 2. — Valſalva.

— — — — §. 3. — Gavaſſetti.

Rhoetus, in Philoſ. Transact. n. 315. et 399.

Riverii opera medica. Genevae 1737. fol. p. 473.

f) *Ventriculi cerebri.*

Baumer diſſ. cit. p. 15. (ſero repleti.)

Blancardi anat. pract. Cent. II. obſ. 63. (Compreſſi ſine cavitate obvia.)

Bontii (Jac.) Obſervat. ſelect. ex diſſectione cadaverum et autopſia deſcriptae. Amſtelod. 1694. 8. (Materia viſcida repleti.)

Harder (J. J.) Apiarium etc. Baſil. 1687. 4. p. 55. (In cadavere epileptici ſimul comatoſi cerebri ventriculi aqua pleni.)

Lieutaud l. c. p. 375. obſ. 217. (colluvie aquoſa repleti. — Diarium medicum.)
— — — p. 381. obſ. 235. (valde compreſſi ſibique invicem ſuperjacentes ſine ulla manifeſta cavitate. — Bartholinus.)
— — — — obſ. 236. (ſero pleni. — Valſalva.)
— — — p. 394. obſ. 280. (Sanguine coagulato. — Sponius.)
— — — p. 395. obſ. 282. — — — —
— — — p. 425. obſ. 398. (humore aqueo limpidiſſimo ſcatentes. — Bonetus.)
— — — p. 430. obſ. 414. (aqua pleni. — Mangold.)
— — — p. 439. obſ. 448. (— — — Bonetus.)
— — — p. 440. obſ. 459. (— — — — —)
— — — p. 443. obſ. 469. (ſero pleni. — Morgagni.)
— — — p. 444. obſ. 470. (a) (— — — Baader.)
— — — p. 445. obſ. 473. (lympha ſubflava pleni. — Drelincourt.)
— — — p. 448. obſ. 480. (a) (pauca aqua. — Baader.)
— — — — obſ. 481. (a) (aqua ſcatentes. — Fournier.)
— — — p. 450. obſ. 491. (magna viſcidae materiae et adipis quaſi aemulae copia. — Borellus.)
Marquiſius, in Zodiac. med. gall. 1682. (in cadavere epileptici apoplectice demortui ſanguis in ventriculos cerebri effuſus.)
Rhodius obſ. med. Cent. I. obſ. 49. (ſero pleni.)
Rhoetus l. c. n. 315. (aqua pleni.)
Riverii oper. omn. p. 473. (aqua pleni.)
Sauvages l. c. p. 107. (ſero repleti.)
Schenk obſ. med. Lib. I. obſ. 122. (ſero repleti.)

f. α) *Ventriculi laterales.*

Bang Auswahl aus d. Tageb. d. Friedr. Krankenh. zu Kopenhagen. Vol. I. p. 129. (parum ſeri in ventriculo dextro.)
Greding l. c. p. 310. (E XXVI. epileptico-furioſis IX., quibus ventriculi laterales nimis parvi, breves, anguſti, nullam aquam continentes.

E XX.

E XX. epilepticis IV., quibus anguſti parvi breveſque.

In IV. epileptico-furioſis dexter ventriculus major ſiniſtro eſſe videtur.

E XVI. epileptico-furioſis XIII., quorum ventriculi turgeſcentes ab aqua pellucida, et V., quorum ventriculi modice hacce aqua erant repleti.

E XVI. epileptico-fatuis III., quorum ventriculi vacui reperiebantur; IV., quorum dexter vacuus et ſiniſter aqua modice repletus. In alio quodam dexter modice plenus et ſiniſter vacuus.

E XX. epilepticis IX., quorum ventriculi aquae copiam continebant. In II. modice pleni, in I. vacui. In IV. dexter vacuus, ſiniſter modice hacce aqua repletus.)

Greding l. c. p. 315. (E XXIII. epileptico-furioſis XVII., quorum ventriculi permultas magnasque continebant hydatides.

E XIII. epileptico-fatuis VI., quorum ventriculi parciorem, II. permagnam et caeteri modicam hydatidum copiam oſtendebant.)

Lieutaud l. c. p. 359. obſ. 167. (Maxima aquae copia in lateralibus ventriculis. — Act. Londinenſia.)

— — — p. 361. obſ. 172. (Siniſter aqua ſcatens. — Miſcell. curioſ.)

— — — p. 376. obſ. 221. (Corpus glanduloſum fabae magnitudinem aequans in ſubſtantia corporis ſtriati dextri. — Act. Pariſ.)

— — — p. 392. obſ. 272. (Ventriculi laterales ſanguine congrumato turgeſcentes. — Act. Lipſienſia.)

— — — p. 425. obſ 399. (Seroſa, acri et flaveſcente colluvie diſtenti. — Drelincourt.)

— — — p. 440. obſ. 454. (Siniſter nigricans laticem ſubviridem recondens. — Bonetus.)

Pew Skizzen aus d. Heilkunde. p. 39. (In dextro ℥ iij. fluidi pellucidi, in ſiniſtro ſeri ſanguinolenti ℥ j.)

Rhodius Obſ. med. Cent. I. obſ. 55. (Tumor in ventriculis lateralibus.)

Schroek, in Comm. litt. noric. 1750. p. 165. (Polypi in ſiniſtro.)

f. β) *Ventriculus tertius.*

Greding l. c. p. 316. (E XXVI. epileptico-furioſis VIII., quorum excedente modo brevis.

E XVI. epileptico-fatuis III., quorum nimis anguſtus; IV., quorum tali modo atque irregulariter triangularis, ut in regione infundibuli ſolito anguſtior et ad poſteriorem partem nimis latus obſervaretur.

E XX. epilepticis in III. nimis latus; in nemine ex his ſolito anguſtior.

E XXVI. epileptico-furioſis in omnibus aqua copioſiſſima repletus. E XVI. epileptico-fatuis in IV. aqua plenarie ſcatens. In III. modice plenus et in caeteris perpauca aqua repletus. E XX. epilepticis in VI. abunde, in III. modice et in caeteris perpauca aqua repletus.)

g) *Glandula pituitaria.*

Boulet, in Pouppe Desportes Hiſtoire des maladies de St. Domingue. à Paris 1770. Tom. II. p. 209. (ad ovi magnitudinem diſtenta, fungoſa, ad tertiam partem pure repleta folliculoque incluſa.)

NB. Sic citat Greding l. c. p. 282. huncce locum de glandula pituitaria. In Commentar. Lipſienſ. T. XVIII. autem hancce obſervationem de glandula pineali narratam invenies. Deficiente mihi ipſius auctoris libro gallico, hocce diſcrimen auferre non poſſum. Sed de pituitaria factam eſſe obſervationem veriſimilius mihi videtur. Folliculo eam fuiſſe incluſam nihil praeternaturale eſt, quum ſecundum anatomicorum obſervationes continuatione durae matris involuta ſit glandula pituitaria.

Greding. l. c. p. 328. (In XV. e LII. epileptico-furioſis ſolitae magnitudinis, in V. ex his juſto major.

In XX. epilepticis ſolitae magnitudinis.

In IV. e XII. epileptico-fatuis ſolito minor; in caeteris ſolitae magnitudinis.

In IX. e XXII. epileptico-furioſis juſto durior; in VIII. mollior; in caeteris ſolitae conſiſtentiae.

In VI.

In VI. e XII. epileptico-fatuis juſto durior; in caeteris mollior.

In V. e XX. epilepticis juſto durior; in caeteris ſolitae conſiſtentiae.)

h) *Glandula pinealis.*

Cfr. Günz Pr. de lapillis in glandula pineali inventis. Lipſiae 1753.

Sömmering D. de acervulo cerebri. Moguntiae 1785.

— — — Hirn- und Nervenlehre. p. 43.

(Acervulos in glandula pineali paſſim inventos ad conſuetam cerebri ſtructuram pertinere et quoque in homine aetatem XIV. annorum ſuperante inveniri. Sic quoque G. J. Wolf in Diſſ. ſiſt. quaeſtiones medicas varii argumenti. Harderovici, 1791.)

Mayer Beſchreib. d. menſchl. Körpers. B. VI. p. 169. (huic ſententiae fere aſſentiens contendit, in ſtatu corporis humani aegroto in majori tamen quantitate reperiri.)

Greding l. c. p. 318. ſqu. (In VIII. e XXVI. epileptico-furioſis circa ima erat collocata.

In VII. e XVI. epileptico-fatuis et in X. e XX. epilepticis ob aquae copiam non erat detegenda.

In VIII. e XXVI. epileptico-furioſis oblongam linearemque exhibuit figuram; in caeteris ex his ſolitam.

In II. e XVI. epileptico-fatuis ſolitam magnitudinem excedit; in IV. ex his nimis parva erat et in caeteris ſolitae magnitudinis.

In XX. epilepticis ſolitae magnitudinis erat.

In IV. e XVI. epileptico-fatuis mollitiem nimiam; in III. ex his duritiem excedentem et in V. e XX. epilepticis mollitiem nimiam oſtendebat.

In III. e XXVI. epileptico-furioſis lapillus major; in V. lapillus modicae magnitudinis hiſpidusque; in IV. Acervuli.

In III. e XVI. epileptico-fatuis lapillus.

In IV. e XX. epilepticis lapillus; in III. ex his acervuli XX—XXX.)

i) *Cere-*

i) *Cerebelli maſſa.*

α) *Juſto durior.*

Lieutaud l. c. p. 443. obſ. 469. — Morgagni.

β) *Juſto mollior et aquoſa.*

Greding l. c. p. 325.

(In XIV. e XXVI. epileptico-furioſis.

In V. e XXIV. epileptico-fatuis.

In omnibus quoque XX. epilepticis.)

k) *Medulla oblongata.*

Lieutaud l. c. p. 357. obſ. 160. (In parte anteriore medullae oblongatae color e flavo nigricans, cum mollitie praeternaturali, adeo ut ſemicorrupta apparuerit. — Morgagni.)

l) *Ventriculus quartus.*

Greding l. c. p. 326. (In permultis e XXVI. epileptico-furioſis turgeſcens ab aqua; in IV. modice plenus; in V. diſtentus quidem, ſed vacuus.

In VI. e XVI. epileptico-fatuis nimia, in caeteris aut perpauca aut nulla aqua repletus.

In XI. e XX. epilepticis aqua turgeſcens; in IX. aut nullam aut perpaucam aquam continens.)

SECT. 2.

Columna vertebralis et medulla ſpinalis.

Cfr. J. P. Frank Orat. acad. de vertebralis columnae in morbis dignitate. vid. Ej. Delect. opuſc. med. Vol XI. Ticini 1792.

* * *

Bonet Sepulchr. anat. T. I. p. 277. (aqua in ſacra fiſtula.)

— — — p. 329. (caries vertebrarum medullam ſpinalem vellicans.)

Rhodius obſ. med. Cent. I. obſ. 49. (Cavitates medullae ſpinalis ſero acri repletae.)

SECT.

SECT. 3.

Nervi.

Ant. de Haen ratio medend. P. V. ed. ſecunda. Vienn. 1763. p. 117. (Nodus durus nervo phrenico in medio ſuo itinere arcte circumcretus, aliusque ſimilis illi, ejus loco, ubi in diaphragma abiturus erat, cum thalamis nervorum opticorum emarcidis.)

SECT. 4.

Vaſa ſanguifera.

Sauvages l. c. p. 107. (parum cruoris in vaſis invenit.)

α) Arteriae.

Johnſon Medical Obſervat. Vol. II. p. 115. (Sanguinem in defunctis epilepticis nonniſi in arteriis deprehendi.)

Musgrave Speculations and Conjectures on the qualities of the nerves. Sect. I. (idem obſervavit.)

β) Venae.

Lieutaud l. c. p. 392. obſ. 272. (Ramuli jugularium internarum humore quodam craſſiore obſtructi et variis corporibus glandulоſis compreſſi. — Act. Lipſienſia.)

— — — p. 394. obſ. 280. (Rami jugularium internarum indurati et humore glutinoſo exſiccato obſtructi. — Sponius.)

SECT. 5.

Thorax.

a) *Muſculi et membrana adipoſa.*

Greding l. c. p. 333.

(In V. e XXVI. epileptico-furioſis } muſculi emarcidi putreſcentes.)
In III. e XVI. epileptico-fatuis }

b) *Coſtae.*

Greding l. c. p. 334.

(In XIII. e XXVI. epileptico-furioſis }
In VIII. e XVI. epileptico-fatuis } molles et flexibiles.)
In XI. e XX. epilepticis }

c) *Pleu-*

c) *Pleura.*

Greding l. c. p. 335.

(In VII. ex XXVI. epil. furioſ. in latere ſiniſtro } pulmonibus fir-
In XIV. — — — — dextro } miter concreta.
In III. ex XVI. epil. fat. in latere ſiniſtro }
In VI. — — — in utroque latere } modice.
In IV. ex XX. epilept. in latere dextro }
In V. — — — in utroque latere } modice.
In IV. — — — — — — firmiſſime.)

d) *Cavitas thoracis.*

Greding l. c. p. 337.

(In IX. ex XXVI. epil. furioſis }
In X. ex XVI. epil. fatuis } aquae circiter ℥j. — ℥jß.
In VIII. ex XX. epilepticis }

Lieutaud l. c. p. 430. obſ. 414. (aquae copia thoracem replens. — Mangolt.)

e) *Pulmones.*

Bonet Sepulchr. anat. L. I. Sect. XII. obſ. 34. (lobus dexter niger inſtar atramenti.)

E. N. C. Dec. II. ann. X. obſ. 20. (Veſicae grandes in pulmonibus.)

Greding l. c. p. 339.

(In VI. ex XXVI. epil. furioſ. in utroque latere } pulmones ſcir-
In V. ex XVI. epil. fat. — — — } rhoſi indu-
In XI. ex XX. epilepticis — — — } rati.)

— — — p. 340.

(In V. ex XXVI. epil. furioſ. in latere ſiniſtro }
In III. ex XVI. epil. fatuis — — dextro } purulenti lace-
In VII. ex XX. epilepticis in utroque latere } rati.)

— — — p. 341.

(In IX. ex XXVI. epilept. furioſ. in utroque latere }
In II. ex XVI. epil. fatuis in latere ſiniſtro } flaccidi
In X. — — — in utroque latere } membrana-
In VII. ex XX. epilepticis — — — } cei.)

Gre-

Greding l. c. p. 342.

(In VI. e XXVI. epil. furioſ. in utroque latere magna copia ſanguinis nigreſcentis ſpumoſi.

In VII. — — — in utroque latere magna copia ſanguinis fluidi non ſpumoſi.

In IV. e XVI. epilept. fatuis in utroque latere aquae feculentae et pituitae copia.

In III. — — — praeſertim in lobulis inferioribus copia ſanguinis nigri ſebacei.

In VII. e XX. epilepticis in utroque latere copia ſanguinis nigri ſebacei.

In V. — — — in utroque latere fluidum tenue feculentum ſanguinem aemulans.)

Lieutaud l. c. p. 448. obſ. 480. (Pulmones purulenti coſtis adhaerentes. — Baader.)

Vieuſſens (Raim. de) Hiſtoire des maladies internes. Oeuvre poſthume. à Toulouſe 1714. 4. p. 113. (dura corpora in pulmonibus.)

f) *Pericardium.*

Cappel (G. F.) obſervat. anatom. Dec. I. Helmſtad. 1783. 4. p. 15. (Pericardium cordi firmiter adhaerens. Nullus inter cor et pericardium humor.)

Greding l. c. p. 343.

(In II. epilepticis cum totius cordis et utriusque auriculae ſuperficie plenarie concretum.

In XII. e XXVI. epilept. furioſ. modica
In XIV. — — — nimia
In III. e XVI. epil. fatuis perpauca
In VI. — — — modica
In VII. — — — nimia et quidem in IV. ex his rubra cruentaque
In IX. e XX. epilepticis perpauca
In III. — — — modica cruenta
In VIII. — — — nimia

} aqua in pericardio.)

M Lieu-

Lieutaud l. c. p. 430. obſ. 414. (aqua in pericardio. — Mangold.)
— — — p. 448. obſ. 480. (a) (— — — Baader.)

g) *Cor.*

Greding l. c. p. 345.
(In XII. e XXVI. epileptico-furioſis ſolitae magnitudinis.
In IX. — — — juſto majus.
In V. — — — juſto minus.
In IX. e XVI. epil. fatuis ſolitae magnitudinis.
In V. — — — juſto majus.
In III. — — — juſto minus.
In XII. e XX. epilepticis ſolitae magnitudinis.
In III. — — — juſto majus.
In V. — — — juſto minus.)

— — — p. 346.
(In XII. e XXVI. epil. furioſis
In XI. e XVI. epil. fatuis
In nemine e XX. epilepticis } flaccidum et relaxatum.)

— — — p. 348.
(In XIV. e XXVI. epilept. furioſis
In III. e XVI. epilept. fatuis
In X. e XX. epilepticis } adipe obvolutum.)

Pew mediz. Skizzen. p. 38. (Cor dilatatum.)
W. G. M. B. in Philoſ. Transact. T. XIV, n. 157. (mirifice dilatatum.)

α) *Ventriculi cordis.*

Greding l. c. p. 348.
(In VI. epil. furioſis
In III. epilepticis } uterque vacuus.
In IV. epil. furioſis
In II. epil. fatuis } ſiniſter vacuus.
In VI. e XXVI. epil. furioſis ſanguis tenuis aquoſus in utroque.
In VII. — — — polypi adipoſi in utroque.
In VIII. — — — ſanguis nigreſcens ſebaceus in dextro.
In III. e XVI. epil. fatuis nihil in utroque.

In IV.

In IV. e XVI. epil. fatuis ſanguis tenuis aquoſus in dextro, ſiniſtro vacuo.
In V. — — — polypi adipoſi in utroque.
In II. — — — — — in dextro.
In II. — — — ſanguis tenuis aquoſus in utroque.
In III. e XX. epilepticis uterque vacuus.
In IV. — — — in utroque polypi adipoſi et in dextro ſanguis ſpiſſus ſebaceus.
In VII. — — — in utroque ſanguis ſpiſſus ſebaceus et in II. ex his polypi adipoſi.
In VI. — — — in ſiniſtro ſanguis ſpiſſus nigreſcens; in dextro polypi grandes adipoſi.)

Medical obſervations and Inquiries. Vol. II. (Ventriculus cordis ſiniſter ruptus.)

W. G. M. B. in Philoſ. Transact. T. XIV. n. 157. De polypo in corde viri epileptici, icterici, anheloſi, palpitationibus cordis infeſtati, reperto. (Polypus in dextri ventriculi apice, radicatus, ramoſus, in venam cavam protenſus usque in jugulares, fibroſus, velamento obductus proprio.)

β) *Auriculae cordis.*

Greding l. c. p. 350.
(In X. epil. furioſis polypi veri in ſiniſtra.
In VIII. epilepticis polypi adipoſi in utraque.)

h) *Diaphragma.*

Bonet Sepulchr. anat. Lib. I. Sect. XII. obſ. 24. (Ulcus diaphragma rodens.)

S E C T. 6.

Abdomen.

Cfr. P. II. Cap. IV. Sect. X.

a) *Omentum.*

Lieutaud l. c. p. 430. obſ. 414. (putridum. — Mangold.)

b) *Ventriculus.*

Bertram (A. G.) D. de ſpaſmo ex inanitione conjecturae. Halae 1781. (vaſorum infarctus in ventriculo.)

Delii (H. F.) amoenit. med. Dec. V. in praefat. Lipſiae 1745. 8.
(foramen magnitudine floreni oriſque callofis prope pylorum.)
Morgagni l. c. Epiſt. LXII. art. 2. (Ventriculus inflammatus.)
Sauvages l. c. p. 105. (maculae exiguae rubrae in tunica villoſa.)
Sorbait (Paul. de) univerſa medicina. Norimberg. 1672. fol. p. 85.
(Ventriculus eroſus et perforatus.)

c) *Hepar.*
Bertram (A. G.) diſſ. cit. (duris tuberculis obſitum.)
Lieutaud l. c. p. 430. obſ. 414. (duplo majus, quam naturâ eſſe debet. — Mangold.)

d) *Veſicula fellea.*
E. N. C. Dec. II. Ann. VII. obſ. 23. (Pori biliarii calcarea materia obducti.)

e) *Lien.*
Bonet Sepulchr. anat. Lib. I. Sect. XII. obſ. 42. (ſcirrhoſum flavidi coloris.)
Lieutaud l. c. p. 430. obſ. 414. (ingens. — Mangold.)
Miſcell. Nat. Curioſ. Dec. I. Ann. VI. p. 177. (induratum.)

f) *Meſenterium.*
Lieutaud l. c. p. 430. obſ. 414. (putreſcens. — Mangold.)
Sauvages l. c. p. 107. (glandulae meſenterii tumidae.)

g) *Inteſtina.*
Bertram, in diſſ. cit. (Aſcaris lumbricoides vivens in duodeno.)
Bresl. Samml. April, 1720. p. 445. (Ilei intus ſuſceptio.)
— — — 1721. p. 413. (nummus argenteus deglutitus in valvula coli haerens.)
— — — 1725. p. 421. (carnoſum concrementum in inteſtinis.)
E. N. C. Dec. II. Ann. II. obſ. 152. Schol. (Globuli pingues inteſtinis adhaerentes.)
Harder Apiarium. Baſil. 1687. 4. obſ. 99. (Inteſtina tenuia eroſa.)
Lieutaud l. c. p. 430. obſ. 414. (vermibus ſcatentia. — Mangold.)
Pechlin Obſerv. med. L. II. obſ. 29. (valde diſtenta.)

h) *Re-*

h) *Renes.*

Bartholin Hiſtor. anat. Cent. V. hiſt. 61. (Calculi in renibus.)

Brendel Opuſc. med. T. I. p. 59. (Calc. in renib.)

E. N. C. Dec. II. Ann. X. obſ. 20. (Calc. in renib.)

La Motte Traité de chirurgie. T. II. p. 419. (Calc. in renib.)

i) *Uretheres.*

Brendel l. c. p. 59. (Calculi in dextro.)

k) *Veſica urinaria.*

Zacut. Luſitan. prax. L. VII. obſ. 6. (grummoſus ſanguis in collo veſicae retentus.)

l) *Genitalia.*

Zacut. Luſitan. l. c. L. II. obſ. 119. (Semen corruptum in vaſis deferentibus congeſtum.)

APPENDIX II.

De Aura ſic dicta epileptica.

§. I.

Hocce nomine inſignita eſt iſta hic inde obſervata major minorve ſenſatio vaporis praeſertim frigidi in omni quadam corporis praeter caput parte ſeſe commoventis et fere ſemper ad caput aſcendentis, unicuique paroxyſmo epileptico praeſagii inſtar antecedens. Hoc ſymptoma anteſignanum epilepſiae proprium ſingularemque attentionem demerens multifario modo ſeſe offert obſervatori. Alii hanc ſenſationem quaſi ab afflante aura frigida productam; alii vapori frigido ſimilem aut pruritum ceu formicarum reptationem ſenſim emergentem; alii frigidae undae verſus caput fluctuationem imitantem; ſaepe etiam nonniſi ſurſum factam motitationem quamdam absque ſenſu peculiari obſervaſſe aſſerunt. Ipſae vero hae ſenſationes plerumque ex eo corporis loco, cui epilepſiae cauſa materialis veriſimiliter inhaeret, exſurgunt, et, quando ad caput devenerint, ipſe morbus cum ſenſuum mentisque interceptione et membrorum convulſionibus aegros invadit. Plerumque, et quidem ſecundum plurium ſcriptorum obſervata, nervorum ad cerebrum tendentium viam ſequuntur, etſi Cl. Cullen (v. Ej.

An-

Anfangsgr. der Arzneiw. Th. III. p. 167.), eas hanc praecipue eligere viam, neget et plerumque nonniſi per cutem progredi contendat. Quam ob rem varii jam dudum bono interdum ſucceſſu tentavere, vel inſtituta iſtius partis, unde iſta anteſignana ortum trahit aura, compreſſione, vel ligatura, vel applicatis cauſticis et uſtionibus, aut adhibito fonticulo aut cauſae materialis plenaria exſtirpatione, ipſius denique nervi diſciſſione avertere paroxyſmum, quin ipſi tandem malo imponere finem.

§. II.

Praemiſſa nunc hujus ſymptomatis deſcriptione ſecundum clariſſimorum ſcriptorum obſervata, liceat mihi quaedam enarrare obſervata, quae mecum meus, dum inter vivos erat, Fautor atque Amicus pie colendus, beat. Rehfeldt, Sacr. Majeſt. Suecicae Archiater atque in Academia Gryphica artis medicae Profeſſor experientiſſimus, ex ſua ſat ſatis vaga experientia benigne communicavit. Obſervavit nempe ille vir, animi ac eruditionis praeſtantia clarus: aegrotos taliter affectos tunc tantum hujus aurae ad caput usque aſcenſum ſenſu quaſi proſequi poſſe et hujus ſenſationis usque ad aggreſſum ad caput ſibi conſcios fuiſſe, ſi aura illa e quodam ſuperiorum extremitatum loco ſit orta: Si autem ex quodam abdominis aut inferiorum extremitatum loco ortum duxerit, ejus aſcenſionem tantum usque ad diaphragmatis regionem aut ſic dictum cordis ſcrobiculum ab aegro eſſe perceptam.

Porro Cl. ille Vir mecum communicavit, a quibusdam hyſterico-epilepticis, chloroticis, gracilisque ſtructurae hancce auram plus minusve, ut ajebant, calidam eſſe perceptam et quidem ab una ex illis aſperſioni guttarum aquae fervidae ſurſum currentium aequantem eſſe deſcriptam.

§. III.

Praeluſtranti mihi tantam copiam librorum, de epilepſia tractantium, mirum ſaepius videbatur, quod de hoc antiquitus jam cognito, ſaepius ventilato, non raro et certe memoratu ac contemplatione digniſſimo ſymptomate tam pauca minusque accurata in iis relicta inveniantur obſervata. Plurimi eam quidem et ejus curſum aſcenſorium deſcribunt, de ejus cauſa ſingularique natura autem nulla habentes. Ipſe Cl. Tiſſot (l. c. p. 167.) perpauca et Cl. Greding (certe omni laude memorandus epilepſiae obſervator) nihil hac de re commemorarunt. Sed et mihi ex propria experientia

quae-

quaedam afferre non licitum eſt, ideoque ſufficiat, quaedam veterum et recentiorum de hoc ſymptomate commenta, caſus variis e ſcriptoribus collectos et illa denique ex therapeuticis adminiculis deſumpta ad auram epilepticam reſpicientia in medium proferre.

§. IV.

Jam Pelops, Galeni praeceptor, de epilepſia docuit: ejus fomitem ſaepius exiſtere in alia praeter caput parte et morbum ipſum aut per continuationem partis aut flatuoſam per ſubſtantiam (πνευματικήν τίνα ὥσπερ αὖραν) transmitti.

Galen. de loc. affect. L. III.

Galenus (in loc. cit.) ſtatuit humorem morbificum aliunde ad caput aſcendentem. En! prima apud veteres veſtigia ſic dictae aurae epilepticae, quae autem ſaepius in epilepticis diverſimode obſervata omnem veterum attentionem omnino excitavit, ideoque illos in falſam illam induxit opinionem, epilepſiam ſemper ab aura quadam trahere ortum. Et quum plurimi ſcriptores medii aevi, nec non ſeculi XVI. et XVII. Galenicis et veterum ſententiis proprias ſuperſtruxerint, facile dijudicamus, unde veniat, quod tanta copia definitionum epilepſiae et ejus cauſae proximae contineat aurae aut vaporis ideam.

Vid. Part. II. Cap. I. et III. (Definitiones Donati, Foreſti, Fuhrmanni, Heurnii, Horſtii, Langelotti, Michaelis et Sennerti.)

Exinde quoque certius mihi evadit, Coelleri, Helmontii aliorumque ſententias de archeo ut epilepſiae cauſa ortas eſſe.

§. V.

Erant autem alii, qui iſtae opinioni (auram aut vaporem ſemper eſſe epilepſiae cauſam) firmiter oppugnabant, omnem fere epilepſiae ortum ex extremitatibus negantes, ex quibus nominaſſe ſufficiat:

Mödt (Barthol. de) Patholog. cerebr. p. 423.
Piſo (Carol.) de morb. a colluv. ſeroſ. p. 140.
Thoneri (Auguſtin.) de admirandis convulſivis motibus. Lib. IV. Ulm. 1651. 4. p. 90.
Willis (Thom.) de morb. convulſivis, paſſim.

§. VI.

§. VI.

Ex recentioribus praecipue Cel. Cullen et Cel. Rahn etſi perpauca, quaedam tamen de hac materia commemorarunt. Quae Cl. Cullen in medium profert, praecipue adminicula therapeutica, v. c. ligaturam et cauteriſationem, reſpiciunt.

v. Cullen Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. p. 166. et 174.

Cel. Rahn ſequentes vias, in quibus producitur aura epileptica, diſtinguit:

1) Cauſa occaſionalis paroxyſmi epileptici, ipſi loco, ubi praeviae iſtae ſenſationes percipiuntur, inhaeret.

2) Cauſa occaſionalis in alio quidem loco ſubeſt; is vero, ubi ſenſationes iſtae praecedunt, ad reliquas ſyſtematis ſentientis atque irritabilis partes (quibus nititur conſenſus) ita ſeſe habet, ut nonniſi ejus intercedente mutatione a cauſa iſta occaſionali (alibi latente) proxima epilepſiae cauſa enaſci queat.

v. Rahn Briefwechſel mit ſeinen ehmalig. Schülern. Samml. I. Zürch 1787. p. 524—527.

Cel. Junker tertium denique caſum ſequenti ratione conſtituendum eſſe putat:

Cauſa occaſionalis loco, quem dictae ſenſationes tenent, neque inhaeret, neque, ut malum (proximam ſcilicet epilepſiae cauſam) inducat, intercedente iſtius loci mutatione (ligatura etc. alias praecavenda) eget.

v. J. C. G. Junker Conſpect. rerum, quae in pathologia medicinali pertractantur. Vol. II. Halae 1790. p. 70.

§. VII.

Relatis nunc iis, quae mihi de hujus ſymptomatis deſcriptione et theoretica magis contemplatione extitere, ſupereſt, ut caſus hocce ſymptoma reſpicientes hinc inde repertos lectoribus denotem.

Alexand. Trallian. L. I. cap. 15. (aura a planta pedis aſcendens.)
A. N. C. Cent. I. obſ. 80. (a pede aſſurgens.)
— — — obſ. 85. (ex brachio.)
— — Vol. VIII. obſ. 13. (e manu.)
Bang, in Act. Societ. med. Havn. T. I.
Bartholin l. c. Cent. VI. hiſtor. 78. (ex pede.)

Bin-

Binninger obſ. med. Cent. II. obſ. 16. (e pollice pedis.)
Bonet Sepulchr. anat. T. I. p. 291. (Pruritus reptantium formicarum inſtar in regione inguinali ſiniſtra cum intumeſcentia in hacce regione ad plantam pedis deſcendens, tunc ſubito ad caput aſſurgens et paroxyſmum producens.)
Borelli Obſervat. med. Cent. II. obſ. 95. (a pollice pedis.)
Burnet Theſaurus medic. pract. Genevae 1676. 12. T. II. p. 463. (a crure.)
Cardani (Hieron.) opp. omn. T. X. Tract. de epilepſia.
Decker praxis Barbettiana. Lugdun. 1669. 12. p. 13. (a pollice pedis.)
— — — p. 15. (ex hypochondrio.)
— — — — (e pollice manus ſiniſtrae.)
Donati (Marcell.) de hiſtor. med. mirab. L. II. p. 146 et 147. (plures veterum obſervationes compilavit.)
Dovinetus, v. Schenk l. c. p. 118. (pruritus labii ſuperioris aſcenſorius.)
E. N. C. Dec. I. Ann. I. obſ. 85. (ex hypochondriis.)
— — — Ann. III. obſ. 336. (e brachio.)
— — Dec. II. Ann. I. obſ. 161. (e pollice pedis.)
— — — Ann. IX. p. 459.
— — — Ann. X. obſ. 20.
Epiphanii (Ferd.) Centum hiſtoriae. Venet. 1611. fol. hiſtor. 24.
Fernelii Patholog. L. V. cap. 3. (e ſummo vertice.)
Galen. de loc. affect. L. III. cap. 11. (a femore.)
Gilibert (J. E.) Samml. pract. Beob. und Krankengeſch. aus d. Lat. von E. B. G. Hebenſtreit. Leipzig 1792. p. 275. (a pede iniens.)
Grübel (J. G.), in E. N. C. Dec. II. Ann. VIII. obſ. 36. (a digito aſcendens.)
Hagendorn l. c. Cent. I. hiſtor. 6. (a pollice pedis.)
Heer (ab) obſerv. med. p. 275. (a pedis pollice.)
Helwig (J.) obſerv. poſth. med. phyſic. edit. a Luc. Schroekio. Auguſt. Vindelic. 1680. 4. p. 135. (a lumbis aſcendens.)
Herbert, vid. Comm. Lipſienſ. Vol. IV. p. 233. (a pollice pedis.)
Hoechſtaetter l. c. Dec. IV. caſ. 7. (e ſiniſtra manu.)

Holleri (Jacob.) de morbis internis L. II. Pariſ. 1565. (a liene vapor, inde, quando praecordia attigerat, epilepſia.)
Loeffler Beiträge zur Arzn. u. Wundarzneiwiſſenſch. Th. I. Leipz. u. Altona 1791. v. Richter chir. Bibl. B. XII. p. 327. (a planta pedis ad caput aſcendens.)
Mangor (C. E.), in Act. Soc. med. Havn. Vol. II. Havniae 1791. 8. pag. 452.
Merklin (G. A.), in E. N. C. Dec. I. Ann. VI. VII. obſ. 77. (In exigua quadam operatione in halluce peracta ortus paroxyſmus epilepticus ſaepe recurrens cum ſenſu aurae a loco operationis aſcendentis, quae labi cogebat aegrum, quam primum frontem attigerat.)
Pelargi medic. Jahrgänge. Th. III. p. 671.
Pew l. c. p. 44. (a pede ad caput aſcendens.)
Pfündel, in Hufeland Journal. B. II. St. II. p. 279. (a pede orta ad abdomen aſcendens, deinde concomitante cordis palpitatione inſtar aquae fervidae ad caput aſſurgens. Ligatura ſupra genu applicata ſemper impedivit paroxyſmum. Obſervavit autem aeger, ſe exinde majorem debilitatem percepiſſe, quam ſi ipſum perpeſſus fuit paroxyſmum.)
Plater (Fel.) Obſervat. ſelect. p. 470. (a pede cum tremore pedis ſenſim aſcendens.)
Raulin Traité des affections vapoureuſes. p. 43. (a planta pedis.)
Rhodius l. c. Cent. I. obſ. 57. (ex pollice dextr. manus.)
Salmuth Obſervat. Cent. I. obſ. 90. (a crure.)
Schellhammer, in E. N. C. Dec. II. Ann. VII. obſ. 197. (aura ante paroxyſmum a cerebro ad brachium deſcendens.)
Schenk l. c. p. 119. (a dorſo pedis usque ad praecordia.)
Schulz de Cinnabari. p. 136. (a pollice pedis.)
Short (Thom.), in Edinb. Verſuch. B. IV. p. 334. (a loco quodam pedis, in quo deinde concrementum detegebatur cartilagineum piſiforme, quo exciſo aegrota ab epilepſia liberata eſt.)
Tiſſot l. c. p. 89—100.
Tulpii Obſervat. med. Lib. I. caſ. 9. (a ſiniſtra regione abdominis.)
— — — caſ. 10. (a vulva.)

Tulpii Obſervat. med. L. IV. caſ. 2. (a pollice pedis.)
Zacut. Luſitan. Prax. admirand. L. I. obſ. 22. (ex pollice manus.)

§. VIII.

Quae ex therapeutica cultri chirurgici, cauterii, ligaturae et uſtionis adminiſtratione ad illuſtrandam hancce materiam nobis extant, ſequentia praecipue exhibent momenta, quorum documenta ſub quovis congruo articulo in catalogo medicamentorum invenies.

1) Epilepſia ſic dicta pediſymptomatica ſaepius per deſtructionem ejus partis, ex qua ea aura aſcendit, exciſionis, uſtionis aut cauterii ope eſt ſanata.
2) Partium vicinarum ſitu aut aliis circumſtantiis, hujus loci plenariam deſtructionem impedientibus, ſaepius jam veſicatorii aut fonticuli ad hunc locum applicatio morbum aut plane ſuſtulit aut imminuit.
3) Aura iſta aſcenſorium nervi cujusdam curſum comitante, tranſciſſio hujus nervi optimum interdum praebuit effectum.
4) Ligatura ſat ſatis firma, non procul ſupra originem aurae applicata repetitaque, ſaepius epilepſiam plenarie ſuſtulit, ſaepiſſime hujus morbi paroxyſmos magnopere debilitavit.
5) Impedito quidem per hancce ligaturam epilepſiae paroxyſmo ſaepius tamen in parte infra ligaturam tantae excitatae ſunt convulſiones partiales dolorificae, ut iſtas ne vix quidem tolerare poſſet aegrotus, ſed ligaturae potius deſideraret ſolutionem.
6) Quod omnium medicamentorum ſors eſt, et haec therapeutica adminicula a quibusdam artis medicae peritis incaſſum ſunt tentata.

APPENDIX III.

Veterum et recentiorum ſententiae de lunae aſtrorumque influxu in epilepſiam.

§. I.

Cuivis medico de artis noſtrae hiſtoria bene verſato haud aliena erunt aſtrologica veterum commenta, quibus deinde ſaeculum noſtrum eſſe expurgatum merito gaudemus. Sana experientia nullo modo illa probante, pertinent nunc iſta ad haereſes litterarias, quorum aſſeclam hodie ſe profitetur facile nemo. A veteribus autem tanti momenti in epilepſiam habebatur aſtrorum influxus, ut hancce ob cauſam epilepſiam nuncuparent morbum aſtralem aut ſideratum.

v. Paracelſus de morbo caduco. L. III. §. 3.
Storch von den Kinderkrankh. B. II. p. 68.

Putabatur enim omnino morbus ab aſtrorum conjunctione dependens.

v. Benedicti (Alexandr.) de omnium a capite ad calcem morborum cauſis Libr. XXX. Venetiis 1533. fol. p. 113.
Fludd (Rob.) de Aſtrologia L. VII. de Macrocosmo Tr. II. Part. X. Francofurt. 1624. p. 79.
Foreſt. (Petr.) Obſervation. Lib. X. obſ. 60.
Gabuccini (Hieron.) Lib. III. de morbo comitiali. Venetiis 1561. paſſim.
Hartmann Introd. in philoſ. vitalem. p. 19. et 32.
Juvellina (B. C. a) Tract. aſtrolog. ad medicinam pertinens. Venetiis 1666. 4. p. 133.

Sic et Mercurio praecipuam tribuit vim huic morbo regnandi auctor quidam, ſcientiam nobis plane tradens aſtrologicam, ſcil.

Ganivetus, in libro, cui titulus eſt: Amicus Medicorum. Francof. 1614. p. 266.

§. II.

In morbi hujus medela non negligendam eſſe aſtrorum contemplationem, veteres putarunt, e. g.

Camerarii Memorab. Cent. VIII. part. 64. (Anticpileptica rectius poſtero

poſtero die, quam hora conjunctionum luminarium eſſe propinanda.)

Theophraſt. Paracelſus de morbo caduco. p. 602. (Viſcum adhibendum eſſe aſcendente aſtro.)

§. III.

Relictis vero hisce, quae in pathologica et therapeutica hujus morbi conſideratione nullius momenti hodie habebantur, transeam ad illa, quae de lunae in epilepſiam influxu apud varios extant auctores. Veteres quoque et lunae nimiam tribuiſſe vim et perpauca vera innumeris falſis fabuloſisque mixta, nobis tradidiſſe, minime eſt negandum. Interea quoque ad hunc usque diem hisce obſervatis aliquid veri ineſſe omnino videtur, nec plane negligendam eſſe juſtam in lunae phaſes morborumque quorundam periodos attentionem.

Cfr. Treatiſe on ſol-lunar influence in fevers etc. by Fr. Balfour. Second Edition. London 1795. 8.

Tota haecce doctrina ad ſolam experientiam eſt reducenda, quum nudum ratiocinium hic fere nihil efficiat. Sola analogiae via ingredientibus pauxillum lucis nobis detegere licet. Luna nempe, quae maris fluxum et refluxum certe efficere habebatur, aequali vi paribusque viis agere poteſt, uti in reliquam terrae ſuperficiem ejusque atmoſphaeram ac tempeſtatis mutationes, ita quoque in ea, quae in terra creſcunt, nec non in animantia, quae iis ſtrictiſſimo vinculo ſunt conjuncta.

De actione lunae in maris fluxum et refluxum

cfr. Gehler (J. S. T.) phyſical. Wörterb. Th. I. Leipzig 1787. 8. Artikel: Ebbe.

De imperio lunae in tempeſtatum mutationes conferas, quae indefeſſo ſtudio ex propria et fida obſervatione per L. annos collecta dedit Cel. Toaldo in libro, cui titulus:

Della vera influenza degli aſtri nelle ſtagioni et mutazioni del tempo. Saggio meteorologico di Giuſeppe Toaldo, in Padova 1770. 4.

§. IV.

Nec raro quidem epilepſiae paroxyſmi periodice circa novilunium et plenilunium redeuntes obſervantur et quidem in ea praecipue epilepſiae ſpecie, quae aut ex verminoſa quadam corporis conſtitutione et menſium anomalia eſt derivanda, aut quae iis quodam modo juncta ſeſe nobis offert. Hocce phaenomenon jam antiquitus ſat ſatis obſervatum veterum attentionem omnino excitavit, ideoque eorum ſcripta de epilepſia tractantia lunae in huncce morbum influxum minime omittunt. Tantopere autem aſtrologicis commentis, nec non fabuloſis aſſueti hypotheſibus non poſſunt non, quin et de hac materia tractantes vera fabuloſis commiſceant. Quosdam ex iis et recentioribus nominaſſe ſufficiat. e. g.

Alexand. Trallian. l. c. L. I. cap. 15. (Tempore interlunii natos epilepſiae magis obnoxios eſſe.)

Aretaeus de cauſ. et ſign. morbor. Lib. I. cap. 4. (epilepſiam circa certas lunae phaſes commoveri.)

Arnoldus a Villanova, in Breviario, p. 1076. (edit. opp. Taurell. Baſil. 1585. fol.) (epilepſiam tempore lunae dividuae a phlegmate corporis humani, tempore novilunii et plenilunii a ſanguine, et tempore lunae decreſcentis a melancholia ortum ducere.)

Bartholomaeus Anglicus de proprietatibus rerum. Lib. VII. cap. 9. (Si epilepſia fuerit ex melancholia, in defectu lunae maxime laedere et infeſtare; ſi vero ex ſanguine et phlegmate, magis in plenilunio ſeſe oſtendere.)

Burmeſter (J. J.) D. de morbo ſpaſtico etc. Gotting. 1791. p. 20.

Camerarius (Jo.) Memorab. Cent. II. partic. 38. (epilepſiae novilunii tempore exaſperationem declarare ſtudet.)

Galen. de dieb. critic. L. III. (lunam dirigere periodos in epilepticis.)

Helmont (J. B.) oper. omnia. Venet. 1651. fol. (paſſim.)

Hofmann (Fr.) Inſtitut. L. III. cap. 88. (tempore interlunii natos epilepſiae magis obnoxios eſſe.)

Jaſon a Pratis de cerebri morbis. Baſil. 1549. 8. p. 349. (epilepſiam humidam recurrere creſcente luna; ſiccam decreſcente luna.)

Mead (R.) de imperio ſolis et lunae in corpora humana. Londini 1704. 8. (novilunii et plenilunii tempore frequentiores eſſe epilepſiae paroxyſmos.)

Paracelſi (Theophr.) oper. omn. T. I. Argentor. 1616. (paſſim.)

Riverii (Laz.) Arcana. Venet. 1676. 4. p. 97. (epilepſiam oriri e coitu ſolis et lunae.)

Rumpelt (C. A. F.) D. ſ. pathologiam epilepſiae. Lipſiae 1793. 4. pag. 39.

§. V.

Gratiores utilioresque ſeſe nobis praebent illi ſcriptores, qui nuda obſervata de periodicis epilepſiae paroxyſmis lunae phaſibus congruis nobis tradiderunt, ex quibus ſequentes denotare mihi licuit:

A. N. C. Cent. I. p. 137. (periodica lunaris.)

— — Dec. I. Ann. II. obſ. 95. (period. lunar.)

— — Dec. II. Ann. II. obſ. 148. (— — —)

— — — Ann. III. obſ. 40. (— — —)

Bartholin (Thom.) l. jam ſaepius citat. (puella epileptica maculis nonnullis in facie notata, quae ſecundum mutationes lunae reſpectu coloris et ambitus mutatae ſunt.)

Burmeſter (J. J.) Diſſ. cit. p. 20. (in virgine octodecim annorum bis quovis menſe in primo nempe et ultimo lunae quadrante paroxyſmus.)

Hornung (Jo.) ciſta medica. Norimb. 1625. 4. p. 404.

Mead (Rich.) l. c. (plures obſervationes tradens, puellae mentionem facit quotidie fere epilepticae, cujus pater, filiae clamore epileptico noctu expergefactus, in vicino fluvio Thameſi maris ſemper obſervavit refluxum.)

Pitcairn (Archib.) opuſcul. med. Roterod. 1714. 4. p. 74.

Plater (Fel.) Obſerv. Lib. I. p. 19. (diuturna lunatica cum menſium ſuppreſſione.)

Stahl (G. E.) Theor. med. pathol. P. II. S. III. p. 683. (periodica tempore lunae decreſcentis.)

— — — D. de haereditaria diſpoſitione in varios morbos. Halae 1706. §. 76. p. 48. (omnia ejusdem familiae membra pubertatis tempore paroxyſmis epilepticis obnoxia ſecundum lunae phaſes ſeſe mutantibus.)

§. VI.

Et ad morbi hujus medelam neceſſaria olim putabatur lunae phaſium accurata conſideratio; nec plane omnino ejus influxus interdum tamen, affirmante experientia, in curatione prophylactica et medicamentis adhibendis negligendus nobis quoque videtur.

Borell (Jo.) l. c. Cent. III. obſ. 15. (♁. ſtercor. pavon. luna ſilente.)

Boyle (Rob.) de utilitate natural. philoſ. P. II. Sect. V. cap. 7. (viſcum quernum circa plenilunium eſſe adhibendum.)

Fuller (Thom.) Pharmacop. extemporan. p. 78. (Electuarium antepil. hoc loco deſcriptum, quotidiano ejus per tres vel quatuor menſes uſu jam finito, tamen per triduum aut quatriduum ante novilunium eſſe repetendum.)

Mead (Rich.) Monita et praecepta Cap. II. Sect. III. p. 37. (eodem modo electuarium ſuum ante novam plenamque lunam propinare jubet.)

Riverius (Laz.) l. c. Cap. III. obſ. 15. (♁. ſtercoris pavonis luna ſilente.)

PARS III.

PARS III.

MEDICAMENTARIA

EXHIBENS

CATALOGUM ADMINICULORUM TAM PHARMACEUTICORUM QUAM CHIRURGICORUM, EPILEPSIAE MEDELAM SPECTANTIUM, OLIM HODIEQUE USITATORUM.

Libri et Diſſertationes, medicamenta adverſus epilepſiam ſingulatim tractantes.

A Collection of engliſh Medecines experienced againſt the jaundice, dropſy, ſtone, falling ſickneſs and peſtilence. London 1615.

Henr. a Bra Catalogus medicamentorum ſimplicium et facile parabilium adverſus epilepſiam et quomodo iis utendum ſit, brevis inſtitutio. Leuwardiae 1616. 8. Arnheimiae 1693. 8.

Joann. Nicol. Pechlin D. de epilepſia et contra eam remediis. Kilon. 1678.

Aug. Quir. Rivinus D. de remediis antepilepticis terreis etc. in Ej. Collect. Diſſert. Lipſiae 1710.

Sam. Teucher D. de remediis antepilepticis aliis foſſilibus, in Ej. Disput. med. collect. Lipſiae 1710.

Abrah. Vater D. de ſpecificorum antepilepticorum, ſigillatim olei animalis virtutibus. Vitebergae 1725.

Petr. Samſon D. de epilepſia et praecipuis ejusdem ſic dictis ſpecificis. Helmſtad. 1756.

Jo. Guil. Werner D. ſiſt. obſervationes circa nonnulla remedia antepileptica uſitatiora. Regiomont. 1759.

Franc. Xaver. Millar D. de medicamentis antepil. Argentor. 1787. 4.

Fr. Guil. Maurer D. de medicamentis antepilepticis. Marburg. 1792. 8.

D. Buxtorf Bemerkungen über die Anwendung einiger gegen die Fallſucht etc. gerühmter Mittel; im Muſeum der Heilkunde. B. I. Zürich 1792. no. 44.

Franc. Berger D. de remediis ſpecificis in Epilepſia uſitatis. Francofurt. ad Viadr. 1795. 8.

De Specificis antepilepticis obſoletis et formulis compoſitorum antepilepticorum apud veteres et recentiores uſitatorum vid.

Jantkii Select. mater. medic. Tab. 2.

Jüngkenii (Jo. Henr.) Lexicon chymico-pharmaceuticum. edit. tertia. Norimberg. 1729. 8.

Junkeri Conſpect. mater. medic. p. 647.

Kovacs Tatai Hercules vere cognitus etc. p. 124—147.

Macaſii Promptuarium mater. medic. p. 6—38.

Reuſſii (C. F.) Diſpenſator. univerſal. P. II. p. 98—105.

Schroederi (Joh.) Pharmacopoea univerſalis. edit. IVta. Norimberg. 1746. fol.

Sebitz (Melch.) Manuale ſ. ſpeculum medico-practicum. T. I. Argentorat. 1661. p. 276. ſqu.

Smetii (Henr.) Miſcellan. medic. L. II. cap. 33.

Spina (Dav. de) Lexicon pharmaceutico-chymicum. Francof. ad Moen. 1702. 8.

Wedel Syllab. mater. medic. ſelect. p. 24. ſqu.

A. Aca-

A.

Acaroides reſinifera. (Reſina.)

Kite (Ch.), in Memoirs of the medical Society of London. Vol. IV. London 1795. (Reſinam hujus ab Anglis in regione Botanybay repertae plantae non absque facultate morboſam irritabilitatem atque debilitatem ſine evacuatione tollente ideoque epilepticis congruam haberi. In debilitate ex apoplecticis et epilepticis paroxyſmis remanente efficacem ſeſe praebuiſſe.)

Accipitris Cineres.

Macaſii (Jo. Georg.) promptuar. mater. med. Lipſ. 1677. 8. p. 7.

Acetum Antimonii, v. Antimonium.

Achillea (an atrata Linn.?). (Herba.)

Geſner (Conr.) Epiſtol. p. 66. (ad epilepſiam puerorum uſurpari.)

Achillea Millefolium. (Flores. Herba. Summitates. Decoctum. Extractum. Infuſum.)

Arnold. de Villanova Breviar. practic. Lib. I. cap. 22.

Crato a Craftsheim Conſil. et epiſtol. medicinal. Francof. 1595. Lib. I. conſ. 41.

Hennincer D. de Millefolio. Argentor. 1718.

Lange D. de Millefolio. Altdorf. 1714.

Normand, in Roux Journ. de Medecine. T. XXXV. à Paris 1775. p. 520.

Aconitum Napellus. (Herba. Extractum.)

Dürande, in Gardane Gazette de Santé. à Paris 1774. p. 143.

Greding l. c. T. I. p. 241. (ſemel tantum ab eo tentatum paroxyſmos mitigavit.)

Saur, in Kongl. Svensk. Acad. Handl. Vol. XXXIV. Stockholm 1773. p. 92. (paroxyſmos exaſperare videbatur.)

Aëris dephlogiſticati inhalatio.

Girtanner, in C. W. Hufeland Journ. der practiſch. Arzn. B. I. St. 2. p. 254.

Aerugo, v. Cuprum nativum.

Aeſculus Hippocaſtanus. (Cortex. — Pulvis, decoctum, infuſum, extractum.)

Gualdo (Ferd. Comes de), in Anton Turra oſſervazione me-

diche e chirurgiche intorno alla faccolta febrifughe e antiſettiche della corteccia dell' Ippocaſtano. Vicenza 1788. p. 33. (In epilepſia cum febre tertiana felici cum ſucceſſu adhibuit.)

Sabarot de la Varniere, in Journ. de Medec. T. XLVII. p. 327. (ter quaterve paroxyſmos retardaſſe obſervavit.)

Semina.

Parmentier Recherches ſur les vegetaux nourriſſantes. p. 176. et 218. (iis comeſtis paroxyſmos eſſe retardatos.)

Aes uſtum, v. *Cuprum nativum.*

Aethiops mineralis.

Rahn Briefwechſel. B. I. p. 427. (Epilepſia ſalivationi per aethiopem mineralem cedens.)

Schulze, in Fr. Schrommii D. de aethiope minerali. Altdorf. 1725. 4. p. 21. 24. (epil. verminoſam aliamque a retrogreſſis achoribus ſanans.)

Agaricus muſcarius. (Radicis ſiccati pulvis.)

Anonymus quidam in Allg. Litt. Zeit. 1793. n. 246. (per triginta et quae ſuperſunt experimenta efficaciam ejus ſpecificam in epilepſia a terrore eſſe expertum. Intrare quoque remedium antepil. Ragolo putat.)

Bernhard (Jo. Chriſt.) chym. Verſuche und Erfahr. aus Vitriol etc. und Fliegenſchwämmen kräftige Arzneien zu verfertigen. Leipz. 1755. obſ. 5. p. 324. (ʒj. ſemel in die cum aceto data.)

Whiſtling (Chriſt. Gothofr.), praeſ. Gruner, D. de virtutibus agarici muſcarii. Jenae 1778. p. 13. (℈ß — ℈j. ter de die cum ▽. alvum graviter movet ſudoremque ciet.)

Agathi oleum.

Medicina experimentalis Dygbaeana ins Teutſche überſezt und vermehrt. Frankfurt u. Offenbach 1687. 8. p. 330.

Alchemilla vulgaris. (Herbae Succus.)

Kovacs Tatai l. c. p. 139. (Succum a Matthiolo et Tabernaemontano tribus diebus ab ℥ij — iij. propinatum eſſe refert.)

Schröder (Jo.) Pharmacop. univerſal. p. 1105.

Alces ungula, v. *Cervus Alces.*

Allium

Allium ſativum. (Radix.)

Plinii Hiſtoriae natural. Lib. XX. cap. VI. lin. 41. edit. Hagenovae. 1518. fol. (combuſta e melle data.)

Ambra maritima.

Hofmann (Fr.) medic. ration. conſult. T. IV. p. 294. (vel pulveris forma gr. iij — iv. pondere ſaccharo permiſta vel eſſentia cum Spiritu Vini ex ea parata ad gtt. X — XX. propinata inſultus epilepticos mitigavit.)

Carbones ſic dictae ambroſiacae.

Welſch (Georg. Hieron.) propr. obſervat. med. phyſic. Auguſt. Vindelic. 1675. 4. Hecatoſt. II. obſ. 40. p. 23.

Sal volatile ambrae.

Boyle (Rob.) de philoſoph. experim. p. 418.

Amuleta.

Alexand. Trallianus. Lib. I. cap. 15. (animalia, quae nares ovium et caprarum incolunt, a Deo Delphico pro epilepſia qua amuleta eſſe indicata.)

Baldinger (E. G.) neues Magaz. für Aerzte, B. XII. St. 6. p. 494. (Joh. Hornſchuh, pſeudomedicus prope Iſenacum, epilepticis varia amuleta exhibens.)

Bartholin (Thom.) Epiſtol. Lib. III. p. 341.

— — — Hiſtor. anat. Cent. IV. hiſt. 69. (radix ſambuci ſuper ſalicem creſcentis.)

Boodt (Anſelm. Boet. de) gemmarum et lapidum hiſtoria. edit. a Wolfg. Gabelchover. Francofurt. 1603. 8. Lib. II. cap. 53. (Smaragdus.)

Caeſaris Longini Trinum magicum, p. 225. (Verſiculi certi collo geſtati.)

Camerarii (El.) Syllog. memorab. medic. Cent. III. partic. 30. (paeoniae radix.)

— — — — Cent. XVI. partic. 45. (radix ſambuci ſuper ſalicem creſcentis.)

— — — — — partic. 46. (pilum chartarum luſoriarum.)

E. N. C. Dec. I. ann. IV. et V. obſ. 42. (rad. Imperatoriae.)

E. N.

E. N. C. Dec. II. ann. II. obſ. 152. Schol. p. 346.
— — — ann. IX. obſ. 39. (annulus appenſus.)
Fehr (J. M.) de Abſynthio. Lipſiae 1668. 8. p. 84.
Foreſt (P.) Obſervation. L. X. obſ. 59. (paeonia.)
Galenus de ſimpl. medicam. facultatib. L. VI. (paeonia.)
Gottſched flora pruſſica. p. 155. (radix Lyſimachiae purpureae, ſole ultimum cancri gradum accedente, collecta colloque appenſa.)
Grube de arcanis medicis non arcanis. Cap. III. p. 52. ſqu.
Hartmann prax. chymiatr. p. 67. (Sambucus ſalici inſita.)
Hartung D. de ſuperſtitioſ. Cap. II. p. 5. (Sequentes verſiculi geſtati:

„*Haec tria qui ſecum portabit nomina regum,*
„*Caſpar fert myrrham, thus Melchior, Balthaſar aurum,*
„*Solvitur a morbo Chriſti pietate caduco.*")

Krauſe D. ſiſt. de amuletis medicis cogitata nonnulla. Lipſiae 1758. §. 25. p. 26.
Mayerne prax. medica. p. 50.
Monconys (de) Journal des Voyages. T. II. à Paris 1677. 4. p. 335. (mercuriale.)
Paullini (C. F.) de talpa. Francof. et Lipſiae 1689. 12. p. 128.
Petri Hiſpani Summa experimentorum ſ. theſaurus pauperum. Lugdun. 1525. 4. fol. 253. a. (eos, qui nomina Caſparis, Balthaſaris et Melchioris collo ſuſpenſa geſtant, epilepſiae expertes manere.)
Plinii Hiſtor. natur. L. XXIX. cap. 4. (oſſa viperina purpurea ſindone collo ſuſpenſa.)
Rolfink (Guern.) Medicin. conſult. L. II. p. 209.
Roſenſtein (N.) von d. Kinderkrankh. p. 62. (Radicis Verbenae qua amuleti etſi inutilis remedii mentionem facit.)
Spindler (Paul.) Obſervation. n. 7. Schol. (Teſticuli cati.)
Storch von d. Kinderkrankh. Th. II. Eiſenach 1750. p. 115. (Linea coralliorum a ſacerdote quodam benedicta.)
Willis de morb. convulſivis. p. 464.
Wolf (Jacob.) Scrutinium amuletorum. Cap. II. Sect. I. p. 98. ſqu.
Wunderbare Kräfte der Natur durch die Sym- und Antipathie. Frankfurt u. Leipzig 1772. p. 59. (tradit nobis ſequens e manuſcripto quo-

quodam cabaliſtico deſumptum amuletum contra epilepſiam: Lamellae aureae aut argenteae inſcribas ſequentia verba in certas lineas congeſta:

A N A N I S A P T A

N i r i t u m a i T

A r ae p i n i m a P

N i p a n ae c i m A

I t i n e t e n u S

S u n e t e n i t I

A m i c ae n a p i N

P a m i n i p ae r A

T i a m u t i r i N

A T P A S I N A N A.

* * *

Ulterior hujus expoſitio:

Antidotum Nazareni auferat necem, intoxicat, ſanctificat alimenta, pocula, Trinitas alma.

Nazarenus Jeſus rex Judaeorum, titulus victorialis, morte ab improviſo tueatur.

Almi regis aeterni patris imcomprehenſibile nomen Jehova morbum auferat peſtifer.

Noſtrum inimicum perimat antiquum nomen aetherei conditoris illud magnum Agla

Jehova trinitatis immenſae nomen et Tau eſto noſtrae victoriae ſignum

Signum victoriae noſtrae eſto Tau etc. (a tergo legenda.)

* * *

De hoc amuleto ſequentes verſiculi:

Eſt mala mors capta, dum dicitur Ananiſapta,
Ananiſapta mortem ferit, qui laedere quaerit.)

Amygdalus amara. (Nuclei.)

Plinii Hiſtor. natural. L. XXIII. cap. VIII. lin. 10. (cum melle et mentha.)

Ana-

Anagallis arvenſis. (Herba.)

Dioſcorid. mater. med. Lib. II. cap. 209.

Gaſſeri (Achill.) obſerv. med. obſ. 57.

Plinii Hiſtor. natur. L. XXV. cap. 13.

Anchuſa officinalis. (Flores.) — Vinum bugloſſatum.

Baldinger Magaz. für Aerzte. St. VII. p. 604.

Brutz (Ladisl.) D. de gramine mannae ſ. feſtuca fluitante. Viennae 1775. 8. p. 33. ſqu. recuſ. in Waſſerberg Collect. Diſſertat. Tom. III. (Sequentem dat vini bugloſſati formulam:

℞. Fl. Bugloſſi recent. collect. mpl. iij.

Infunde c. St. de faece Vini parati ℔ j.

Vitro probe clauſo macerentur per triduum. Sumat aeger vaſe inclinato cochlearj. magnum omni mane.

Duos aegrotos hocce remedio feliciter ſanavit, quorum alter jam a prima juventute epilepſia laboravit, alterque ab ea ex terrore orta erat infeſtatus.)

Martii (Galeotti) L. de promiſcua doctrina. Francofurt. 1602. 12. obſ. 42. (jam vinum bugloſſatum contra epilepſiam ori illinendum ſuadet.)

Radix.

Schröderi Pharmacop. univerſ. p. 1158. (radicis ♁ riſat. ʒß.)

Anethum Foeniculum. (☍ e ſeminibus.)

Medicina experiment. Dygbaeana. p. 315. (gtt. ij. pro doſi.)

Anemone pratenſis.

Störk (Anton.) L. de pulſatillae nigricantis uſu medico. Vindobon. 1771. (fruſtra tentata.)

Antepilepticum Bachiene, v. *Bachiene.*

— — — *Beccario*, v. *Beccario.*

— — — *Erneſti Principis*, v. *Erneſt.*

— — — *Ferdinandi I. Imperatoris*, v. *Ferdinand.*

— — — *Helvetii*, v. *Helvet.*

— — — *Leopoldgrünenſis Theologi cujusdam.*

Appel (J. J.) Diſcurſus de epilepſia. Altenb. 1713. p. 38.

— — — *Oreilly*, v. *Oreilly.*

— — — *Puerorum*, v. *Vitriol. caerul.*

Antepi-

Antepilepticum Ragolo, v. *Ragolo*.
— — — *Schachtii*, v. *Schacht*.
— — — *Willichii*, v. *Willich*.

Anthelminthica.

Beaumes von d. Convulſ. d. Kinder, p. 203. ſqu.
Gordack Geſchichte u. Kur eines epil. Frauenz. Königsb. 1770.
Hamburg. Magaz. Hamburg 1755. B. XV. p. 313.
Heiſter (Laur.) med. chir. und anat. Wahrnehm. Roſtock 1757. 8. pag. 133.
Ranoe (A. B.), in Act. Soc. med. Havn. Vol. II. Havniae 1791. 8. p. 342.
Rougeres (de), in Journal de Med. par Mſr. Roux. T. XXX. à Paris 1769. p. 51.
Thomaſius (Gothofr.), in E. N. C. Dec. III. Ann. III. obſ. 191.
Tiſſot l. c. p. 230.

Antimonium.

Bovius Flagello contro de Medici rationali. Venet. 1538. v. Haller. Bibl. pract. T. II. p. 246.
Herrmann (P.) Cynoſur. mater. med. cur. J. Boecleri. Argentorat. 1726. P. III. p. 98.
Junker D. de antim. crud. uſu interno. Halae 1750. 4.
Reiseiſſen D. ſiſt. antimon. crudum in medicina. Argentor. 1721. 4. pag. 39.

Acetum ♁nii.

Agricola (Jo.) Comm. in Jo. Poppium de acetis. Lipſiae 1638. 4. p. 769.

Antimonium calcinatum.

Riverii (Lazar.) Prax. Lib. I. cap. 8.

Butyrum ♁nii Lemery.

Spina (de) l. c. p. 199.

Ceruſſa ♁nii.

Mayerne (Theod.) Prax. p. 48.

Cinnabaris ♁nii.

Dower, in Medical eſſays of Society of Edinburg. T. II. p. 510.

Croci metallorum aqua.

Schroeder Pharmacopoea univerſal. p. 890.

Sinibaldi (Jac.) parva method. medendi. Romae 1707. 8.

Kermes minerale.

Tiſſot l. c. p. 335.

Oleum ♁nii.

Valentini (Baſil.) Triumphwagen des Antimonii d. J. Thölden. Nürnberg 1676. 8. p. 102.

Pilulae et Pulvis alter. Plumeri.

Ackermann, in not. ad Tiſſot. l. c. p. 335.

Kinneir new Eſſay on the nerves. p. 117.

Sulphur antimonii.

Dolaei encyclop. medic. p. 133.

Sulphur auratum ♁nii.

Delius (Fr.), in Nov. Act. Nat. Cur. T. II. Norimberg. 1761. n. 81. pag. 364.

Tiſſot l. c. p. 335.

Unzer, in Hamburg. Magaz. B. VIII. p. 369.

— — — — — B. IX. p. 613.

Tartarus emeticus.

1) *qua emeticum.*

Brouzet ſur l'education des enfans et leurs maladies. à Paris 1754. 12. Vol. II. p. 10.

Hofmann (Fr.) Medic. rat. ſyſtem. T. IV. P. III. p. 68.

2) *qua nauſeoſum et reſolvens.*

Beaumes l. c. p. 90.

Hirſchel (Leonh. El.) Gedanken, die Heilart der fall. Sucht betreff. fend. Berlin 1770. p. 42.

— — — medic. Nebenſtunden. Berlin 1772. p. 30.

Lentilii (Roſin.) Eteodrom. medicopract. anni 1709. Stuttgard. 1711. p. 33.

Mellin (Chr. Jac.) Mater. med. p. 16.

Werlhof (P. G.) opera omn. ed. Wichmann. Tom. III. p. 726.

Wichmann (J. E.) annot. ad Werlhofii l. c.

Wil-

Willich (M. v.), in Balding. N. M. f. A. B. VII. p. 118. (in connubio Valerianae, Squillae etc.)

Vitrum ♄ nii ceratum.

Steel, v. Beaumes l. c. p. 353.
Strandberg Tal om de Fel etc. p. 16.

Anwaldina Panacea.

Magnopere olim medicorum attentionem excitaſſe videtur. Pulvis fuſco-rubeſcens. Inventor, qui antea jurisprudentiae ſtudioſus, poſtea medicus, erat Georgius an et vom Wald. Andreas Libavius, qui hocce medicamentum chemice exploravit, partes ejus conſtitutivas, matrem perlarum, cinnabarim, mercurium pluries ſublimatum et crocum eſſe contendit. Formulam a Volkamero emendatam invenies in

Jüngken. Corp. pharmaceut. p. 276.

Ad arcani hujus hiſtoriam conferas:

Crollii (Oswald.) baſilica chymic. p. 115. (potiſſimum cinnabari conſtare, cui crocus et conchae pptae. accedunt.)

Georg an und vom Wald auf Durrnhof, J. et M. D. Phyſici Donauwerthienſis, Bericht, wie die von ihm erfundene Terra ſigillata und Univerſalarznei wider die Peſtilenz etc. hinfallende Sucht etc. zu gebrauchen. St. Gallen 1581. 4.

— — — Kurzer Bericht, wie, was Geſtalt und warum die Panacea Anwaldina als eine einige Medicin wider den Ausſatz etc. Frankfurt 1592. 4.

— — — Zum anderumal Gedanken und Bericht etc. Weſel 1594. 4.

— — — Vortrab auf Andr. Libavii Spott- und Schmachworten, daſs die Panacea Anwaldina eine Univerſalmedicin ſey. Hanau 1595.

— — — Gloſſarium in epiſtolam Libavianam. Roſchach. 1596. 4.

— — — Gemehrter Bericht von der Terra ſigillata Anwaldina, wie und was Geſtalt ſie wider Peſtilenz etc. — fallende Sucht etc. zu gebrauchen ſey. Stuttgard 1601.

Welſch (G. H.) Obſervat. Hecatoſt. II. Auguſt. Vindelic. 1675. 4. pag. 175.

Contra eam:

Libavii (Andr.) Examen Panaceae Anwaldinae. 1594. 8.

— — — Neoparacelſica, in quibus vetus medicina defenditur adverſus τερετίσματα Georgii Anwaldi. Francof. 1594. 8.

— — — Gegenbericht von der Panacea Anwaldina, auf Anwalds ausgegangenen Bericht geſtellt. Frankfurt 1595. 4.

— — — Panacea Anwaldina victa et proſtrata, oder wiederhohlter Gegenbericht etc. Frankfurt 1596.

— — — Singularium P. IV. Francof. 1601. 8. (continet ſub n. 3. Hiſtoriae Panaceariae Sectiones II. in Ambaldum, Balduinum, ſive Amwald.)

— — — — ſub n. 4. Aſclepiadem, etiam contra Anwaldum.

Scherbii (Phil.) Theſes medic. collect. et edit. a Caſp. Hofmann. Lipſ. 1614. (Examen Panaceae Anwaldinae.)

Aper, v. *Sus ſcrofa.*

Apium Petroſelinum.

Camerarii Syllog. memorab. med. Cent. XVI. partic. 21—23. (an epilepticis conducat, ventilatur et fere negatur.)

Aqua antepileptica Amſtelodamenſis.

Marggrafii (Chr.) Materia medic. contracta. Amſtelod. 1682. 4.

Spina (de) l. c. p. 65. (Sequentem ejus formulam tradit:

℞. Radic. Paeoniae maris ſiccat. ℔ ß. Angelicae. Fraxinell. Fol. Origani cretici, Rutae, Salviae, āā ℥j. Flor. Paeoniae maris, Betonicae, Liliorum convall. Roriſmarini, Tiliae, ſiccatorum. Sem. Ammios oriental. Nigellae āā ℥ ß. Paeoniae ℥ ij. Caſſiae ligneae, Caryophyll. Cardom. minor. Nuc. moſch. Olei Vitriol. āā ʒij. — Pulveriſatis pulveriſandis affund. Sp. Vini ℔ x. macer. per octiduum bene clauſo, dein colat. per ſetaceum denſiſſimum et colatura ſervetur in vitro probe obturato.)

Aqua antepileptica D. R.

Spina (de) l. c. p. 59. (Formula:

℞. Flor. Lilior. convall. ℥ viij. Paralyſ. ℥ iij. inf. in Vin. Rhen. qu. ſ. ſt. in inf. per integr. ſept. in vaſe ſtrict. orif. loco calido, deinde

inde lento igne deſtilla per veſicam; recipe huj. deſt. q. ſ. adde ▽ roſar. fr. Ceraſ. nigr. fragar. meliſſ. c. Vino deſtill. āā ℔ j. Vin. malvat. Spirit. Vin. āā ℔ j ß. M. Infund. et ſ. a. deſtilla, huic deſtillato adde Cinnamom. elect. Nucis moſch. āā ℥ j. Piper. long. Cardam. Cubeb. Caryophyll. āā ʒ vj. Sem. Foenic. ℥ j ß. Rad. Paeon. rec. ℥ j. Flor. Lavend. Roriſm. Paeon. Stoechad. arab. āā ℥ j. Herb. Paralyſ. ℥ ij. ʒ ij. St. in infuſ. per d. et noct. poſtea deſt. per ſerpentem et pro uſu repone. — Doſ. cochl. j — ij.)

Aqua antepileptica Dorncrellii, v. *Dorncrell.*
— — — *Ettmüllerii*, v. *Ettmüller.*
— — — *Hartmanni*, v. *Hartmann.*
— — — *Hirundinum Pk. Auguſt.* }
— — — — — *Fiſcheri*, }
— — — — — *le Mort*, }
— — — — — *Rolfincii*, } v. *Hirundo urbica.*
— — — — — *de Spina*, }
— — — — — *Zwölferi*, }
— — — *Jüngkenii*, v. *Jüngken.*
— — — *Langii*, v. *Langii.*
— — — *Londinenſis.*

Spina (de) l. c. p. 64. (Formula:
℞. Fl. Lilior. convall. rec. ℔ j. Inf. in Vin. hiſpan. conchiis iv. quamdiu haberi poſſunt flores recentes, tum ℞. Flor. praedict. ℔ ß. Paeoniae ℥ iiij ß. Macer. ſimul p. dies XIV. dein deſtilla ad ſiccitatem in B. M. In deſtillato liquore iterum macerentur: Rad. Dictamni alb. Ariſtoloch. long. āā ℥ ß. Flor. Viſci querc. Rutae āā mpl. ij. Sem. Paeon. decort. ʒ x. Rutae ʒ iij ß. Caſtorei. Cubebar. Macis āā ʒ ij. Cinnamom. ℥ i ß. Scillae ppt. ℥ iij. Flor. Roriſmarin. pgl. vj. Stoechad. arab. Lavendul. āā pgl. iv. Betonicae, Tunicae, Paralyſ. āā ℔ viij. Succ. Ceraſorum nigr. ℔ iv. deſtill. omnia in organis vitreis ad ſiccitatem.)

Aqua antepileptica mineralis Zwölferi, v. *Zwölferi.*
— — — *Mynſichti*, v. *Mynſicht.*

Aqua antepileptica ex Oſſibus deſtillata, v. *Oſſa*.

— — — *Puerorum*. P. A. R.

Spina (de) l. c. p. 58. (Formula:

℞. Aqu. ceraſ. nigr. flor. tiliae, paeoniae, ſquammariae āā ℥ viij. Sacchar. perlat. ℥ iv. M. Datur ad epilepſiam puerorum dentitionis tempore vel per ſe, vel cum aqua cinnamomi.)

Aqua antepileptica Reginae Daniae, v. *Daniae*.

— — — *Regis Daniae*, v. *Daniae*.

— — — *Zwölferi*, v. *Zwölfer*.

Aqua aurea veneta.

Hamburg. Correſpond. 1793. n. 184. (ad reſtringendum paroxyſmum aegris in ipſo paroxyſmo propinandum commendatur. In lagenis vitreis pro moneta aurea ſic dicta Carolina venditur Coloniis a Dn. Kaa, chori muſici praefecto ad eccleſiam cathedralem.)

Aqua catarrhalis Hofmanni, v. *Hofmann*.

Aqua cephalica et epileptica Francofurtenſium.

Spina (D. de) l. c. p. 45. (Formula:

℞. Flor. Lilior. convall. ℔ j ß. Paeon. Lavend. Beton. āā ℔ j. Tiliae, Primulae veris āā ℥ iij. Herb. Botryos c. florib. mpl. j. Rad. Paeon. ℥ ij ß. Ariſtoloch. ℥ j ß. Dictamn. alb. ℥ j. Sem. Paeon. ℥ ij ß. Cubeb. ℥ j. Piper. nigr. ℥ ß. Viſc. quern. ℥ j. ʒ ij. Corylini ʒ iij. — Macer. in Vin. Malvat. ℔ viij. per octiduum, dein deſtill. e B. M.

Aqua Ciconiae, v. *Ardea Ciconia*.

Aqua Cinnamomi contra epilepſiam Diſp. Norimb., v. *Laurus Cinnamomum*.

Aqua Cordialis temperans. Pharm. Auguſtan.

Spina (D. de) l. c. p. 49.

Aqua Croci Metallorum, v. *Antimonium*.

Aqua mineralis Borbonienſis.

Guenault (Petr.) et J. Foreſtier, Ergo epilepſiae per conſenſum ▽ae borbon. archimbaldicae. Pariſiis 1643. 4.

— — — *Brückenavica*.

Alix (M. C.) obſervat. chirurg. Faſcic. III. Francofurt. 1777. 8. vid. Richter chir. Bibl. T. IV. p. 445.

Aqua mineralis Embſenſis.

Brückmann (C. Ph.) enarratio choreae Sti. Viti et epilepſiae per fontes medicatos Embſenſes curatae. Francofurt. 1786.

— — — *Freyenwaldina.*

Heydecker (Fr. Wilh.) Beſchreib. des Geſundbrunn. und Bades zu Freyenwalde. Berlin 1795. 8. Abſchn. III.

— — — *Hornhuſana.*

E. N. C. Dec. II. Ann. X. obſ. 166.

— — — *martialis.*

Tiſſot l. c. p. 321. (in epilepſia a primarum viarum atonia cum fructu eſſe adhibendam, non autem absque praecautione ob ſpirituoſam ejus indolem humores ad caput pellentem.)

— — — *Nenndorfienſis.*

Schroeter, in Balding. N. Mag. f. A. B. XI. St. 3.

Aqua Picarum, v. *Corvus Pica.*

Aqua Tettuccina.

Sylvatici (Bened.) Conſil. et reſponſ. med. Cent. IV. Patavii 1656. fol. p. 173.

Aqua Wismuthi, v. *Wismuthum.*

Aquilae Sanguis.

Camerarii l. c. Cent. XVI. partic. 36. (laudat.)

Aquilegia vulgaris. (Herba.)

Gaſſerii Obſervat. med. obſ. 55. (Herbae expreſſum ſuccum cum ſucco lumbricorum terreſtrium laudat.)

Arcana et occulta varia.

Acta Erud. Lipſienſ. Ann. 1724. May, p. 189.

Bresl. Samml. Verſuch XVI. p. 562.

— — — Verſ. XXIII. p. 324.

Smetii (Henr.) Miſcell. med. L. II. c. 33.

Welſch Hecatoſt. II. obſ. 74. p. 45.

Arcanum Bachiene, v. *Bachiene.*

— — *Beccario*, v. *Beccario.*

— — *Fioravanti*, v. *Fioravanti.*

Ardea Ciconia.

Aqua ex ea deſtillata.

E. N. C. Dec. II. Ann. IX. obſ. 142.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1779.

Cor.

Macaſii Prompt. mater. med. p. 9.

Stercus.

Crato, v. Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1778.

Macaſii l. c. p. 9.

Argentum.

Bezoardicum lunare Zwölferi.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 740. (℈j — ʒß.)

Spina (D. de) l. c. p. 194.

Catharticum lunare.

Angel. Sala ſeptem planet. terreſtr. ſpagyr. recenſ. v. Ej. Oper. omn. p. 195. (gr. iv. — viij. bis terve tertio ſemper die cum vini malvatici aliquot unciis.)

Lapis divinus.

Sims (J.), in Memoirs of the Medical Society of London. Vol. IV. London 1795. n. 24. (in ▽ aut alio quodam congruo vehiculo ſolutus et ad ⅛ gr. pro doſi propinatus laudatur. Interdum ex ejus uſu breviter ante plenariam fugam paroxyſmi exaſperati ſunt.)

Rhümelii Extractum e ſcoriis argenti.

Rhümelii (Jo. Pharam.) Medic. ſpagyr. tripart. p. 166.

Tinctura Lunae.

Stahlii Theor. medic. p. 1019.

Unzeri Liquor viridis.

Unzeri ἱερονοσολογία. p. 10.

Ariſtolochia ſerpentaria. (Radix.)

Gruelmann D. ſiſt. obſervationes de uſu Cicutae. Gotting. 1782. p. 30. (cum nitro in epilepſ. ex terrore.)

Intrat quoque Electuarium Fulleri, v. Fulleri Electuar.

Arnica montana. (Extractum.)

Störk (Ant. v.) Medizin. pract. Unterricht für die Feld- und Landwundärzte der Oeſterreich. Staaten. Wien 1776.

Arnol-

Arnoldi a Villanova Electuarium.
Ejus oper. omn. Venetiis 1505. fol., fol. 97.
Aromatica.
Deckers (Fr.) praxis Barbettiana. Leidae 1669. 12.
Reusneri (Hieron.) experimenta et obſervationes. Ulm. 1676. 4.
Artemiſia vulgaris.
Ackermann Annot. ad Tiſſot. l. c. p. 362. (Carbo quaedam ſub radice artemiſiae reperienda et in nocte ante feſtum divi Joannis effodenda a quibusdam olim commendabatur.)
Arteriarum compreſſio.
Parry, in Memoirs of the Medical Society of London. Vol. III. London 1792. 8. p. 7.
Arteriotomia.
Severini (Marc. Aurel.) de efficaci medicina. L. III. Francofurt. 1671. fol. p. 42. (arter. temporal.)
Arſenicum album.
Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. Leipz. 1784. p. 185. (Arſenici efficaciam in febribus intermittentibus conſiderans, in epilepſia quoque non exiguum de eo ſperat emolumentum.)
Liquor arſenicalis ſ. ſolutio mineralis Fowleri. (v. Gmelin App. T. I. p. 266.)
Alexander (Edward), in Duncan medical Commentar. for the Year 1790. Dec. II. Vol. II. Edinb. 1791. n. 6. (Hujus liquoris gtt. vj — xiij., aquae fontanae ℥j., St. nucis moſchatae ʒ ij. et Syrup. Caryophyllor. ʒ ß. temperatas in epilepſia et convulſionibus a vermibus felici ſucceſſu exhibuiſſe.)
Potaſſa arſenicata. (Gmelin l. c. p. 267.)
Brugnatelli Bibliothec. fiſica. T. XIV.
Pearſon, in Duncan Med. Comm. for 1788. Dec. II. Vol. III. Edinburg. 1789. v. Auserleſ. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIII. p. 572. (gr. $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{20}$.)
Aſa foetida, v. *Ferula Aſa foetida.*
Aſinus, v. *Equus Aſinus.*
Atriplex hortenſis. (Semina intrant pulverem de Gutteta Riverii, v. Pharm. Wirtemb. p. 151.)

Atropa Belladonna. (Folia. Extractum.)

Böttcher (J. Fr.) vermiſchte mediz. chirurg. Schriften. Heft I. Königsb. 1791. 8. n. 4.

Greding (J. E.), in Ludwig. Adverſar. med. pract. Vol. I. P. IV. Lipſiae 1770. p. 637. ſqu.

— — — ſämmtl. Schrift. T. II. p. 168. (ad ſublevandos paroxyſmos parva doſi tuto dari poſſe.)

Käufer, in Journ. d. Erſind. etc. in d. Arzneik. St. VI. p. 129. (in mentis alienatione poſt epilepſiam pulveris herbae gr. x. ter in XXXVI horarum ſpatio multo cum fructu dediſſe.)

Münch (J. H.), (pater) Hannöv. Magazin, 1770. St. 14. (Syrupum e ſucco a ℈j — ℈ij.)

— — — Beobachtung. bei angewendet. Bellad. St. II. Stendal 1790. 8. p. 66 — 104. (Multos plenarie hujus remedii ope ſanaſſe contendit. Inſigne levamen fere omnes inde experti ſunt tam in morbo ipſo, ita ut paroxyſmi decreverint et in tremorem aut ſpaſmos particulares tranſierint, quam in mentis alienatione hoc morbo juncta. Pulveris foliorum gr. ß — j ß. cum ſaccharo tritum vel Extractum cum pulvere in unam maſſam redactum ad gr. iij — iv. pro doſi.)

Münch (J. H.), (filius) Obſervat. pract. circa uſum belladonnae in melancholia et epilepſia. Gotting. 1783.

Richter (A. G.), v. Feurſtein Diſſ. cit. p. 78. (rheo jungere jubet.)

Stoll (Max.) Rat. medend. Vol. III. p. 406. (Extractum ad ℈j. usque per nychthemer. dedit. Pulverem extracto praefert.)

Aurum. (Intrat ♂ epil. de Gutteta, holſaticum, nigrum marchionis, Viennenſ. pannonicum rubr. etc.

Aurum mercuriale.

Hellwig (Chr.) philoſ. Briefe. Leipzig 1712. 8. p. 73. (praeparandi formula et laus contra epilepſiam.)

Aurum potabile.

Angel. Sala Oper. med. chym. Francof. 1647. 4. p. 263.

Medicina experim. Dygbaean. T. II. p. 427. (doſ. gtt. viij.)

Sorbait (P. de) univerſ. medicina. Norimberg. 1672. fol. v. Haller. Bibl. pr. T. III. p. 306.

Magi-

Magiſterium Auri. (Gmelin. App. I. p. 446.)

Angel. Sala l. c. p. 263. (a gr. iij — viij.)

Tinctura Auri.

Schroeder Pharmac. univerſ. p. 733. (gtt. vij — viij. in St. appropriato.)

B.

Bachiene (Theologi cujusdam Vltrajectenſis). Arcanum antepilepticum.

Genees- Heel- Arzney- en Vroedkondige Magazin, uitgegeven door Martinus Pruys en Lambert Noeſt. te Rotterdam. Deel. II. 1784. p. 106. v. Samml. auserl. Abh. für pract. Aerzte. Th. X. p. 15.

(*Formula:* ℞. Succ. Semperviv. tector. recent. expreſſ.
St. Frument. āā ℥ij.
M. D. veſpere pro doſi.

laudatur a Cornelio Pereboom, qui quinquies inſultus epilepticos aliis remediis minime cedentes eo ſanavit.)

Balnea frigida. Eorum laudes habent:

Beunie (Joh. B. de), in Verhandelingen te Vliſſingen, Tom. VI. p. 587. v. Samml. f. pract. Aerzte, B. VIII. p. 577.

Cael. Aurelian. tardar. paſſion. Lib. I. cap. 4.

Celſus Lib. III. cap. 5.

Floyer Pſychroluſia, aus d. Engl. v. J. C. Sommer. Breslau und Leipzig 1749. 8. p. 160.

Rhaſes Contin. Lib. ult. cap. 70.

Tiſſot l. c. p. 235. 371.

Exaſperati a balneo frigido paroxyſmi exempla habent:

Tode medic. chirurg. Bibl. B. I. p. 117.

Weikard (M. A.) Obſervat. medic. Francof. 1775.

Balnea tepida. Laudantur a

Lieutaud Precis de la Medecine pratique. p. 231.

Marcard (H. M.) über die Natur u. den Gebrauch der Bäder. Hannover 1793. p. 410.

Marteau über die Bäder; überſ. v. Dr. C. E. Held. Leipz. 1778. 8. pag. 127.

Mayerne praxis. p. 48.

Tiſſot l. c. p. 377.

Balſamum epilepticum Fr. Hofmanni, v. *Hofmann*.

— — — *Jüngkenii*, v. *Jüngken*.

Balſamum polychreſtum Mynſichti, v. *Mynſicht*.

Bartholini Pulvis antepilepticus.

Kovacs Tatai l. c. p. 132. (laudans ſequentem formulam tradit:

℞. Cranii human. combuſt.
Oſſium human. combuſt. āā ℥ ß.
♁ off. Lacertar. magn. virid. ʒij.
Viſc. quern.
Paeoniae maris, rad. et ſem. decort. luna decreſcente collect. āā ʒj.
Mercur. ppt.
Ungul. Alces āā ʒ ß.
Sacch. albiſſ. ℥ iv.

Pulverizanda pulveriſ. ſubtiliſſime et fiat Pulvis. Doſ. ʒj. c. ▽ deſtill. e C. C. recenti cum primo naſcitur, et mixta c. ▽ fl. Tiliae et Lilior. convall. dupla quantitate. Bibatur c. ▽ picarum vel hirundinum.)

Spina (D. de) l. c. p. 759.

Baſilii Spiritus antepilepticus.

Spina l. c. p. 894.

(*Formula:* ℞. Virid. aeris qu. v. ſuperfuſo aceto deſtillato calido extrahe et decanta, Liquorem per alembicum abſtrahe, reliquum in ▽ pluviali ſolve, filtra, coagula ad tertiae partis remanentiam: repone in loco frigido ad cryſtalliſandum; Cryſtallos toties collige, quoties ▽ ulterius coagulata ac repoſita illos dabit. Hos cryſtallos deſtilla ex retorta fortiter, et prodibit ▽ ſubviridis; quando incipit ſubnigra apparere, ceſſa, ▽ quamque illam ſubviridem dein per alembicum deſtilla et extillabit clariſſima.

Doſis ℈j in ▽ appropriata, e. g. Paeoniae etc.)

Batei Decoctum antepilept. vomitivum.

Schroederi Pharmacop. univerſal. p. 260.

Batei Electuarium antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 316.

(*Formula:* ℞. Stercor. albiſſ. Pavon. ſiccat.
Rad. Paeon. maris āā ℥ ij.
Valerianae ℥ j.
Sem. Paeon. excort. ʒ iij.
Carvi ℥ ß.
Pulveriſ. adde Mell. anthoſat. qu. ſ. ut ſiat Electuarium.)

Beccario Arcanum antepilepticum.

Salzburg. medicin. chirurg. Zeitung 1791. B. IV. p. 288. n. 94. (Pietro Beccario, Medicus Caſſalenſis in Ducatu Monteferratienſi, in diario quodam italico ſeſe inventorem remedii ſpecifici declaravit, quod epilepſiam plenarie tollit, haereditariam tamen mere imminuit.)

Bedagorae ſ. Badigorii Medicamenta contra epilepſiam.

Rhazes Contin. Lib. I.

Benzoes Flores, v. *Styrax Benzoin.*

Beuceri Pulvis antepilepticus.

Bierling (Caſp. Th.) Adverſar. curioſ. Jenae 1679. 4. app. p. 107.

Bezoardicum lunare, v. *Argentum.*

Boletus ſuaveolens.

Enslin (Jo. Chr.) D. de boleto ſuaveolente. Erlang. 1784. p. 77. (laudat eum Cl. Schmidt, in litteris ad Cl. Wendt. Exhibebatur electuarii ex pulvere ejus et melle cochl. j. parvum quater de die vel et pulveris ejus et ſacchari lactis āā ℈ j. aeque frequenter, continuatione per plures menſes facta.)

Borax Gemma nobilis Smaragdus. (intrat varias veterum compoſitiones antepilepticas.)

Boetii de Boodt Gemmar. et lapid. hiſtoria, L. II. cap. 53. (externe qua amuletum.)

Kovacs Tatai l. c. p. 115. (quo viridior eo efficacior.)

Peuceri (C.) Comm. de praecipuis divinationum generibus. Francoſurt. 1607. p. 637. (Sequenti modo de eo judicat: „Smaragdus

„ragdus epilepſiae tota natura contrarius eſt admotusque corpori „illae obnoxio aut vincit aut profligavit morbum retinetque vim „ſuam et nitorem: aut morbo ſuperatur moxque vim omnem „amittit et rumpitur.“)

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 654.

Zechii (Jo.) Conſultat. medicin. Francof. 1650. 8. conſult. 44.

Borax Gemma nobilis Topaſius.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 649. (Hieron. Cardanum ejus pulvere epilepſiam ſanaſſe.)

Bos Taurus.

Cornu raſpatum.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1697.

Fel ad extracti conſiſtentiam inſpiſſatum.

Cullen Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. p. 185. (nihil ex eo ſperat.)

Hoffberg (Carol.), in Kongl. Svensk. Vet. Acad. Handl. Stockholm 1765. p. 308. (ʒj. in ℥j. Vin. Gall. propinare jubet. Evacuationes exinde per alvum et ſalivam. In excrementis pueri cujusdam hoc remedio ſanati repertae ſunt membranae vacuae planae velut piſorum compreſſae, forte quia morbus a vermibus natus erat medicamenti vi conſumptis, in mucum reſolutis, membranis eorum poſt ejectis.)

Quarin (Joſ.) Animadverſ. in diverſ. morb. chron. Viennae 1786. p. 24. (per plures ſeptimanas continuatum nonnullos epilepticos habitus pallefcentis ac tumiduli penitus ſanavit.)

Oſſicula auditus vituli.

Feurſtein (J. H.) Diſſ. cit. p. 91. (eorum olim contra epilepſiam uſurpatorum mentionem facit.)

Stercus vaccae nigrae.

Hartmann (Jo.) prax. chymiatr. v. Ej. oper. omn. medico-chymica. Francof. 1684. fol. p. 19.

Macaſii (J. G.) Prompt. Mater. med. p. 23.

Urina vaccae.

Macaſii l. c.

Boyle

Boyle Tinctura viridis aeris.

Medicin. experim. Dygbaean. p. 147. (formula praeparandi. Doſ. pro adulto gtt. x — xx.)

Bryonia alba.

Arnold. de Villanova Breviar. pract. Lib. I. cap. 22. (epilepticum intra tres hebdomades ſola purgatione cum ſucco ſacchari edulcorato ſanavit.)

Reusner (Hieron.), in G. Welſchii curat. et obſervat. Cent. VI. obſ. 158. (aliquot pueros epilepticos, eadem ſimplici medicina bis quavis hebdomade purgatos, ſanavit.)

Bruzii Antepilepticum, v. *Anchuſa officinalis.*

Bubon Galbanum. (Gummi.)

Plinii Hiſtor. natur. Lib. XXIV. cap. 5. lin. 28. (galbani odorem epilepticis prodeſſe.)

Bugloſſi flores, v. *Anchuſa officinalis.*

Butyrum Antimonii, v. *Antimonium.*

Buxus Sempervirens. (Oleum.)

Fonſeca (Roder. a) Conſult. med. Venet. 1628. fol. conſ. 15.
Heredia (Petr. Mich. de) Oper. med. Antwerp. 1690. fol. obſ. 14.
Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1159.
Vogel (R. A.) Vorleſung. über die Kenntn. u. Heilung etc. p. 482.

C.

Calculus Bezoar.

Kovacs Tatai l. c. p. 115.

Calculus Margarita intrat varias veterum compoſitiones contra epilepſiam uſitatas.

Calx Saturni, v. *Plumbum.*

Calx Zinci, v. *Zincum.*

Camelus.

Cerebrum.

Plinii Hiſtor. natur. L. XXVIII. cap. 8. (ex aceto potum.)

Stercoris cinis.

Ibid. l. c.

Cam-

Camphora, v. *Laurus Camphora.*

Cancer Aſtacus. (Chelae.)

Kaempf Enchirid. medic. p. 290. (chelarum margo externus cum pulvere cochlearum mixtus.)

Canis Familiaris.

Axungia.

Plinii Hiſtor. natur. l. c.

Unzeri ἱερονοσολογία. p. 49.

Canis adhucdum ſugens.

Plinius l. c. (e vino et myrrha propinandus.)

Crines.

Plinius l. c.

Fel.

Bartholin Acta Havnienſ. Vol. III. obſ. 20.

Camerar. Sylloge memorab. Cent. XVI. partic. 40. (canis nigri.)

Hannemann D. de uſu et abuſu inebriantium. Norimb. 1679. p. 44.

Kovacs Tatai l. c. p. 119. („Singulare remedium refertur fel catelli nigri lactantis (pro foemella epileptica ſubſtitue catellam) „ſtrangulati cum liquore conveniente exhibitum; nempe totus „ſuccus cyſti fellea exſumptus patienti cum pauxillo aquae flo„rum Tiliae propinatur. Hujus beneficio Ducis Buckinghami „filius eſt ſanatus. Porro ſolent empirici pueris majoribus, poſt „fel epotum etiam catelli hepar aſſatum comedendum tradere. „In Anglia hoc eſt uſitatiſſimum teſtante D. Sklegio.")

Lentilii (Roſin.) Eteodrom. medic. pract. p. 960.

Martii (Galeotti) L. de promiſcua doctrina. obſ. 45.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1704.

Hepar.

Kovacs Tatai l. c. p. 119. (aſſatum. v. Fel.)

Canis Lupus.

Caro.

Act. Erud. Lipſ. Ann. 1727. September, p. 404. (in pulverem redacta.)

Riverii (Lazar.) Obſ. med. Cap. II. obſ. 31.

Cin-

Cingulum e corio lupino.

Craton. a Craftsheim Conſil. et epiſt. medicin. Francof. 1595. 8. obſ. 38.

Cor.

Macaſii Prompt. mater. med. p. 10.

Paullini (Chr. Fr.) Obſerv. med. phyſ. Lipſiae 1706. 8. Cent. II. obſ. 65.

Hepar.

Borell (Petr.) Obſervat. med. Cent. II. obſ. 95.

Fabri (Petr. Joann.) Panchymic. Lib. V. Sect. I. cap. 20. in Opp. omn. Vol. I. Francof. 1652. 4.

Tiſſot l. c. p. 351. (Cl. Sauvages ex ejus uſu noxium vidiſſe effectum.)

Sanguis.

Fabri (P. J.) Panchymic. l. c.

Cantharides, v. *Meloe Veſicatorius.*

Capra Hircus.

Fel Hirci.

Gazette de Santé. 1774. p. 134. (cum melle datum.)

Stercus caprarum.

Quercetan (Joſ.) Pharmacop. dogmaticorum reſtituta. Lipſ. 1603. 8. (helleboro paſtarum.)

Stercus Hirci.

Macaſii (J. G.) Prompt. mater. med. p. 35.

Carbo ſub radice Artemiſiae reperta, v. *Artemiſia vulgaris.*

Cardamine pratenſis. (Flores. Herba.)

Baker, in Medical Transact. T. I. p. 443. (in duobus vel tribus exemplis non ſuffecit ad tollendam epilepſiam.)

Berger D. de remed. ſpecif. in epilepſia uſitatis. Francof. ad Viadr. 1795. p. 11. (recentem epilepſiam ſubito absque manifeſta cauſa ortam infuſo herbae et florum ſaturato per aliquot ſeptimanas continuato ſublatam vidit. Sudores fere colliquativos maleque olentes movebat. In morbo paulo adultiori nil praeſtitit.)

Greding, in Ludwig. adverſar. med. pract. Vol. III. P. III. p. 564.

 (unico

(unico epilepſia laboranti levamen flores praeſtiterunt. In omnibus reliquis autem iisque numeroſis, etſi diu et large ſatis exhibiti, ſpem fefellerunt.)

Lyſons practical Eſſays. p. 173. (non ſuffecit ei hocce medicamen ad ſanandam epilepſiam. Sudorem quaelibet doſis movebat.)

Nagel (Leop. Ant.) D. ſiſt. Cardamine pratenſis characterem botanicum et uſum medicum. Francof. ad Viadr. 1793. 4. p. 13. (agit vi reſolvente, anthelmintico. Exhibetur in forma pulveris ad ʒj. per diem aut qua infuſum [℥ß. cum ▽ ℔j. paratum] quotidie datum.)

Caro Lupi, v. *Canis Lupus*.

Caro Viperae, v. *Vipera*.

Caroli V. Pulvis antepilepticus,

Spina (Dav. de) l. c. p. 760.

(*Formula*: ℞. Salviae ℥ij. Flor. Lavend. Hyſſop. Menth. āā ℥j. Caryoph. Nuc. moſch. Cinnam. Zingib. Gran. parad. Zedoar. Galang. āā ℥ß. Calam. aromat. ʒij. Gran. jun. ʒiij. Paeon. ℥j. M. f. P.

Caſtor Fiber. (Caſtoreum.)

E. N. C. Dec. II. Ann. II. obſ. 150.

Fothergill, in Medical Obſervat. and Inquiries. Vol. VI. London. 1784. p. 596. (Caſtorei ſimiliumque medicamentorum ſalutarem effectum ab aegrotorum appetitu iis imminuto derivat.)

Hofmann (Caſp.) de medicam. officin. Jenae 1686. 4. p. 283.

Junkeri Conſpect. Medic. theor. pract. Tab. XXXVII. caut. 35. Tab. LV. caut. 5. (ab ejus uſu abſtinendum eſſe. Ex eo nempe momentaneum modo levamen, dein deliria et pectoris oppreſſio.)

Loof (J. A.) Hiſtor. epilepſ. fol. Aurant. perſanat. Groningae 1771. (quotidie ad gr. xl. datum epilepticam ſanavit. Epileptico fruſtra ad ʒij. quotidie exhibitum.)

Moor (Barthol. de) pathol. Cerebri. Amſterd. 1704. 4. p. 211.

Paulli (Sim.) Quadripartit. botanic. de ſimplicium medicam. facultatibus. Argentor. 1674. 4. p. 107.

Petri Hiſpani Summa experimentorum ſ. theſaurus pauperum.

Ant.

Antwerp. 1497. (Epilepſiam medicamento ex caſtoreo, opopanace, antimonio et ſanguine draconis ſanatam eſſe.)

Plinii Hiſtor. natur. L. XXXII. Cap. III. lin. 14.

Riedlin lin. med. Ann. I. Mart. obſ. 7. p. 67.

Serapion, v. Cael. Aurelian. Chronic. L. I. c. 4. (jam caſtoreum contra epilepſiam aliis medicamentis mixtum propinavit.)

Thouvenel Mém. ſur les principes et les vertus des ſubſtances animales medicamenteuſes. à Bourdeaux 1779. 4. p. 357. (Juvenis quidam caſtorei uſu per XII dies a ʒ ß. — ℥ ß. continuato liberatus eſt ab epilepſia. In duobus aliis non aequalem oſtendit efficaciam, tamen mitigavit paroxyſmos. v. Samml. auserl. Abhandl. für practiſche Aerzte. B. X. p. 138. 352.)

Oleum Caſtorei.

Medicina experiment. Dygbaeana, p. 332.

Catharticum lunare, v. *Argentum.*

Cauſtica. (externe.)

Heers (Henr. ab) Obſervat. p. 210. obſ. 24.

Locher (Max.) Obſerv. pract. circa luem veneream etc. Vindobon. 1762. 8. p. 40.

Martius (Galeott.) de promiſc. doctrina. obſ. 71.

Quarin (Joſ.) animadverſ. p. 21. (ſaepius incaſſum tentata.)

Rochard, in Roux Journ. de Medecine. T. XXV. à Paris 1766. p. 46. (Puerum epilepticum ſimul ſcabioſum ope cauſticorum ad nucham et brachium applicatorum, conjuncto internorum apto uſu, ſanavit.)

Zacut. Luſitan. Prax. admir. Lib. I. obſ. 22. (epilepſiam a pollice orientem cauſtico pollici impoſito ſanavit.)

Cellarii Pulvis antepilepticus cum Caſtoreo.

Pharmacop. Wirtemberg. Stuttgard. 1741. fol. p. 260.

(*Formula:* ℞. Rad. Paeon. Sem. Paeon. āā ℥ ß.
Unicorn. marin. Margarit. āā ʒ ij.
Lapid. V. pretioſ. āā gr. XLV.
Caſtor. Viſc. quern. Ungul. Alc.
Corall. rubr. āā ʒ ij. Cran. hum. ppt. ʒ j ß.
Pulv. Viperar. ʒ j. M. f. ♁. — Doſ. ℈ ß. — ʒ ß.

Centaurea benedicta. (Herba.)

Scholz Conſil. et Epiſtol. L. IV. (decoctum.)

Spiritus e Herba deſtillatus.

Untzer ἱερονοσολογ. L. II. cap. 7.

Cerebrum Cameli, v. *Camelus.*

Cerebrum Cervi, v. *Corvus Corax.*

Cerebrum Coturnicis, v. *Tetrao Coturnix.*

Cerebrum humanum, v. *Homo.*

Cerebrum Leonis, v. *Felis Leo.*

Certhia. (*an familiaris L.?*)

Jahn (Fr.), in Balding. N. Mag. f. Aerzte. B. XII. p. 502. (Miraculoſam atque veterum ſuperſtitioſis opinionibus valde ſimilem hiſtoriam ſanationis ope ſanguinis et carnis ejus factae enarrat pater cujusdam filii epileptici in litteris ad Cl. Jahn datis.)

Ceruſſa Antimonii, v. *Antimonium.*

Cervus Alces.

Cornu. (⊖ volatile. Spiritus.)

Kovacs Tatai l. c. p. 117.

Ungula. (intrat plurima veterum compoſitiones antepilepticas.)

Crato a Craftsheim l. c. Epiſt. VI. p. 67. (inertem eſſe.)

Kovacs Tatai l. c. p. 116. (laudat.)

Lemnii (Levin.) de miraculis occultis naturae Lib. IV. Francofurt. 1590. 12. p. 149. (ab interno ejus uſu multa ſperat nec externe eam annuli inſtar geſtatam, aut mere manu comprehenſam ſpernit.)

Menabeni (Apollon.) Tr. de Alce. Colon. 1581. 8. cap. 8. 9.

Moor (Barthol. de) l. c. p. 211.

Schenk (Jo.) Obſervat. Lib. I. obſ. 229.

Scholz Epiſtolar. philoſoph. medic. Volumen. Francof. 1598. fol. Epiſt. 60. (parum virtutis tribuit.)

Cervus Elaphus. (Cornu, Sanguis.)

Graboe (Jo. Andr.) Elaphographia. Jenae 1667. Sect. III. c. 2.

Kovacs Tatai l. c. p. 118. (Cornu Cervi a d. 15. Auguſti, usque ad 8. Septemb. collectum omnibus fere remediis palmam praeri-

pere

pere ſive crudum ſive vaporatum, vel in forma St. ⊖lis volat. nec minores obtinere vires medicamina e ſanguine cervi parata.)

Eſſentia cornu Cervi.

Medicina experim. Dygbaean. Th. II. p. 127. (Doſ. ʒj.)

Chirurgia infuſoria.

Elsholz (J. Sigism.) Chymiatr. nova. Coloniae ad Spream. 1667. 8. (ab ea in epilepſia auxilium vidit.)

Hemmann (J. A.) med. chirurg. Auffätze. Berlin 1778. 8. p. 208. (epilepſiam cum ſuppreſſione menſium ſanavit liquoris moſcho impraegnati ℥j. infuſione in venam medianam, poſt ſanguinis ℥iv. detractionem. Moſchi ʒß. cum ▽ deſtillatae ℥vj. per VIII horas in mortario vitreo terebatur ac dein filtrabatur. Colatura per dies 11. loco quieto commorans iterum iterumque filtrabatur. Hic Liquor eſt immiſſus brevi ante novilunium, apparente ſolito tunc temporis paroxyſmo. Prorſus ceſſante paroxyſmo rite quoque fluebant catamenia.)

Purmann (Matth. Gothofr.) Chirurgia infuſoria. Francof. 1694. 4. (Feminae epilepticae ſpiritum paeoniae in venas injecit eamque ſanavit. Alterae aquam hirundinum cum ſale volatili ſuccini injecit.)

Schmidt (J.), in Philoſ. Transact. 1667. n. 30. 34. (tradit experimenta circa chirurg. infuſoriam facta, qua epilepſiam quoque ſuperavit.)

Cinchona Caribaea. (Cortex.)

Aufmkolk (Fr. Wilh.) D. de cortice caribaeo cortici peruviano ſubſtituendo. Gotting. 1793. 8. p. 33. (ejus uſum in epilepſia commendat.)

Cinchona officinalis. (Cortex.)

Bang (Fr. L.) Ausw. aus dem Tageb. d. Krankenh. zu Kopenhagen. Th. I. p. 129. (levamen ab ejus uſu vidit.)

Beaumes l. c. p. 204.

Buchhave (Rud.), in Act. Soc. med. Havn. T. I. p. 218. (in epilepſia a terrore cum fructu data.)

Comparetti (Andr.) occurſus medici de vaga aegritudine infirmitatis

tatis nervorum. Venetiis 1780. p. 305. (laudat in connubio Valerianae et foliorum Aurantiorum.)

Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. (e tonicis vegetabilibus ab ea plurimum et quidem in epilepſia periodica ſine orgaſmo et plethora ſperat. Brevi ante paroxyſmorum periodum in larga quantitate propinanda.)

Cullen (W.) Treatiſe of Mater. med. Vol. II. Edinburgh 1789. p. 111. (in epilepſia a mobilitate nervorum orta proficuam eſſe.)

Frank (Jo. Pet.), in Salzb. med. chirurg. Ztg. 1792. T. I. p. 427. (in periodica.)

Fulleri (Thom.) Pharmacop. extempor. pag. 89. (vid. Fuller. Electuar.)

Grainger (Jac.) Hiſtoria febris anomalae batavae. Edinburg. 1753. 8. p. 112. (in periodica epilepſia ab ea cum ferri limatura et mercurio dulci data vidit auxilium.)

Groſſin Duhaume Traité de la petite verole, augmentée d'un traité ſur les remedes domeſtiques. à Paris 1779. 8. p. 506. (laudat Electuarium e cortice peruviano paratum contra epilepſiam.)

Heiſter (Laur.) pract. mediz. Handbuch. Leipzig 1744. 8. (epilepſiam verminoſam ſanavit cortice chinae hydrargyro juncto.)

Hirſchel (L. E.) Gedanken d. Heilart der fallend. Sucht betreffend. §. 26.

Lettſom, in Memoirs of the Medical Society of London. Vol. III. London 1792. n. 18. (epilepſiam cortice peruv. ſanavit, adjuncto uſu vitrioli albi et limaturae martis.)

Mead (Rich.) Monit. et Praecept. p. 37. (magni fecit ſub connubio rad. Valerianae. v. Mead. Electuar.)

Medicin. Wochenblatt. 1781. n. 21.

Medicus Geſchichte period. Krankh. Carlsruhe 1754. (in periodica cum limatura martis et mercurio dulci.)

Neue Sammlung medicin. Wahrnehm. B. III. p. 217.

Ritter, in A. N. C. Vol. X. App. p. 153.

Ruer (Herz. Iſrael) D. de corticis peruviani vi antiſpasmodica. Argentorat. 1787.

Ruh-

Ruhland über Epilepſie; in Aeſculap, einer Medic. Zeitſchr. von Dr. Weber und Dr. Ruhland. B. I. Leipzig 1790.

Tiſſot l. c. p. 320. (egregium ab ea in periodica vidit fructum; etiam Tozzi Locherique laudes habet.)

Tode (J. Cl.) medic. chirurg. Bibl. B. II. St. I. p. 160. (cum ſale ammoniaco.)

Werlhof (P. G.) de Febribus. edit. Wichmann. Hannov. 1775. p. 64. not. (cuilibet ℥ ß. corticis peruv. addidit olei Cajeput gtt. j. Repudiat eum [l. c. p. 53.] in paroxyſmo, in remiſſione vel intermiſſione concedens.)

Cinis crinium e regione pubis, v. *Homo*.

Cinis vexilli militaris.

Abel (Henr. Caſp.) reformirter und ganz vollkommner Leibmedicus der Studenten. Leipzig 1720. 8. p. 375.

Cinnabaris. (intrat Pulverem antepilept. Moebii, Cratonis, Dolaei, Hartmanni, Mynſichti etc.)

Barbette (P.) Prax. medic. p. 8.

Craton. a Craftsheim Epiſtol. med. ep. VI. (epilepſiae magnetem appellat.)

E. N. C. Dec. I. Ann. IV. et V. obſ. 42.

— — — Ann. VI. obſ. 41. (nil prodeſſe.)

— — — Ann. VII. obſ. 78.

Hofmann (Fr.) Medic. ration. ſyſt. T. III.

Schulze (Godofr.) Scrutinium cinnabarinum. Halae 1680. 12. (Saepius in epilepſia incaſſum dediſſe.)

Waldſchmidt (Jo. Jer.) Prax. medic. ration. p. 310.

Citrus-Aurantiorum. (Folia.) Hocce a 37 circiter annis contra morbos convulſivos et ſpeciatim contra epilepſiam laudatum remedium arcani inſtar primum Hagae Comitum ab idiota quodam Chocolatae forma uſitatum celato nomine ab Cl. Weſterhoef (ejus urbis tunc temporis phyſico) ad Ill. de Haen mittebatur, ut ipſe experimenta ſubiret. Certiorem tum eum reddidit Cl. Wenzel (Ophthalmiater), Vindobonae tum verſatus, hocce arcanum nil niſi Aurantiorum folia eſſe. Prima in aegris experimenta inſtituta erant foliorum decocto,

vel

vel cum Vini rubri connubio vel et decocto per ſe dato. Optime propinatur in pulveris forma a ʒ ß. — ʒ j. bis, ter, quaterve in die, etſi aliis forma decocti (mpl. j. c. ▽ font. ℔ j. ad dimidiae conſumptionem coquendi et pro unico praebio ingerendi aut foliorum ℥ ß. c. ▽ font. ℥ xx. per horae quadrantem coquendae et ſpatio unius diei ſumendae) magis placeat.

Bonafos, in Rich. de Hauteſierk Recueil d'Obſervations de Medecine. T. II. à Paris 1772. p. 450. (inertia eſſe.)

Büchoz und Marquet neueſte Heilkunde; aus dem Franz. Nürnberg 1777. 8. n. 10.

Comparetti (Andr.) Occurſus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum. Venetiis 1780. 8. p. 304. (corticem Aurantiorum in morbis nervoſis iis prodeſſe, quibus fibrae ſunt craſſae et laxae.)

Cullen Anfangsgr. der Arzneiw. Th. III. p. 183. (ſolia amaritiei ope agere. Non ſemper fructum praebere.)

Gesner (J. A. P.) Schwäb. Samml. und Beob. B. I. p. 198. (epilepſia a terrore iis ſanata.)

Haen (Ant. de) Rat. medend. T. VI. p. 305. ſqu. (Cl. Weſterhoefii, Welſii, qui praecipue decoctum in connubio vini rubri propinavit, et Ill. Haenii propria de hocce remedio facta experimenta. Profuit iis in variis convulſionibus, nunquam autem in vera epilepſia.)

Hannes (C. R.) Epiſtol. ad Büchnerum de puero epileptico foliis aurantiorum recentibus ſervato. Veſaliae 1766. (Epilepſia a terrore iis ſanata.)

— — — in Nov. Act. Nat. Cur. T. V. p. 245. (alia haud felicis ſucceſſus experimenta.)

Home (Fr.) Clinical experiments. p. 211. (inertiam eorum teſtatur.)

Kaempf (Jo.), in Act. Societ. Scient. Haſſiac. T. I. Gieſſae 1771. p. 152. (felici cum ſucceſſu propinavit. Decoctum in machina papiniana praeparatum pulveri longe praefert.)

Locher (Max.) Obſervat. pract. p. 44. (felici eventu in ipſa epilepſia tentavit. Paroxyſmi eorum ex uſu vel mitiores vel rariores evadunt, vel plane dispulſi. Interdum quidem fruſtra adhibitum,

con-

conſtantiorem tamen reliquis omnibus praeſtitit effectum. Inter dicta felicis ſucceſſus exempla quaedam epilepſiae chronicae habitualis et varia ex terrore ortae.)

Loof (A. J.) D. ſiſt. hiſtoriam epilepſiae foliis aurantiorum ſanatae. Groningae 1771. (epilepſia a terrore.)

Marx (M. J.) Obſervat. quaed. medicae. Berolin. 1772. 8. p. 33.

— — — beſtätigte Kräfte der Eicheln. Hannov. 1781. p. 25. 29. (felici eventu in epilepſia a terrore data.)

Pfündel, in Hufeland Journ. d. pract. Arzn. B. II. St. 2. p. 256. (cum fructu dedit infuſum theiforme in connubio Valerianae et viſci querni.)

Pharmacop. Helvetica. Baſil. 1771. (ſaepius fuiſſe inefficacia.)

Quarin (Joſ.) animadv. pract. p. 23. (ſemel tantum ab iis felicem vidit effectum, ſaepius autem incaſſum propinavit.)

Strandberg, v. Roſenſtein in Halleri Epiſtol. Vol. V. p. 174. (efficaciam teſtatur.)

Thilenius mediz. chirurg. Bemerkungen. Frankf. am M. 1789. 8. p. 129. (Quibusdam proficua fuiſſe, quibus jam laudatiora medicamenta incaſſum data erant.)

Tiſſot l. c. p. 335. (longe inferiora radice Valerianae habet.)

Claretum epilepticum laxativum Mynſichti, v. *Mynſicht*.

Cloſſaei Pilulae antepilepticae.

Spina (D. de) l. c. p. 687.

(*Formula*: ℞. Praecipitati ſolaris, per ſe in matracio ▽ febrili continuò parati ʒj. ♁ n. mineral. ℈ iv. Ol. ♁ n. febrifugi gtt. xx. Extract. Caſtor. per ſpirit. Vin. evaporando facti, Succin. āā ℥j. de Paeon. mar. c. Spir. Vin. fact. Paeon. femin. Bryon. āā ʒ ij ß. Fol. Hellebor. nigr. ſubtiliſſ. triturat. ℈ ij. Fiat pulvis et c. ſucco Porri maſſa pilularum, cui admiſce Ol. Angelic. ſativ. Spirit. Vitriol. āā gtt. x. — Harum pilularum cape ante paroxyſmos aut poſt lunae quadram duas ℈j. ponderantes, ſumendo poſtea juſculum carnium acido vitrioli conditum.)

Clyſmata.

Düpan (J.), in Journ. de Medecine. Septbr. 1789. (Epilepſiam verminoſam clyſmate ex decocto herbae Nicotianae ſanavit.)

Hahnemann (J. L.), in E. N. C. D. H. Ann III. obſ. 51. (idem.)

Kaempf (J.) Abhandl. von einer neuen Methode die Krankh. des Unterleibs etc. p. 427. 445. (Epilepſiam ab infarct. bilioſ. pituit. feliciter clyſmatibus viſceralibus ſanavit.)

Kovacs Tatai l. c. p. 75. ſqu. (varias clyſmatum formulas huic morbo congruas tradit. Commendat nempe clyſmata e Decoct. Rad. Paeon. Viſci quern. ex oleo Rutae etc. Vitanda liquoris injiciendi nimia quantitas. Riverium et alios Chymicos clyſteribus infuſa ex croco metallorum aut vitro antimonii in epilepſia addidiſſe.)

Roſenſtein (Roſ. v.) Anweiſ. zur Kenntniſs u. Kur der Kinderkr. p. 61. (ad profligandum paroxyſmum in infantili aetate laudat.)

Tiſſot l. c. p. 275. (saepius applicanda.)

Tralles de uſu opii. P. III. Cap. I. p. 23. (commendat ea adjuncto methodo antiphlogiſtica.)

Verzaſcha L. de affect. thorac. fol. 260. (liquoris injiciendi haud magna ſit copia.)

Zacut. Luſitan. Prax. adm. Lib. I. obſ. 21. (clyſmatibus et venaeſectione epilepſiam ſanavit.)

Cochlearia officinalis. (Spiritus cochleariae.)

Dolaei (J.) encyclop. medic. p. 133.

Cochlearum Pulvis, v. *Helix Pomatia.*

Cocos Nucifera. (*Maldivica.*) (Belgic. *Zeekalappen.*)

Nuclei.

Thunberg (C. P.) Reiſe d. ein. Theil v. Europa, Aſia und Africa; aus d. Schwed. überſ. v. Chr. H. Groskurd. B. II. Th. I. Berlin 1794. p. 203. (nuclei pulveriſati a ℥ ſſ. — ℥ j. contra epilepſiam a Ceylonicis propinantur.)

Coffea arabica. (Semina uſtulata.)

Meza (Sal. Theoph.), in Collect. Societ. med. Havn. Vol. I. p. 154. (epilepſiae e ſaturatiſſimo decocto ſanatae exemplum.)

Coitus et Matrimonium.

Act. Erud. Lipſ. Ann. 1712. Auguſt. p. 346. (epilepſiae ejus ope ſanatae exemplum.)

Am-

Ammann (P.) Medicin. critic. Stad. 1677. 4. p. 539. (ventilatur quaeſtio: an epilepticis conducat?)

Aſclepiades, v. Cael. Aurelian. Chronic. Lib. I. cap. 4. p. 322. (commendat.)

Bierling (Caſp. Theod.) Medic. theor. pract. Jenae 1679. 4. p. 935.

Cumme (A. H.), in E. N. C. Dec. I. Ann. III. obſ. 86. (Sanatae epilepſiae exemplum.)

E. N. C. Cent. I. obſ. 23. p. 80. } (epilepſiae matrimonio ſanatae exempla.)
— — Dec. II. Ann. X. obſ. 127. }
— — Dec. III. Ann. II. obſ. 75. }

Krünitz (J. G.), de Matrimonio multorum morborum remedio. Francof. ad Viadr. 1749.

Plinii Hiſtor. natur. L. XXVIII. cap. 5. (multa morborum genera primo ſolvi coïtu, aut, niſi id contingat, longinqua fieri maximeque comitialem morbum.)

Pyl (J. Th.) Aufſätze u. Beobacht. a. d. gerichtl. Arzneiw. Samml. I. Berlin 1783. (concedi poſſe matrimonium, ſana parte conſentiente, raro tamen epil. ſanari matrimonio.)

Schurig (Mart.) Spermatolog. Francof. 1720. 4. p. 292.

Stahl (G. E.) D. de diſpoſit. haeredit. ad varios morbos. Halae 1706. p. 48. §. 76. (exemplum epil. haereditariae, omnia ejusdem familiae membra tempore pubertatis infeſtantis, matrimonio ſanatae.)

Sinibaldi Geneanthrop. Lib. IX. Tr. I. cap. 2. p. 716. (ventilatur quaeſtio: An epilepticis conducat?)

Stegmann (Ambroſ.), in E. N. C. Dec. III. Ann. V. VI. obſ. 12. (Venere largita epilepſia ſuppreſſa; redeuns cum ea negaretur.)

Tiſſot l. c. Th. II. Abſchn. 2. Th. V. p. 73. 206. (anceps remedium eſſe.)

Colocynthis, v. *Cucumis Colocynthis*.

Columba Turtur.

Sanguis.

Camerarii (J.) Syllog. memor. Cent. XVI. part. 35.

Sympathetica Applicatio.

* * *

Kovacs Tatai l. c. p. 74. (D. Brunner [Archiater Halenſis] turturem foemellam deplumatam epilepticae umbilico in paroxyſmo impoſuit atque feliciſſime paroxyſmum profligavit.)

Sennert Prax. Lib. I. P. II. cap. 31. p. 478. (hancce applicationem in foeminis, et ſi epilepſia ſit ex conſenſu uteri, putat conſentaneam.)

* * *

Gyſzer (Medicus Pforzheim.), in Reichsanzeiger, 1796. n. 54. p. 566. (Sequentis applicationis efficaciam e propria experientia teſtatur.)

Thueſſink von den Convulſ. der Kinder; in Muſeum d. Heilkunde. B. III. p. 140. (Columbam adhuc juniorem et ſanam viventemque epileptici orificio ani antea bene abluto tempore paroxyſmi ita imponas, ut orificium ani columbae accurate attingat aegri orificium ani. Hoc facto columba aut motu convulſivo infeſtatur aut ſaltem ad vehementem frequentemque cogitur reſpirationem et aeger mox liberatur paroxyſmo. Columba autem vel breve poſt temporis intervallum moritur vel paulatim tantum ab illo ſymptomate liberatur. Etſi hocce hactenus infallax remedium veram morbi cauſam minime tollat, id tamen ex eo obtinetur emolumenti, quod tamen paroxyſmi inde imminuantur et opprimantur ideoque congruorum remediorum applicationi et agendi facultati ſat ſatis temporis paretur.)

Conium maculatum. (*Herba. Extractum.*)

Stoerk (A.) Libell. quo continuantur experimenta etc. Vindobonae 1765. p. 91.

Percival (Thom.) Eſſays medical. London. 1767. p. 44.

Convallaria majalis.

Baccae.

Senkenberg D. de Lilii convallii ejusque inprimis baccae viribus. Gotting. 1737. p. 29. (laudatur in epilepſia idiopathica periodica et nonnunquam ad lunae phaſes recurrente baccarum pulvis a ℈j. — ʒj. cum aqua Lilior. convall. ſimplici aut vinoſa.)

Flo-

Flores. (☉ Decoctum. ▽.) (cfr. Fulleri Tinctura antepileptica.)
Kovacs Tatai l. c. p. 142. etc.
Senkenberg l. c. (▽.)
Waenerberg, in K. Svensk. Vet. Acad. Handl. f. År. 1765. p. 324. (in comitiis remedium antepilepticum obtulit e felle urſi et floribus Lilior. convall.)

Cor Ciconiae, v. *Ardea Ciconia.*
Cor Hirundinum, v. *Hirundo urbica.*
Cor Hominis, v. *Homo.*
Cor Leporis, v. *Lepus timidus.*
Cor Lupi, v. *Canis Lupus.*
Cor Ranarum, v. *Rana.*
Cor Talpae, v. *Talpa.*
Cor Vulturis, v. *Vultur.*
Corallia rubra, v. *Iſis nobilis.*
Coriandrum ſativum. (Semina.)

Cardani (Hier.) Contradic. medic. L. II. Marburg. 1607. 8. p. 168. (laudari ab Avicenna. A Cardano vituperantur.)

Cornu Alces, v. *Cervus Alces.*
Cornu Cervi, v. *Cervus Elaphus.*
Cornu Tauri, v. *Bos Taurus.*
Corvus Corax.

Cerebrum.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1780.

Combuſti Cinis.

Reusner (Hieron.) experim. et obſervat. Ulm. 1676. obſ. 13.
Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1780.

Ova.

Bartholom. Anglic. de proprietat. rerum. L. VII. cap. 9. (cum ſanguine humano.)
Platearii (Joann.) Practic. brev. Venet. 1497. (eodem modo.)

Sanguis.

Camerarii (Jo.) Syllog. memorab. Cent. XVI. partic. 37.

Cor-

Corvus Pica.

Aqua deſtillata.

Quercetan (Joſ.) de priſcorum philoſophorum verae medicinae praeparationis methodo. Genevae 1603. 8. p. 67.

Spina (D. de) l. c. p. 100. (formula.)

Tinctura.

Sylvatici (Bened.) Conſil. et reſponſ. med. Cent. IV. Patav. 1656. fol. p. 113.

Corylus Avellana. (Pollen.)

Cruſo (J.) Theſaur. medicam. euporiſt. London. 1701. 12. p. 45.

E. N. C. Dec. I. Ann. I. obſ. 97. (in epil. ab acido.)

Ettmüller (M.), reſp. G. Heintke, D. ſ. Valetudinarium infantile. Lipſiae 1675. 4. (egregium eſſe antepilepticum.)

Hünerwolf (J. A.), in E. N. C. Dec. III. Ann. I. obſ. 120.

Cranium humanum, v. *Homo.*

Cratonis Electuarium antepilepticum.

Craton a Craftsheim Conſil. et epiſtol. medic. L. VII. Francof. 1595. 8. conſ. 420.

(*Formula:* ℞. Succ. Millefol. Rutae. Meliſſae. Majoran. Hyſſop. ad ſpiſſitud. cum Saccharo cocti āā ℥ ß. C. C. ppt. ʒ v. Mithridat. ʒ j. Conſerv. flor. Roriſmar. ℥ j ß.
M. lent. igne. Doſ. mane ʒ j. et ante ſomnum poſt coenam moderatam ʒ ß.)

Cratonis Elixir antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 360.

(*Formula:* ℞. Ciner. cornic. ex nido extract. Turtur. Cranii human. calcin. āā ℥ ij. Gran. Tiliae autumno collect. ℥ ij. Stercor. Leon. ℥ ß. Affunde Spirit. Vin. ad eminent. digit. iij. extrahe ſ. a. ex faecib. calcinat. elixivia ſal addeque extractionibus: poſtea adde Vini Malvatici et Sacchar. cand. ℥ iv. Doſ. cochl. ß. ad j.)

Cratonis Emplaſtrum epilepticum.

Jüngkenii (J. H.) Lexic. chym. pharm. P. II. p. 179.

(*Formula:* ℞. Succin. alb. Thuris, Maſtych. āā ʒ j ß. Galban. Opopanac. āā ℈ j. Viſc. quercin. ʒ ij. Sem. Paeon. ʒ ß.

Lada-

Ladani ℨ ſ. Olei Nucis Moſchatae ℨ ſ. Ambrae gr. vj. Moſchi gr. iij. Ol. roſacei qu. ſ. ut fiat Exempl. cui in aluta extenſo aſpergatur pulvis Cubebarum et Suturae coronali applicetur.)

Cratonis Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 759.

(*Formula:* ℞. Cinnab. nativ. ℥ j. torrefiat leviter ſuper ignem in tabula, dein terat. in pulv. ſubtil. Margarit. ppt. Corall. rubr. ppt. āā ℨ j ſ. Cranii human. C. C. uſt. āā ℨ j. Croc. ℈ ij. Fol. Auri. n. xxv. M. f. ℥.)

Crocus Metallorum, v. *Antimonium.*

Crollii Elixir antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 360.

(*Formula:* ℞. Vitriol. ad flavedinem calcinatum imbibe Spirit. Vin. F. Maſſa. ℞. Hujus Maſſae ℔ j ſ. Raſurae Cran. human. Viſc. quern. Ungul. Alces. Granor. Paeon. āā ℥ j. Omnia ſcind. et contund. poſtea mixta deſtill. per retort. gradatim. Hujus egreſſi liquoris ℔ j. rectificetur in B. M. ſupra Caſtorei, Diamoſc. dulc. āā ℥ ſ. Anacardin. fruct. ℨ vij. Poſtea adde Spirit. Vin. ℔ iv. ⊖ paeon. ℨ j. Liquor. ſal. perlar. Sal. corall. āā ℨ j. Ol. Aniſ. Succin. āā ℈ ij. M. et diger. in M. B. per menſem. Doſ. cochlear ſ. — j. in ▽ paeon. et ſimili, continuando per dies IX.)

Cryſtalli praeparati, v. *Quarzum Cryſtallus.*

Cucumis Colocynthis. (Tinctura.)

Burſer. a Kanilfeld Inſtitution. medic. pract. Vol. III. Lipſ. 1787. p. 249. (Tincturam Colocynthidis intrare arcanum antepilepticum mulieris cujusdam Bononienſis putat.)

Cucurbitulae.

Ackermann annot. ad Tiſſot. l. c. p. 271. n. 55.

Celſus de medicina. L. III. c. 23.

Cuprum ammoniacum, v. *Vitriolum caeruleum.*

Cuprum

Cuprum nativum.

α) *Formae Cupri nativae.*

Lapis armenus.

Alexand. Trallian. Lib. I. cap. 15. 17.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 680.

Malachites.

Gmelin Apparat. Medicam. T. I. p. 342. (in cordis formam exſculptum et amuleti inſtar de collo ſuſpenſum contra epilepſiam infantum praeſertim ex terrore in uſu olim fuiſſe.)

β) *Formae factitiae.*

Aerugo.

Lieb, in Balding. N. Magaz. f. Aerzte. B. VII. p. 552.

Aes uſtum.

Aretaeus de acutor. curat. Lib. I. cap. 5.

Dioſcorides de Mater. medic. Lib. V. cap. 42. (cardamo junctum et cum mulſo propinandum epilepticis proficuum, qui inde aut vomunt aut laxantur.)

Sulphur cupri ſ. venereum.

Greding, in Adverſar. medic. pract. Vol. I. p. 530.

— — ſämmtl. Schrift. Th. I. p. 104. (in VII. epilepticis nullum ex eo vidit fructum. Exhibuit nempe illis gr. j. cum gumm. arab. et Syrup. Paeon. in forma pilularum.)

Pasquallati (J. B.) D. de epilepſia. Vindobon. 1766. append. (primus in epilepſia habituali a gr. j — ij. per diem datis adhibuit.)

Quarin (Joſ.) animadverſ. in diverſ. morb. chronic. p. 25. (incaſſum tentavit.)

Tinctura Cupri alcalina.

Gmelin Appar. Medicam. T. I. p. 349.

Lieb, in Balding. N. Magaz. f. Aerzte. B. VII. p. 552. (per longum temporis ſpatium a gtt. iv — xxiv. per diem cum mulſo alioque potu continuanda. In pertinaciſſima epilepſia fructum praeſtitit.)

Cynanchum Ipecacuanha. (Radix.)

Act. Erudit. Lipſienſ. Ann. 1717. Jul. p. 309. (efficaciae exemplum.)

E. N.

E. N. C. Cent. VI. obſ. 58. p. 315. (efficaciae exemplum.)

Plenk (J. J.) Beobacht. über die krampfſtill. Eigenſch. d. Ipec. bei Convulſ. der Schwang. u. Gebähr., in Abhandl. d. Chirurg. Acad. zu Wien. B. I. Wien 1787. 4.

Cyprinus Carpio. (oſſa ♁riſata.)

Baricelli a Santo Marco (Jul. Caeſ.) hortulus genialis. p. 312. (officulum e vertice.)

Finkii Medicin. dogmat. hermetica. p. 39.

Fränkiſch. Samml. Th. VII. Nürnberg 1765. p. 90. (pulvis oſſis ſemilunaris carpionis remedium ſpecificum contra epilepſiam infantum pulmento infantum admiſcendum.)

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1794.

D.

Dactyli Fructus, v. *Phoenix dactylifera.*

Daniae Reginae Aqua antepileptica.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 138.

Daniae Regis Aqua antepileptica.

Schroeder l. et p. c.

Daniae Regis Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) adverſar. curioſ. app. p. 107.

Daphne Gnidium, } v. *Exutorium.*
Daphne Mezereum, }

Datura Stramonium. (Extractum.)

Arnemann (Juſt.) pract. Arzneimittellehre. Th. I. p. 279. (optime Camphora et extractis amaris jungi, ita ut pilularum formam accipiat.)

Dürande, in Gardane Gazette de Santé. 1773 et 1774. p. 143. (Satisfecit ejus voto in curanda epilepſia: ter quoque tamen fefellit.)

Greding, in Ludwig. Adverſar. med. pract. Vol. I. p. 259. 345.

— — ſämmtl. Schrift. Th. I. p. 102. (Ex XXVIII. epilepticis duos plane ſanaſſe; IV. conſtans levamen; XI. temporarium modo

dediſſe: in reliquis fruſtra adhibitum eſſe. In parva repetitaque doſi ſalutarem interdum praebere effectum. Non ſemper autem absque aliorum indicatorum remediorum, e. g. lenientium, roborantium aut antiſpaſticorum, connubio et ope tuto dari poſſe, ſed interdum ſub levaminis ſpecie noxam inferre. Initium fecit gr. j. doſin ſenſim augendo ad ℨ ß. usque per nychthemerum.)

Ohdelius, in Svensk. Vetensk. Acad. Handl. 1766. p. 277. (In noſocomio Holmienſi e XIV. aegris, epilepſia et convulſionibus detentis, VIII. ejus ope ſanati, V. levamen perceperunt; unus nihil inde auxilii expertus.)

Razoux Diſſ. epiſtol. de Cicuta, Stramonio etc. Nemauſi 1780. 8. (laudat gr. ß. ter in die.)

Schlereth Diſpenſat. Fuldenſe. p. 24. (contrarii effectus obſervata.)

Sidrén (Jon.), reſp. A. F. Wedenberg, D. de uſu Stramonii in convulſionibus. Upſaliae 1772. (laudat.)

Spalowsky (Joach.) D. de Cicuta, Flammula Jovis, Stramonio etc. p. 30. (laudat.)

Stoerk (A.) Libellus, quo demonſtratur: Stramonium etc. Vindobonae 1762. (Primus tentavit in duobus epilepticis, quibus fuit auxilio. Propinavit iis gr. ß. — j. et quidem bis, ter, imo ſexies de die, continuato per plures ſeptimanas, imo menſes, pro re nata uſu.)

Wåhlin, in Svenks. Vet. Acad. Handl. 1771. Vol. XXXII. (paululum profuiſſe.)

Decoctum Antepilepticum Batei, v. *Bate.*

— — — — *Michaelis*, v. *Michael.*

— — — — *Preſſavini*, v. *Preſſavin.*

— — — — *de Spina*, v. *Spina.*

Dentariae Radix, v. *Plumbago europaea.*

Dictamnus albus. Radix. (♁. Eſſentia.)

Feurſtein (J. H.) D. de epilepſia. p. 76. (nullum e hujus remedii uſu obſervavit effectum.)

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1253. (pulveris laudes.)

Stoerk Abhandl. vom Nutzen des Brennkrauts und des weiſsen Diptams. Frankfurt und Leipzig 1769. 8. (non plane inefficax fuit con-

contra epilepſiam radix in pulverem redacta. Doſ. gr. iij — xx. augendo ſenſim numero. Uſus vero per VI. hebdomades continuari debet. Profuit et Eſſentia [v. Pharmac. Edinb. edit. nov. p. 75.] e radicis recentis et conciſae ℥ij. et Spir. Vin. ℥xiv. digeſtione bene ſaturata, binis epilepticis a gtt. xx — L. ter de die, etſi in uno non ſufficeret redeunti malo.)

Digitalis purpurea. (Herba.)

Currie (W.), in Mem. of the medic. Societ. of London. for 1773. Vol. IV. London. 1795. n. II. (tribus epilepticis fruſtra data.)

Parkinſon Theater of Plants. p. 654. (Epilepſiae, per XXVI. annos quolibet menſe duobus vel tribus paroxyſmis redeuntis, foliorum Digit. purp. manipulis ij. et Polypodii ℥iv. cum cereviſia decoctis, ſanatae exemplum.)

Withering (W.) vom rothen Fingerhut; a. d. Engl. Leipz. 1786. p. 58. (laudat.)

Dippelii Oleum animale.

Ackermann, in annot. ad Tiſſot. l. c. p. 74. (haud exiguam ei tribuit efficaciam praeſertim in epilepſia ab atonia, ſyſtematis nervorum languore ac labe, debilitate et anaemia orta aut concomitata. Nocere autem irritabilibus et plethoricis.)

Bang (Fr.), in Act. Societ. med. Havn. Vol. I. p. 500. (laudat.)

Beaumes von d. Convulſ. der Kinder. p. 204. (Krammeri aliorumque laudes habet.)

Borrich. (Ol.) Hermetis, Aegyptiorum et Chemicorum ſapientia a H. Conringio vindicata. Havniae 1674. (jam contendit, olea ex animalibus parata penetrabiliora eſſe et epilepſiae melius reſiſtere.)

Boſch (v. den) Hiſtor. conſtitut. verminoſ. Lugd. Batav. 1769. 8. (laudat.)

Bresl. Samml. Verſ. XVI. p. 166. (laudat.)

Cullen (W.) Anfangsgr. der Arzneiw. Th. III. p. 188. (ſaepius utile eſſe.)

Dippel Diſquiſ. de vitae animal. morbo et medicina. p. 89.

Feurſtein (J. H.) Diſſ. cit. p. 76. (Eventum diſcrepantem experimentorum, circa hocce remedium in epilepſia inſtitutorum, aut

 hujus

hujus medicaminis juſtae puritati aut ejus ex aeris aggreſſu corruptioni forſan eſſe tribuendum.)

Hartmann (P. J.) D. ſiſt. quaeſtiones medicas ſuper Zinci florum uſu interno. Francof. ad Viadr. 1778. (Catalepſis poſt florum Zinci uſum in epilepſiam tranſiens Olei anim. Dipp. gtt. x. ter de die datis ſanata.)

Hirſchel (L. E.) l. c. p. 35. (non multum auxilii ex ejus uſu ſperat.)

Hofmann (Fr.) Obſervation. phyſico-chemicae ſelectae. Lib. I. obſ. 14. p. 53. 54. (laudat.)

Juch, reſp. Hannimann, D. ſiſt. facillimam ac certiſſimam methodum epilepſ. curandi. Erford. 1741. (laudat.)

Korthum D. de epilepſia. Duisburg. 1766. (laudat.)

Ludolf, reſp. Treſſelt, D. de olei animalis praeparatione et modo agendi. Erford. 1748.

Mauchart (B. D.), reſp. Reinhardt, D. de oleo animale Dippel. Tubing. 1745.

Model Recreations phyſiques, oeconomiques et chymiques; avec des obſervations et des additions par Mſr. Parmentier. à Paris 1774. (Parmentier ex ejus uſu optimum hinc inde vidit effectum; interdum tamen quoque nullum.)

Quarin (Joſ.) Animadv. ad diverſ. morb. chron. p. 25. (profuit ei interdum in epilepſia a menſtruis retentis aut ſuppreſſis.)

Thouvenel Mémoires ſur les principes et les vertus des ſubſtances animales medicamenteuſes. à Bourdeaux 1779. (quotidie ad ℨ ij. ſumtum liberavit juvenem ab epilepſia, absque manifeſta cauſa orta et per X. annos jam durante. Interdum paroxyſmos mitigavit. Saepius nullum praebuit effectum. v. Samml. für pract. Aerzte. Th. X. p. 138.)

Tiſſot l. c. p. 341. (non magnum ex eo ſperat fructum.)

Vater (A.) de ſpecificorum antepilepticorum, ſigillatim olei animalis virtutibus hujusque virtute et efficacia in curanda epilepſia rationibus et experimentis confirmata. Viteberg. 1725.

Doereri Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) Adverſar. curioſ. Jenae 1679. 4. app. p. 121.

De-

Dolaei Draco fixans.

Dolaei (J.) Encyclop. medic. p. 156. (vaga compoſitio e ♂. nuc. moſch. Herb. Cardoben. Viſc. quern. Sem. Paeon. Ciner. Talp. Ungul. Alcis. etc. Doſ. ℨß. — ℈iv. Rariſſime eum fefelliſſe contendit.)

Dolaei Pulvis antepilepticus.

Dolaei (J.) Encyclop. medic. p. 139. (ejus laudes.)

Paullini (C. F.) de Talpa. Francof. et Lipſ. 1689. 12. p. 178. ſqu. (laudat.)

Spina (D. de) l. c. p. 761.

(*Formula:* ℞. Cinnab. nativ. Mercur. dulc. āā ℨij. Margarit. Corall. ppt. āā ℨj. Croc. Orient. gr. v. M. f. Pulv. cujus doſ. gr. x — xv.)

Dolaei Spiritus antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 874.

(*Formula:* ℞. Rad. Paeon. ℥j. Granor. Paeoniae Flor. Lil. conv. Tiliae āā ℥ß. Viſc. quern. Corylini āā ℨvj. Raſur. Cran. human. Corn. Alcis āā ℥j. Affunde Spir. flor. Tiliae ad ſupereminentiam digitor. iv. Deſtill. ad reman. ℔ j ß.)

Dolaei Tinctura antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 974.

(*Formula:* ℞. Sal. volat. Succin. Cranii human. āā ℈j. Caſtor. ℨij. Infund. in Spir. Vin. qu. ſ. Digere et fiat Tinctura. Doſ. gtt. xx.)

Dorncrellii Aqua antepileptica.

Schroeder Pharmac. univerſ. p. 140. (formulam tradit.)

Dorncrellii Pulvis antepilepticus.

Paullini (C. F.) Lagographia. p. 351.

Doronicum Pardalianches. (Radix.)

Alſton Mater. medic. p. 437. (Albinum pro potu conſueto per aliquot menſes virgini epilepticae decoctum radicis hujus dediſſe.)

Gesner (Conr.) Epiſtol. medicin. L. III. edid. Caſp. Wolf. Tiguri 1577. p. 18. 66. 74. (vel per ſe vel gentiana et aſtrantia mixtum ſaepius auxilio fuiſſe in epilepſia.)

Dresdenſis Pulvis niger.

Schreger (B. N.) Kritiſch. Diſpenſ. d. ſpecif. Mittel. p. 103.

Dre-

Dreſſeus Spiritus antepilepticus, v. *Felis Leo*.

Droſera rotundifera. (Herba.)

Kovacs Tatai l. c. p. 124. (annumerat ſpecificis antepilepticis.)

Dulcamarae Stipites, v. *Solanum Dulcamara*.

Durieti Elixir uterinum.

Beaumes l. c. p. 205. (in hyſterica laudat.)

Meyer D. ſiſt. cautelas in paroxyſm. verminoſis etc. Gotting. 1783. pag. 8.

Schreger (B. G. N.) kritiſch. Diſpenſat. p. 251.

(*Formula:* ℞. Aſae foetid. ℨij. Opii ℨß. Sal. volat. Succin. ℨß. Eſſent. Caſtor. ℨiij. M. digere. Cola. Doſ. gtt. xxx—xl. pro adulto.)

E.

Egſii Pulvis antepilepticus.

Jüngken (Jo. Helfr.) Chymia experimental. curioſa. Francof. 1681. 8. p. 498.

Eiſenmengeri Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 759.

(*Formula*: ℞. Ungul. Alc. Corn. Cerv. ppt. Margarit. ppt. Viſc. quern. Rad. Paeon. Sem. Cydon. ex cort. āā ℨj ß. Tabell. epil. Lang. ℥ß. Fol. Aur. no. vj. F. Pulv.)

Electricitas.

Albanus et Boeſe, in Material. für Electriker. Liefer. II. Halle 1790. p. 174. (effectus ſalutaris exempla.)

Barneveld (W. von) mediz. Electricit. a. d. Holl. Leipzig 1787. 8. p. 156. (Epilepſia aut a plethora aut vermibus orta ejus ope ſanata.)

Beaumes l. c. p. 41. (efficacem ſaepius eſſe.)

Bertholon de St. Lazare Anwendung u. Würkſamkeit der Electricität zu Erhalt. u. Wiederherſtell. der Geſundheit; überſ. und mit neuen Erfahr. bereich. v. K. G. Kühn. Weiſsenfels u. Leipzig 1789. B. II. 8. p. 307. (Ab initio paroxyſmi ex ejus uſu vehemen-

hementiores evadere ſolent. Tamen quiete nec non absque metu continuanda eſt electricitatis applicatio, deinde mox evaneſcentibus paroxyſmis.)

Camoy, in Nouveaux Mémoires de l'Academ. de Dijon. Premier Semeſtre 1784. à Dijon 1784. p. 70. (cum levamine aegrorum tentata.)

Deimann (J. R.) von den guten Würkungen der Electricit. in verſchied. Krankh. Mit Anmerk. und Zuſätz. von K. G. Kühn. Kopenhag. 1793. Th. I. p. 187—193.

— — Th. II. (Kühnii additamenta continens.) p. 160-168. (Collectio experimentorum circa electricitatis vim in epilepſia inſtitutorum.)

Deshais D. de hemiplegia per electricitatem curata. Monspeliae 1749. recuſ. in Halleri Collect. Diſſert. pract. T. I. p. 19. ſqu. (Duorum epilepticorum ſimul hemiplegia laborantium paroxyſmi electricitate mitigati et imminuti.)

Feller (C. G.) D. de therapia per electrum. Lipſiae 1785. p. 23. (in epilepſia a menſibus retentis nullum vidit fructum ab electrica concuſſione. Paroxyſmi e contrario exinde vehementiores.)

Feurſtein Diſſ. cit. p. 81. (inter paroxyſmos in auxilium eſſe vocandam et ita adhibitae ſaluberrimos bina vice vidit effectus. Nonnumquam epilepſiam excitaſſe. Utile eſſe plerumque, quando debilitas et lentor adſunt, cauſave morbi in obſtructis aut ſuppreſſis excretionibus latere videtur. In ſpasmis a nimia irritabilitate ortis negativam eſſe adhibendam.)

Franklin, in London Magazine. May, 1757. p. 211. (Virgo, a refrigeratione menſtruationis tempore epileptica, ſuccuſſionibus electricis ſanata. Primo paroxyſmi vehementiores.)

Kitz (F. C.) D. ſiſt. Electricitatis in medicina uſum et abuſum. Gotting. 1787. 8. (paſſim.)

Kühn (K. G.) Geſchichte der mediz. und phyſical. Electric. Th. II. Leipzig 1785. 8. p. 239. 311. (experimentorum circa electricitatem in epilepticis inſtitutorum collectio.)

(p. 318. Ex LXXXIX. Epilepticis XLII. Pariſiis a patre et filio Comus per Electricitatem eſſe ſanatos.)

Kühn Additament. ad Deimann. l. c. Th. II. p. 161. (Indicata eſt Electricitas in epilepſia a haemorrhagiarum exanthematumque ſuppreſſione et retentione, in epilepſia ab anaemia et ſyſtematis nervorum praeternaturali diſpoſitione orta. Forſan et in epilepſia a vermibus. Fruſtra adhibetur in E. a venenis, bile acri, primarum viarum impuritatibus, plethora, irritamento peculiari nervo cuidam inhaerente et in haereditaria.)

(p. 165. Tria ſalutaris effectus exempla.)

Lindhuld, in Abhandl. der Schwed. Acad. d. Wiſſ. B. XV. p. 152.

Linnée (C. a), reſp. Petr. Zetzel, Conſectaria electrico-medica. Upſaliae 1754. (Ep. a terrore et haereditaria per electricitatem nec ſanata nec aucta.)

Lovet electricity rendered uſeful in medical intentions. Lond. 1760. (paſſim laudat.)

Mangin Hiſtoire de l'electricité. P. III. à Paris 1752. p. 85. 87. (laudat.)

Mauduyt, in Mémoires de la Societ. Roy. de Medecine à Paris. Ann. 1777. 1778. (rejicit ejus uſum in epilepſia.)

Morris (W.), in Gentlemans Magaz. for the Year 1753. Auguſt. London. p. 379. (Ep. per ſuccuſſiones electricas ſanata.)

Poma et Arnaud, in Journal de Medecine. Vol. LXXII. 1787. p. 214. (non absque fructu adhibita.)

Quarin (Joſ.) Animadverſion. p. 30. (in noſocomio Vindobonenſ. epilepticis non profuiſſe.)

Rapport de M. M. Cosnier, Maloet, Darcet, Philipp, le Preux, Deſeſſarz, et Paulet ſur les avantages reconnus de la nouvelle methode d'adminiſtrer l'electricité dans les maladies nerveuſes, particulierement dans l'epilepſie et catalepſie pr. Mſr. le Dru, connu ſur le nom Comus. à Paris 1783. 8.

Extract. huj. libr. v. in Lichtenberg Magazin für d. Neueſte aus d. Phyſik u. Naturgeſch. B. II. St. II. p. 155. ſqu.

(Ex hisce experimentis redundat:

1) Paroxyſmi primo frequentiores mox rariores evadunt, usque dum plane effugiant.

2) Ele-

2) Electricitas, durante paroxyſmo adhibita, paroxyſmos ratione temporis et vehementiae mitigat.
3) Omnes ſecretiones et excretiones (praeſertim menſtrua) auget.
4) Motum muſcularem excitat et roborat.
5) Nunquam ſecundum Cl. Comus methodum (ſcintillas educendo et balneum electricum adhibendo) nocet, ſed aegroti vires inprimis digeſtionis roborat.)

Recueil ſur l'electricité medicale. ſec. Edit. T. II. à Paris 1763. 12. p. 389. 393. ſqu. (laudat.)

Sauvages Suite des experiences. p. 139. 142. (Duobus epilepticis ſimul hemiplegia laborantibus profuiſſe.)

Spengler (Lor.) Briefe und Erfahrungen über die Würkungen der Electric. in Krankheiten. B. IV. Kopenhag. 1754. p. 39. (efficax in epilepſia a menſium ſuppreſſione.)

Stoll (Max.) Rat. medend. P. III. p. 410. (epil. inveterata, extracti Belladonnae uſu mitigata, per electricitatem plane ſanata.)

Symes eſſay on Electricity. p. 79—81. (epilepſiae per electricitatem aut ſanatae aut mitigatae obſervationes.)

The deſcription and uſe of Nairne's patent electrical machine, whith the addition of ſome philoſophical experiments and medical obſervations. London 1787. 8. p. 80. (in ipſo paroxyſmo adhibita mitigat quoad vim et tempus. Brevi ante paroxyſmum adhibita, unica concuſſio praecludere poteſt paroxyſmo aggreſſum.)

Wilhelm (H. M.) Obſervat. electr. med. Wirceburg. 1774. p. 148. (in epil. a terrore cum fructu adhibuit electricitatem.)

Electuarium anacardinum Zwölferi, v. *Zwölfer.*

Electuarium antepilepticum Anonymi cujusdam.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 303. (formula.)

Electuar. antepilept. Batei, v. *Bate.*

— — — *Cratonis*, v. *Crato.*

— — — *Fulleri*, v. *Fuller.*

— — — *M. D. Hetrur.*

Schroeder l. c. p. 303. (formula.)

Electuar. antepilept. Meadii, v. *Mead.*

Electuar. antepilept. Nicolai Florentini, v. *Nicol.*
— — — *Regii*, v. *Reg.*
— — — *de Spina*, v. *Spina.*
— — — *Terentii*, v. *Terent.*
— — — *Timaei*, v. *Tim.*
Electuar. ſennatum Renodaei, v. *Renod.*
Elephas maximus. (Hepar.)
Plinii Hiſtor. natur. L. XXVIII. cap. 8.
Elixir acidum Halleri, v. *Haller.*
Elixir antepilepticum Cratonis, v. *Crato.*
— — — *Crollii*, v. *Croll.*
— — — *et hyſtericum.*
Schroeder l. c. p. 357. (formula.)
— — — *Freyeni*, v. *Freyen.*
— — — *Timaei*, v. *Tim.*
Elixir uterinum Durieti, v. *Duriet.*
Elixir vitae majus Quercetani, v. *Quercetan.*
Embrocha calida.
Kovacs Tatai l. c. p. 103.
Nardii (Joh.) Noctium genialium Ann. I. Bonon. 1656. 4. (epilepticos in regione Senenſi iis levatos eſſe.)
Embrocha frigida.
Celſus de Medicina L. VIII. edit. Almelov. p. 172.
Marteau Abhandl. von den Bädern. p. 299.
Emeticum.
Brieu, in Journal de Medecine. T. XVI. à Paris 1762. p. 512. (exemplum eo ſanatae epilepſiae.)
Chalmers (Lion.) Account of the Weather and Diſeaſes of South-carolina. London 1776. (tempore paroxyſmi datum proficuum.)
Diocles Caryſtius, v. Cael. Aurel. tardar. paſſion. L. II. c. 4. (jam emeſin commendat in epilepſia.)
E. N. C. Cent. VI. obſ. 58.
Ettmüller (M.), rſp. Weinlich, D. de epilepſia. Lipſiae 1676. (laudat.)
Fáſch (J.), rſp. Fuhrmann, D. de epilepſia. Jenae 1679. (laudat.)

Haen

Haen (Ant. de) Rat. med. P. V. edit. altera. Vienn. 1763. p. 117. (in gravida epileptica cum fructu adhibitum.)

Marryat (Thom.) Handbuch d. pract. Arzneiw. f. denkende Aerzte; a. d. Engl. Leipzig 1793. 8. p. 110. (commendat quoque in epilepſia vomitorium ſiccum ab eo laudatum e vitriol. caerul. et Tartar. emet. āā gr. ij ſ. conſtans. Sumitur e dimidio aquae cochleari mane jejuno ſtomacho nec aliquid ſuperbibitur, donec materia flava vel viridis evomatur. Tunc demum concedit ſpiritum vini ad nauſeam ſedandam.)

Maurer (F. Gu.) Comm. de medicam. antepil. Marburg. 1792. 8. pag. 33.

Meibom (B.), reſp. S. Bucholz, D. de epilepſia ſtomachica. Helmſtad. 1740.

Müller, in Frankf. mediz. Wochenbl. Jahrg. I. Quartal 4. (laudat.)

Praxagoras, v. Cael. Aurel. tard. paſſ. L. II. cap. 4. (jam emeſin commendat in epilepſia.)

Richter chirurg. mediz. Bemerk. B. I. Götting. 1793. p. 142. (in epilepſia habituali ultra materiam aut cauſam primam perdurante nil melius vomitorio horae ſpatio ante paroxyſmum dato ad avertendum aut refringendum paroxyſmum.)

Satler (D. G.) D. de epilepſia. Traject. ad Rhen. 1697.

Swieten (G. v.) Comment. in Boerh. aphor. T. III. p. 439.

Tiſſot l. c. p. 219. ſqu. p. 223.

Unzer der Arzt. B. V. VI. (paſſim.)

Wedel (G. W.), reſp. J. Roeſer, D. de epilepſia. Jenae 1673.

Werlhof oper. omn. Vol. III. p. 726.

Willis (Th.) pathol. cerebr. Oxoniae 1667. 4. (paſſim.) (vomitum antimonialibus in epil. movere ſuadet.)

Woodward (J.) Select Caſes and obſervations in Phyſik. ed. P. Templemann. London 1737. 8. (vomitum ſaepius avertere epilepſiam.)

Wucherer, reſp. Welſch, D. de epilepſia. Jenae 1719.

Zacut. Luſitan. Prax. admir. Lib. I. obſ. 24. 31. (Sanationis vomitorio peractae exempla.)

Emplaſtrum Antepilepticum Cratonis, v. *Crato.*
— — — — *Michaelis*, v. *Michael.*
— — — — *Mynſichti*, v. *Mynſicht.*
— — *Aromaticum ad caput.*

Panaroli (Dominic.) Jatrologiſm. pentecoſt. V. Romae 165[illegible]. 4. obſ. 35.

Emulſio antepileptica Michaelis, v. *Michael.*
Enema antepilepticum Michaelis, v. *Michael.*
— — — *Mynſichti*, v. *Mynſicht.*
Engelhardi Pulvis antepilepticus.

Jüngken (J. H.) Lexic. chym. pharmac. p. 310.
(*Formula:* ℞. Rad. Paeon. legitimo tempore effoſſae ℥ij ß. Valerian. ℥ ß. Viſc. coryl. ℥j. Specif. cephal. ℥iij. Pulv. Marchion. ℥j. Cinnab. nativ. praepar. ℈ij. Chryſolit. alcoholiſ. ℥ ß. Magiſt. Smaragd. ℈j. Corn. Rhinocerot. ℥j. Lapid. ſpecul. praepar. ℥ ß. Succin. alb. praep. ℈ ß.
M. F. P. Doſ. ℈ ß. — ℥ ß.

Eas Veneris, v. *Cuprum.*
Equus Aſinus.

Lac.

Burſerii a Canilfeld Inſtitut. medic. pract. Vol. III. Lipſiae 1787. p. 258. (cum ſapone mixtum, diutius et largiore doſi propinatum laudari a Beccario, Profeſſore olim Bononienſi.)

Tiſſot l. c. p. 370. (valde laudat. Non tamen propinandum, digeſtione vitiata, abdomine obſtructo, alvo ſtipata aut menſibus ſuppreſſis.)

Sanguis (gravidae).

Formey (Ludw.) Verſuch einer medic. Topographie von Berlin. Berlin 1796. p. 193. ſqu. (hujus remedii empirici, a nonnullis medicis Berolinenſibus, nec non ab ipſo auctore in epilepſia et convulſionibus non absque fructu tentati, mentionem faciens hisce verbis tradit adhibendi modum: „Es wird Leinwand mit dem „Blute einer trächtigen friſch geſchlachteten Eſelin durch und „durch getränkt und nachher getrocknet. Einige Stücke dieſer „Leinwand werden nachher zerſchnitten und mit weiſsem Franz-

„wein

„wein infundirt, und von dieſem Weine bekommen die Kranken
„täglich ein Spitzglas voll.")

Stercus.

Macaſii (Jo.) Prompt. Mater. med. p. 37.

Teſtes.

Gesner (Conr.) Hiſtor. animal. T. I. Tiguri 1551. fol. p. 9.
Paullin (Chr. Fr.) Onographia ſ. de aſino. Francof. ad Moen. 1695. 8. p. 222.

Equus Caballus.

Impetigines.

Diocles Caryſtius, v. Cael. Aurel. tard. paſſ. L. II. cap. 4.

Mammae.

Macaſii l. c. p. 17.

Materia a pullo equino neonato per vomitum ejecta, ſiccata, pulveriſata.

Camerarii (Jo.) Memorab. Syllog. Cent. VIII. partic. 61.
Donzelius (Hieron.), in Conſil. ad Scholz. Lib. XV. conſ. 1. et 8.
Macaſii l. c. p. 17.

Erneſti Principis Antepilepticum.

Heers (Henr. ab) Obſervat. medicin. Lugd. Bat. 1685. 12. p. 176. (forſan ex oleo heraclino conſtare.)

Eſox Lucius.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1799. (os cruciforme in capite ejus.)

Eſſentia Cervi, v. *Cervus Elaphus.*

Eſſentia Dictamni albi, v. *Dictamnus albus.*

Eſſentia dulcis.

Kleinfeld Tractat von d. Eſſent. dulc. in Balding. N. Mag. f. A. B. II. St. 5.
Schreger (N. B. G.) kritiſch. Diſpenſat. p. 234. ſqu.
Woellner (Petr. Mich.) D. de epilepſia ejusque curatione medicamento ſpecifico eſſentia dulcis nominato. Leidae 1706. 4.

Eſſentia Hirundinum, v. *Hirundo urbica.*

Eſſentia Vitae Kieſowii, v. *Kieſow.*

Ett-

Ettmülleri Aqua antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 58.

(*Formula:* ℞. Fol. et Flor. Salviae ℥vj. Flor. Lil. convall. ℥iij. Lavend. ℥ij. Rad. Paeon. ℥iij. Fol. et Flor. Majoran. ℥j. Cinnam. ʒvj. Caryoph. ʒiij. Macis. ʒij. Infund. Vin. Rhen. ℔ xiv. Macer. p. XIV. dies et deſtill. F. Aqua.)

Ettmülleri Pulvis antepilepticus.

Spina l. c. p. 758.

(*Formula:* ℞. Pulv. Secundin. rite praep. ℥j. Raſur. cranii human. ʒvj. Caſtor. ʒj. Sal. Succin. ʒij. Corn. Cerv. ʒj. Elaeoſacch. Macis. qu. ſ. F. Pulv.)

Evacuantia. cfr. *Emetica, Purgantia* etc.

Aetius Tetrab. III. Sect. I. cap. 18. (jam evacuantia in epilepſia a ſordibus ſuadet.)

Unzer der Arzt. B. V. VI. (paſſim.)

Extractum epilepticum Diſpenſ. Brandenburg.

Diſpenſator. Brandenburg. edit. ab Erneſt. Fagino. Erford. 1734. fol. p. 102.

(*Formula:* ℞. Rad. Angelic. Paeon. Pyrethr. āā ℥j. Fol. Majoran. cum ſummit. mpl. j. Fol. Rutae. Scord. āā mpl. ß. Flor. Lavendul. Lilior. convall. Paeon. Rorismar. Stoech. arab. Lign. Sanct. Viſc. Corylin. Tiliacei aut Quern. Raſur. C. Alcis. Cervi. Cranii human. non humat. Specier. diamoſch. dulc. āā ℥jß. Caſtor. recent. ʒjß. Conc. Cont. affunde Spiritus Vini Rhenani aut ſaltem Gallici ad eminentiam digitorum jv. digere vaſe probe obturato et munito, loco calido. Tinctum ſpiritum effunde, reſiduum exprime, per emporeticum filtra et in balneo, juncturis exacte clauſis, ſpiritum evoca, [qui epileptici vices ſubire aptus, ſeorſim ſervetur] reſiduum a Spiritu, ad mellis ſpiſſiorem conſiſtentiam, revocatum pro extracto epileptico ſerva.)

Extractum epilepticum Junkeri, v. *Junker.*

— — — *Oſſium*, v. *Oſſa.*

— — — *Zwölferi*, v. *Zwölfer.*

Exul-

Exulcerantia. cfr. Cauteria. Exutoria. Fonticul. Mox. Setacea. Veſicator. Uſt. Ulcer. arte fact.)

Alexand. Trallian. Lib. I. cap. 15. (jam in Ep. pediſymptomat. exulcerantium ad partem affectam applicationem commendat.)

Exutoria. (e cort. Daphn. Gnid. et Mezer. deſumpta)

Roy (le) Verſuch üb. d Gebrauch u. die Würk. der Seidelbaſtrinde; überſ. von Junker. Strasburg 1773. (paſſim.)

Rumpel, in Act. Moguntin. ad Ann. 1778 et 1779. p. 10.

F.

Fauſti Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 759.

(*Formula:* ℞. Pulv. Marchion. epilept. Angel. Sal. Magiſt. perlar. orient. Corall. rubr. praep. āā gr. xv. Sal. Paeon. Cran. human. āā gr. vj. Hyper. gr. iv. M. F. P.)

Fel caninum, v. *Canis familiaris.*

Fel Haedi, v. *Capra Hircus.*

Fel Leonis, v. *Felis Leo.*

Fel Tauri inſpiſſatum, v. *Bos Taurus.*

Fel Teſtudinis, v. *Teſtudo.*

Fel Urſi, v. *Urſus Arctos.*

Felis Catus. (Sanguis.)

Granander, in Weckoſkrift for Läkaren och Naturforskaren. B. X. Stockholm 1791. (Sanguinem ex aure felis deſumptum eſſe domeſticam medicinam contra epilepſiam in Bothnia auſtrali.)

Macaſii (J. G.) l. c. p. 31. (Sanguis felis nigrae laudatur.)

Felis Leo.

Cerebrum (♎ et ♉).

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1745.

Fel.

Plin. Hiſtor. natur. L. XXVIII. c. 8.

Sanguis.

Schroeder l. c.

Wir-

Wirdig (Sebaſt.) Nova medicina ſpirituum curioſa. Hamburg. 1688. 12. p. 151. (Leonem eſſe generoſum, ejusque ſanguini et ſpiritubus impreſſam eſſe generoſitatem; hinc epilepſiae mederi.)

Stercus.

Kovacs Tatai l. c. p. 120. (Siccatum et pulveriſatum laudat. Adhuc praeſtantiorem eſſe ſpiritum ex eo deſtillatum, ex quo conficitur ſpiritus antepil. Dreſteus.)

Macaſii (J. G.) l. c. p. 31.

Schroeder l. c. p. 1745.

Ferdinandi I. Imperatoris Antepilepticum.

Camerar. (Jo.) Syllog. Memor. Cent. VIII. part. 62. (conſtare e Cryſtall. praep. Corall. rubr. praep. Margarit. orient. et Smaragd. orient.)

Ferrum.

Limatura Martis.

Cullen Anfangsgr. der pract. Arzneiw. Th. III. p. 185. (nil ex ejus uſu ſperat.)

Haller (Alb. ab) Oper. anatom. minor. argum. T. III. Lauſann. 1768. 4. p. 378. (epilepſiae per eam, cum extract. Valerian. et cort. peruv. propinatam, ſanatae exemplum.)

Lettſom, in Memoirs of the medic. Societ. of London. Vol. III. 1792. 8. n. 18. (Valerianae addita ejus efficaciam auget.)

Weikard (M. A.) Obſervat. medic. Francof. 1775. (ejus ope in connubio vitriol. alb. et cort. peruv. ſanavit epilepſiam.)

Tinctura Martis belleborata.

Quarin (Joſ.) Animadverſ. p. 26. (gtt. xx — L. de die egregium in epilepſia praeſtare effectum, ubi corpus gelatinoſis humoribus abundat.)

Ferula Aſa foetida. (Gummi.) (cfr. Durieti Elixir uterin. et Langii Tinctura antepil.)

Beaumes l. c. p. 205. (Muſgravii et Wanterſii laudes habet.)

Berger. (Fr.) D. de remediis ſpecificis in Epil. uſitatis. Francof. ad Viadr. 1795. p. 13. (Hyſterico-epilepticis optimo cum fructu cum Valeriana dari.)

Gent-

Gentlemans Magazine, v. Comment. Lipſienſ. T. IV. p. 72.

Kaempf (Jo.) Enchirid. medic. p. 30. (laudat pilulas e Mercurio gummoſo Plenkii, extracto Valerianae ſpirituoſo, Aſa foetida et Camphora, quarum uſu plures epileptici a malo quoque inveterato liberati ſunt.)

Tiſſot l. c. p. 326. (efficacem eſſe in Epilepſia a pituita et vermibus.)

Ficus Carica. (Fructus.)

Plinii Hiſtor. natural. L. XXIII. cap. 7.

Fioravanti Arcana antepileptica.

Fioravanti (Leonard.) Teſoro della vita umana. Venezia 1570. 8. Lib. II.

Fiſcheri Tinctura antepileptica Vitrioli.

Spina (D. de) l. c. p. 992.

(*Formula:* ℞. Camphor. Spodii. Raſur. Cran. hum. Unicorn. vel C. C. Sant. omn. āā ℥ij. Corall. Viſc. quern. Gran. Paeon. Rad. Paeon. āā ℥j. Pulv. et M. Ind. vitro ſtrict. orific. ſuperfund. Spirit. Vitriol. rectif. Stet in digeſt. calid. p. ſeptim. iij — iv. Dein Spirit. tinctus a pulvere effundatur in aliud vitrum et bene claudatur.)

Flores Benzoes, v. *Styrax Benzoin.*

Flores Sulphuris, v. *Sulphur.*

Flores Zinci, v. *Zincum.*

Fonticuli.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. obſ. 13. (Epil. in manu exordiens, fonticulo ibi applicato ſanata.)

Anecdotes de Medecine. p. 124. (felicis effectus obſervationum biga.)

Jacquinelle, in Journ. de Medecine. T. LXXIV. (Epil. poſt nimis cito occluſum vulnus per amputationem factum, fonticulo ad brachium poſito, ſanata.)

Journal de Medecine. T. XXV. p. 47. (efficaciae exemplum.)

Malvicini (Jul.) utiles collectiones medico-phyſicae. Venetiis 1682. 4. (epil. fonticulo in ſutura coronali ſublata.)

Mercati (Lud.) Conſultat. medic. Conſ. III.

Piſonis (Carol.) obſervat. med. pract. de morb. e colluvie ſeroſa. obſ. 31. p. 173. (epil. fonticulo in ſutura coronali ſanata.)

Pujati Decas obſervat. medic. p. 95. (efficaciae exemplum.)

Saillant, in Mémoires de l'Acad. roy. des Scienc. à Paris. T. III. (epilepſ. ab abundantia humorum fonticulo ad brachium poſito ſanata.)

Tiſſot l. c. p. 244. (epil. pediſymptomatica fonticulo ad locum primarie affectum et Valerianae uſu interno profligata.)

— — — p. 379. ſqu. (ulterius de fonticulorum in epil. uſu agit. Suadet eorum applicationem:

1) in humorum praeſertim depravatorum abundantia.

2) Acrimonia quadam in corpore circumvagante, hinc illinc parti cuidam obſidente, a qua metaſtaſes metuendae ſunt periculoſae.)

3) Humoribus acribus pertinacem jam ad hanc illamve partem exferentibus affluxum.)

(Cratonis Montanique quoque laudes fonticulorum habet.)

Willis (Thom.) Pathol. Cerebri. p. 27. (fluente epilepſia ſiluit, rediens occluſo.)

Zacut. Luſitani Prax. admir. Lib. I. obſ. 32. (Epil. ab occluſo vulnere in lepore naſi per fonticulum ad tibiam ſanata.)

Forlaſſii Medicamentum contra Epilepſiam.

Des Dr. J. F. Forlaſſe unſchäzbare Arznei wider die Epilepſie, von 31 Perſonen bewährt gefunden; von D. L. L. B. 1711.

Formicarum thus.

Reusneri Obſervat. et experimenta. Ulm. 1676. 4. obſ. 95.

Fowleri Solutio mineralis ſ. Liquor arſenicalis, v. *Arſenicum.*

Freyenii Elixir antepilepticum.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 341.

Spina (D. de) l. c. p. 361.

(*Formula:* ℞. Spirit. Corall. Tartar. āā ℥j ſſ. ʒij. Sal. Cran. human. vol. Sanguin. hum. vol. Succin. vol. āā ℈j. M. ft. in digeſt. p. dies XIV. F. Elixir.)

Frictio.

E. N. C. Cent. I. obſ. 85.

Oſian-

Oſiander (F. B.) Lehrbuch d. Hebammenk. Götting. 1796. p. 630. (frictio in cordis ſcrobiculo et regione epigaſtrica inſtituta celerem ei ſaeplus praebuit fructum.)

Fulleri Electuarium antepilepticum.

Fuller (Thom.) Pharmacop. extemporan. Edit. VII. Amſtelodam. 1717. 8.

(*Formula:* ℞. Pulv. Cort. peruv. ʒ vj.
Rad. Serpent. Virgin. ʒ ij.
M. f. c. Syrup. Paeoniae qu. ſ. Electuarium molle.
Si poſt debitas evacuationes adultis electuarii ʒ j. aliis minor doſis mane et veſpere per tres vel quatuor menſes exhibeatur et poſtea per triduum vel quatriduum ante novilunium repetatur, eradicare penitus morbos epilepticos et hyſtericos.)

Fulleri Tinctura antepileptica.

Fuller (Thom.) l. c.

(*Formula:* ℞. Caſtor. opt. ℥ ß. Succin. flav. pulveriſ. Croc. angl. ãã ʒ ij. Flor. Lilior. convall. ℥ j. His affunde Spirit. Vin. camphor. Lavendul. compoſ. Sal. ammon. ãã ℥ iv. Digere absque calore p. dies VI. in vitro probe clauſo; poſtea filtret. F. Tinctura. Doſ. ℈ j — ʒ j.)

Fumigatio.

Baldinger N. Mag. f. Aerzte. B. XII. p. 481. (Joann. Hornſchuh, pſeudomedicum prope Iſenacum habitantem, amuletorum et fumigationum ope epilepticorum ſanationem tentare.)

Bierling (C. Th.) Adverſar. curioſ. Jenae 1679. 4. (Epil. ſulphuris ſuffitu ſanata, ſaltem mitigata.)

Kovacs Tatai l. c. p. 104. (formulam tradit.)

G.

Galega officinalis. (Herba.)

Cruſo (J.) Theſaur. medicamentor. euporiſt. London. 1701. 12.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1251. (Succi Cochl. j.)

Galium Mollugo. (Flores c. Herba.)

Anonymus quidam, in Gardane Gazette, 1773 et 1774. p. 223. (queritur de inconſtantia hujus remedii in epilepſia.)

Chomel Uſuelles. T. II. p. 25. (laudat.)

Jourdain, in Gardane Gazette, 1773 et 1774. p. 19. (Succum expreſſum ab ℥ iv. ad v. mane jejuno ſtomacho hauſtum laudat.)

Galium verum. (Flores. Summitates.)

Bonafos (pater et filii), in Richard de Hautefierk Recueil d'obſervat. en Medecine. T. II. à Paris 1772. p. 499. (laudant ſuccum expreſſum ad ℥ iv. mane ingerendum, qui ſudorem plerumque movet, in lecto probe procurandum. Confert et infuſum ſaturatum. Proficuum erat nominatim in puella novenni per biennium epilepſia correpta et folia aurantiorum perperam experta.)

Chomel Uſuelles. T. II. p. 24. (In Catalonia vulgarem eſſe medicinam. In epilepſia infantum florum ſuccum expreſſum ad cochleare j. datum exoptatam praeſtitiſſe efficaciam, praeſertim ſi alvus ſimul laxetur.)

Gardane Gazette de Santé. 1776. p. 73. (Sudorem vehementer movere.)

Lieutaud Synopſ. prax. med. p. 768. (flores laudat vel in ſubſtantia a gr. iv — viij. vel ſuccum expreſſum ab ℥ ß — ℥ j.)

Müller D. de clematide vitalba. Erlang. 1786. (laudat flores.)

Taury, v. Murray Appar. Medicam. T. I. p. 371. (uſum eſſe vel ore ad ʒ j. usque vel decocto ex mpl. j. pro aquae pinta.)

Garidelli Opiatum antepilepticum.

Bouteille, in Journ. de Medecine. 1777. Fevrier. v. Samml. auserleſ. Abhandl. f. pr. Aerzte. T. IV. p. 313.

Garidel Hiſtoire des Plantes de Provence. p. 350.

Schreger kritiſch. Diſpenſator. p. 81. (conſtare e Sem. Cumini roman. Flor. et Fol. Menth. Succ. Chelidon. et Melle.)

Gelatina Cornu Cervi antepileptica de Spina.

Spina (D. de) l. c. p. 533.

(*Formula:* ℞. Raſur. Cran. hum. Corn. Cerv. āā ℥ vj. Ungul. Alc. Ebor. āā ℥ ij. Flor. Paeon. Tiliae. Lil. conv. Anthor. āā ℥ j. Succ. Citr. ℥ viij. Acet. Vin. ℥ x. Coqu. et Cola. F. Gelatina.)

Genipi

Genipi veri Herba, v. *Achillaea.*

Gentiana Centaureum. (Herba.)

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1175. (Camerarium laudaſſe.)

Glecoma Hederacea. (Herba.)

Aqua deſtillata.

In Pomerania, vicinisque regionibus infantibus epilepticis qua remedium domeſticum porrigitur.

Oleum deſtillatum.

Medicina experimental. Dygbaean. Francof. 1687. 8. Th. II. p. 320. (laudatur contra epilepſiam.)

Gloſſopetra Melitenſia.

Kovacs Tatai l. c. p. 115. (a Th. Bartholino et Hoſmanno eſſe uſitata in epilepſia a ℈ ß — ℈ j.)

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 624. (externe et interne.)

Gmelini (J. C.) Pilulae antepilepticae.

Comm. litter. Noric. Norimb. 1733. p. 195.

(*Formula:* ℞. Sanguin. pullul. hirundin. vivent. ad extract. conſiſtent. inſpiſſ. Oliban. āā. Forment. leg. art. pil. Doſ. omni triduo ℈ j — ʒ ß. appropinquante paroxyſmorum periodo.)

Gratiola officinalis. (Herba. Extractum.)

Sommer (C. B.) de virtute et vi medica Gratiolae officin. in curandis morbis tam internis quam externis. Rigae 1796. 4. (Sequentes pilulas in Epil. ei efficaces ſeſe praebuiſſe:

℞. Extr. Gratiol. ʒ ij. Cort. Aurant. ℥ ß. M. f. c. pulv. rhei qu. ſ. pilul. p. gr. ij. Conſp. ♁. ſem. Lycop. Quater in die n. ij.)

Guajacum officinale. (Lignum. Decoctum.)

Craton. a Craftsheim Conſil. et epiſtol. p. 262. (ejus vires in epil. negat.)

Fallop. de morb. gallic. cap. 48. (laudat.)

Foreſt. Obſerv. med. Lib. X. obſ. 58. 63. (laudat.)

Gaſſer (Achill.) Obſerv. med. obſ. 5. (laudat.)

Guargant (Horat.) Reſponſ. varia. fol. 125. (laudat.)

Hofmann (Fr.) Medic. rat. ſyſt. T. IV. P. III. C. I. p. 21. (Alphonſ. Ferreum et Leonard. Jachinum citat, qui decocti uſum bis de die ab ℥ vj — ℥ viij. ſat ſatis in epil. efficacem comprobarunt.)

Hor-

Horſtii (Greg.) Oper. omn. T. III. Norimb. 1660. fol. p. 32. (ventilatur quaeſtio: An ſit proficuum epilepticis ligni Guajaci decoctum?)

Mercurialis (Hieron.) Reſponſ. et Conſult. L. II. c. 3. (laudat.)

Sennert (Dan.) Prax. medic. Lib. I. cap. 31. (laudat.)

Veſalius (Andr.) de uſu lign. Guajaci in epilepſia, in Laur. Scholzii Conſil. et epiſtol. Francof. 1598. fol. (laudat.)

Willis (Thom.) de morb. convulſiv. p. 460.

Zacut. Luſitan. Princ. hiſtor. Lib. I. cap. 6. et L. II. cap. 1.

Gutteta (Pulvis de).

Pharmacop. Pariſienſ. 1732. p. 61.
(Sequentem exhibet formulam:
℞. Rad. Paeon. mar. Sem. Paeon. Diptamn. alb. Viſc. quern. āā ℥ß. Semin. Atriplic. ʒij. Cran. human. ʒiij. Corall. rubr. ppt. Hyacinth. ppt. āā ʒj. Ungul. Alc. ppt. ℥ß. Foliol. Auri ʒj. M. f. p.) (Recentiora diſpenſatoria formulam variarunt.)

Tiſſot l. c. p. 339. (ſuperfluis annumerat.)

H.

Halenſis Pulvis niger.

Kleinfelds Tractat, in Balding. N. Magaz. f. A. B. II. St. 5.

Schreger (B. N. G.) kritiſch. Diſpenſat. p. 237. (conſtat e reſidui nigr. ſacchar. gr. LXV. Vitriol. mart. gr. x. Cinnabar. gr. ij. Doſ. gr. ß — j. ter in die in eclampſia infantum.)

Halleri Elixir acidum.

Hirſchel l. c. p. 35. ſqu.

Weikard (M. A.) Obſervat. medic. Francof. 1775. 8. (efficaciam ejus in epil. pertinaci expertus eſt.)

Zimmermann, v. Feuerſtein l. c. p. 80. (multo cum fructu in epil. propinaſſe.)

Hartmanni Aqua antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 58.

(For-

(*Formula*: ℞. Flor. Lil. conv. mpl. ij. Vin. gener. qu. ſ. Diger. p. dies X. dein adde flor. Tiliae ℔ ß. Paeon. ℥iv. deſtill. in M. B. ad ſiccit. Rad. Paeon. ℥j. Dictamn. alb. Viſc. quern. Cran. hum. ppt. āā ℥ ß. Rad. Pyrethr. ℥ ß. Caſtor. ℈ij. Fol. Rut. mpl. j. Fl. Stoechad. arab. Lavend. āā P. iv. Cubeb. Mac. āā ʒij. Cinnam. ʒj. Scill. ppt. ʒiij. Diger. p. dies XV. Hinc deſt. p. Alemb. in M. B. Doſ. ℥ ß — j.)

Hartmanni Pulvis antepilepticus.

Majerne Prax. medic. p. 23.

Spina (D. de) l. c. p. 758.

(*Formula*: ℞. Cinnab. nat. ʒ ß. Magiſt. corall. perlar. āā ℈ij. Croc. ℈j. Fol. Auri. n. x. M. F. P.)

Hartmanni Rotulae antepilepticae.

Spina (D. de) l. c. p. 822.

(*Formula*: ℞. Rad. Paeon. ʒj. Magiſt. Perl. Corall. āā ʒj ß. Cran. human. ʒ ß. Sacch. in aqu. flor. Til. ſol. F. R.)

Hartmanni Spiritus Vitrioli antepilepticus puerorum.

Kovacs Tatai l. c. p. 116. (laudat.)

Spina l. c. p. 893.

(*Formula*: ℞. Vitriol. Ungar. depur. ℔iv. Urin. pueror. ſanor. recent. coll. ℔iv. Digere vaſe clauſo aliquamdiu in M. B. poſtea ex eodem vaſe deſtill. ad ſiccit. duplex phlegma, quorum primum inſigne eſt paregoricorum ad dolores podagricos aliosque ſuaviter demulcendos, alterum eſt inſigne ophthalmicum ad quaevis oculorum vitia utiliſſimum. Caput mort. pulveriſ. ex retorta valida terrea △e nudo, ſed tamen ab initio valde lente in excipulum capax urge, prodeuntibus confeſtim ſpiritubus liquor promanat pretioſiſſimus ♁rei odoris et auſteriuſculi ſaporis, qui per retortam ſemel atque iterum rectificatus et reſervatus omnem puerorum epilepſiam radicitus tollit.)

Heidleri Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) Adverſ. med. pract. p. 114.

Helix Pomatia. (Cochleae.)

Kaempf (Jo.) Abhandl. von einer neuen Methode, die Krankh. des Unter-

Unterleibs zu heilen. p. 290. (familia quaedam pulverem e gyris cochlearum et margine chelarum cancrorum praeparatum felici cum ſucceſſu contra epilepſiam propinavit.)

Kaempf (Jo.) Enchiridion medicum. Francofurt. et Lipſiae 1778. 8. p. 28. (Permultos epilepticos tam adultos [etſi nullum acidi indicium] quam infantes pulveris cochlearum et lumbricorum terreſtrium [ab aliis, quibus arcano fuit, propinati] uſu ſanatos eſſe obſervavit.)

Helleborus albus, v. *Veratrum album.*

Helleborus niger. (Radix.)

Greding (J. E.) ſämmtl. mediz. Schrift. T. I. p. 189. (cum fructu dedit epilepticis pulverem radicis.)

Extract. e radice paratum aquoſum.

Bouteille, in Journ. de Medecine 1776. Decembr. p. 544.

1777. Janvr. p. 63.

v. Samml. auserl. Abhandl. f. pract. Aerzte. B. IV. St. 2. p. 313. (efficaciam ejus a gr. v — xx. interdum expertus, praecipue in epilepſia cum mentis alienatione proficuum eſſe putat.)

Helvetii Antepilepticum puerorum, v. *Vitriolum caeruleum.*

Hepar Canis, v. *Canis familiaris.*

— — *Elephantis*, v. *Elephas maximus.*

— — *Lupi*, v. *Canis Lupus.*

— — *Lutrae*, v. *Lutra vulgaris.*

— — *Perdicis*, v. *Tetrao Perdix.*

— — *Ranarum*, v. *Rana.*

Heracleum Sphondylium. (Herba.)

Medical Papers communicated to the Maſſachuſets medical Society. Number. I. Boſton 1790. n. 3. (Experimenta circa hoc remedium in epilepſia tentata efficaciam non probantia.)

Plinii Hiſtor. natural. L. XXIV. c. 6. (ex aceto utile.)

Heraclinum oleum, v. *Oleum heraclinum.*

Hirudo medicinalis. (Chirurgica applicatio.)

Dolaei Encyclop. medic. p. 146.

Gazette ſalutaire. 1775. (ad anum applicata, ſuſtulit epilepſiam a ſuppreſſis haemorrhoidibus, reſtituto fluxu haemorrhoidali.)

Juy-

Juymes, in Journ. de Medecine. T. LIV. p. 425.

Saur, in Svensk. Vet. Acad. Handl. Vol. XXXIV. Stockholm 1773. p. 92. (ad tempora, pone aures et circa collum paroxyſmos epilepticos rarefecit.)

Sylvaticus (Bened.), in Theoph. Boneti Mercur. compilat. art. Epilepſ. §. 40. (ad anum per menſes continuata epilepſiam ſanavit.)

Tiſſot l. c. p. 267. 269.

Tulpii (N.) Obſervat. Lib. I. obſ. 56. (ad anum.)

Zacut. Luſitan. Prax. admir. Lib. I. obſ. 26. (ad muliebria epilepſiam poſt partum ſanavit.)

— — — obſ. 28. (ad anum epil. a haemorrhoid. ſuppreſſ. ſuſtulit.)

? Lapilli ? (interne.)

Mizaldi (Ant.) Cent. I. aph. 22.

Hirundo urbica.

Bartholin. (Thom.) Epiſtol. medic. Cent. II. p. 436.

E. N. C. Dec. II. Ann. IX. obſ. 54.

Wirdig (Sebaſt.) Medicina ſpirituum curioſa. Hamburg. 1688. 12. p. 229. (Hirundines in epilepſia efficaces eſſe, quia in hieme morientes, vere autem quaſi iterum reſurgentes palingeneſias ſignaturam habent.)

Aqua deſtillata.

Quercetan. (Joſ.) de priſcorum philoſophorum verae medicinae praeparationis modo. Genevae 1603. 8.

— — — Tetras graviſſimorum totius capitis affectuum. Marburg. 1606. 8. p. 148.

Aqua Hirundinum Pharmacop. Auguſtan.

Spina l. c. p. 71. (formula.)

— — — *Fiſcheri*, ib. p. 73. (formula.)

— — — *le Mort.* ib. p. 74. (— —)

— — — *Rolfinci*, ib. p. 73. (— —)

— — — *de Spina*, ib. p. 71. (— —)

— — — *Zwölferi*, ib. p. 74. (— —)

Cor.

Macaſii (J. G.) Prompt. Mater. med. p. 11.

Eſſentia Hirundinum.

Medicina experimental. Dygbaeana. T. II. p. 122.
(*Formula.* Doſ. ℥j. in die.)

Sylvatici (Bened.) Conſil. et reſponſ. med. Cent. IV. Patav. 1656. fol. (laudat.)

Sanguis.

vid. Gmelin. Pilul. antepilept.

Hofmanni Aqua catharrhalis.

Spina (D. de) l. c. p. 44. (et in epilepſ. laudatur.)

Hofmanni Balſamum epilepticum.

Spina l. c. p. 169.
(*Formula:* ℞. Extr. Rutae ℈ij. Caſtor. ℈j. Ol. d. Succin. ℈ß. Junip. gtt. vj. Theriac. Androm. ʒij. Camphor. gr. v. Miſc. F. Balſ. In Paroxyſmo epileptico cum hocce balſamo nares et vertex capitis inungantur, bis vel ter in die.)

Hofmanni Liquor anodynus mineralis.

Hofmanni (Fr.) Medic. ration. ſyſtem. T. IV. P. III. p. 20. (leniendo profuiſſe teſtatur.)

Hofmanni Pilulae antepilepticae.

Spina l. c. p. 701.
(*Formula:* ℞. Ladan. depur. ʒj. Extr. maſſ. pil. coch. ℈j. Succ. alb. ppt. ℈ß. Sal. vol. ſucc. Sangu. human. āā gr. xij. Reſ. Jalapp. ℈j. Moſch. gr. v. Ambr. gr. vij. F. c. ▽ fl. Tiliae Pilulae.)

Hofmanni Pilulae antepil. praeſervativae.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 472.

Hofmanni Pulvis epilepticus.

Spina l. c. p. 760.
(*Formula:* ℞. Cinnab. nativ. ℥j. Unicorn. veri. ʒj. C. C. uſt. ppt. ʒij. Viſc. quern. in leone decerpt. ʒij. Terr. ſigill. ver. ʒiij. Magiſt. Corall. Perlar. āā ʒß. Cinnamom. ℈j.
M. F. P. Doſ. ℈ß — ʒß.)

Homo.

Homo.

Cerebrum.

Hirſchel l. c. §. IV. p. 5.

Cerebri human. ▽ deſtill.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1744.

Cerebri human. Spirit.

Hartmann (Jo.) Prax. chymiatr. p. 19.

Schroeder l. c. p. 1744.

Cor.

Macaſii (J. G.) Prompt. mater. med. p. 12. (pulveriſat. hominis ſcelerati breviter ante mortem graviter perterriti.)

Schroeder l. c. p. 1745.

Cranium.

Corteſii (Jo. Bapt.) Miſcellan. med. Decad. II. Meſſan. 1625. fol. (non apparere, quare oſſa cranii epilepſiae opitulentur.)

E. N. C. Dec. I. Ann. II. obſ. 28. 53. Schol. p. 99. (laudes.)

Eraſti (Thom.) Diſput. IV. p. 135. (ejus uſum diabolum docuiſſe.)

Henault (Nic.) et Guill. Desdarnes D. Non ergo epilepſiae cranium humanum. Pariſ. 1611.

Lemnii (Levin.) de miraculis occultis naturae. L. IV. Francofurt. 1590. 12. p. 148. (mari a cranio maſculino, foeminae a foeminino eſſe propinandum.)

Moor (Barthol. de) Patholog. cerebri. (paſſim laudat.)

Plinii Hiſtor. natur. Lib. XXVIII. cap. 1.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1741. (praecipue os triquetrum.)

Cranium calcinatum praeparatum.

Schroeder l. c. p. 1742.

Cranii Extractum ſ. Gaſreda Theophraſti.

Schroeder l. c. p. 1743.

Cranii Magiſterium.

Quercetani (Joſ.) Tetras etc. p. 325.

Cranii Magiſterium compoſitum.

Schroeder l. c. p. 1742.

Cranii Oleum et Spiritus.

E. N. C. Dec. II. Ann. VI. obſ. 37.

Medicin. experiment. Dygbaean. T. II. p. 352. (praeparationem docet. Doſ. in epil. gtt. x — xx.)

Schroeder l. c. p. 1742.

Cranii Oſſa ſeſamoidea.

Feurſtein (J. H.) Diſſ. cit. p. 91. (eorum mentionem facit.)

Cranii Sal volatile.

Schroeder l. c. p. 1742.

Cranii Tinctura.

Schroeder l. c. p. 1742.

Cranii Usnea.

E. N. C. Dec. I. Ann. II. obſ. 53.

Schroeder l. c. p. 1333. et p. 1743.

Crinium e regione pubis cinis.

Fahner Magaz. für die popul. Arzneik. B. I. Heft 6. Frankenhauſen 1785. 8. p. 339. (a matre infantis deſumptarum in eclampſia infantum.)

Cutis Capitis mitrae inſtar geſtata.

Macaſii (J. G.) Promptuar. Mater. med. p. 14.

Dentes pulveriſati.

E. N. C. Dec. II. Ann. VI. obſ. 122.

Funiculi umbilicalis pars infantilis.

Macaſii (J. G.) l. c. p. 38. (exſiccata, delapſa, pulveriſata. Hanc ob cauſam obſtetrices eam patri conſervandam dare.)

Sanguis.

Bartholin. (Thom.) de ſanguine vetito. Francof. 1673. 8. p. 8. ſqu.

Bartholom. Anglicus de proprietatibus rerum. Nuremb. 1483. fol. L. VII. cap. 9. (Tres ſanguinis guttae per ſcarificationem e ſcapulis extrahendae et cum ovo corvi in fine acceſſionis aegroto offerendae.)

Bierling (C. Th.) Medic. theor. pract. p. 935. (laudat.)

E. N. C. Dec. I. Ann. X. obſ. 149. (inefficaciae exemplum.)

Langii (Jo.) Epiſtol. medicinal. Hanov. 1605. Lib. I. epiſt. 14.

Platearii (Jo.) Practica brevis. Venet. 1497. fol. (ſanguinem de ſcapulis ope cucurbitulae eductum cum ovis corvi poſt finem paroxyſmi aegro dat bibendum.)

Reyes

Reyes Campus Elyſius quaeſtionum jucundarum. Quaeſt. 71. p. 949. 950.

Schaper (J. E.) Medicinae curioſae duabus quaeſtionibus enodatae ſpecimen. Roſtoch. 1703. Quaeſt. II.: An ſanguis hum. calidus epilepſiae remedium? Negat.

Tiſſot l. c. p. 351.

Tulpii (Nicol.) Obſerv. med. L. IV. obſ. 4. (epilepſia ex ejus uſu aucta.)

Verzaſcha (Bernard.) Obſervat. medic. Centur. Baſil. 1677. 8. (fruſtra et malo cum eventu epotus.)

Sanguis decollati hominis.

Bresl. Samml. Verſ. XVI. p. 654. XXIX. p. 222. (vituperatur.)

Macaſii (J. G.) Prompt. mater. med. p. 25. (laudatur.)

Riedlini (Vit.) Iter medic. p. 44. (vituperatur.)

Sanguis epileptici.

Aetius. Tetr. II. Serm. II. cap. 15. (collapſos ſtatim excitari, ſi ſanguis e pollice pedis aegroti vulnerato labiis illinatur.)

Bartholin. (Th.) Obſerv. Cent. II. hiſt. 78.

Camerar. (Jo.) Syllog. memorab. med. Cent. XVI. partic. 43.

Sanguis gladiatorum romanorum jugulatorum.

Celſus (Aur. Corn.) de Medicin. Lib. I. c. 34. edit. Almel. p. 174.

Plinii Hiſtor. natur. Lib. XXVIII. cap. 1.

Sanguis menſtruus prima vice eruptus.

Ettmüller (Mich.) Opera omn. T. I. p. 780.

Macaſii (J. G.) l. c. p. 33.

Schroeder l. c. p. 1726. (ſiccatus.)

Sanguinis Oleum deſtillatum et rectificatum.

Garmann (Chr. Fr.) de miraculis mortuorum. Lipſiae 1681. 4. Lib. II. Tit. II. §. 69.

Helmont (J. Bapt. van) Tr. de aura vitali.

Schroeder l. c. p. 1736.

Sanguis paternus.

Camerarii (Jo.) Syllog. memor. Cent. XVI. partic. 34.

Sanguinis Quinta eſſentia.

Medicina experiment. Dygb. T. II. p. 339. (praeparandi modum docet. Doſ. gtt. iv.)

Sanguinis Spiritus.

Schroeder l. c. p. 1736.

Waldſchmidt (Jo. Jac.) Oper. med. pract. Francof. 1695. 4. p. 311.

Secundinae humanae.

Finkii Enchirid. dogmat. hermet. c. 5.

Hirſchel l. c. §. IV. p. 5.

Koenig. (Eman.) Regnum animal. Baſil. 1682. 4. Sect. III. Art. II. pag. 258.

Langii (Chriſt.) Oper. omn. T. II. p. 137.

Lentilii (Roſin.) Miſcell. medic. p. 37.

Macaſii (J. G.) Prompt. Mater. med. p. 29. (primiparae.)

Schroeder l. c. p. 519. (Pulvis ſecundinarum.)

Schurig (Mart.) Embryologia. Dresdae et Lipſ. 1732. 4. p. 379.

Secundinarum Spiritus.

Dolaei (Jo.) Encyclop. medic. p. 140.

Michaelis (Jo.) Oper. medic. Norimb. 1688. 4. p. 682.

Schröder l. c. p. 1727.

Waldſchmidt (J. Jac.) Oper. med. pract. p. 682.

Stercus.

Ettmüller (Mich.) Oper. omn. T. I. p. 215.

Lancilotti Guida nuova aila Chymica. p. 34. (aqua ex eo deſtillata.)

Urinae Spiritus antepilepticus.

Schroeder l. c. p. 1726.

Urinae Spiritus cryſtalliſatus.

Schroeder l. c. p. 1730.

Vertebrarum hominis violenta morte peremti Raſura.

Feurſtein (J. H.) l. c. p. 91. (ejus mentionem facit.)

Hyacinthus orientalis. (intrat varios pulveres antepil. e. g. ♉ de gutteta, pannonic. rubr. etc.)

Hyoſcyamus niger. (Herba.)

Extractum.

Bang (Fr. L.) Prax. med. noſoc. Frider. Havniae 1789. p. 365.

Col-

Collin (H. J.) Obſerv. Vol. II. p. 148. (dedit convulſo a gr. xxiv -- ℨ ß.

Foucquet, in Journ. de Medec. T. LVI. p. 441.

Greding (J. E.), in Adverſar. medic. pract. Vol. I. P. I. p. 71. ſq.

— — — ſämmtl. mediz. Schriſt. Th. I. p. 36. (multa circa hujus remedii in epilepſia efficaciam tentavit experimenta. Per breve temporis ſpatium paroxyſmos quidem mitigare, tamen non absque omni periculi metu propinari poſſe, nec tanti frugis ex ejus uſu eſſe ſperandum, quanti a quibusdam putatur. Dedit ab initio gr. j. ter de die; dein gr. xviij. per diem.)

Lentin (Fr. B.) Beobacht. der Krankh. am Oberharze im Jahre 1777 und 1778. Deſſau 1783. (profuit ei.)

Sauvages Noſol. method. T. II. p. 306. (imminuit paroxyſmum.)

Stoerk (Ant.) Libell. de Stramon. Hyoſcyam. Vindob. 1762.

— — — Continuat. experim. Vindob. 1765. p. 112. (primus ejus uſum praecipue tentavit. Dedit gr. j. bis vel ter in die, ſenſim augendo doſin ad gr. viij. usque.)

Semen.

Mayerne (Theod.) Syntagma praxeos medicae. P. I. London. 1690. 8. p. 23. (a gr. vj. vel viij. ſenſim ad gr. xxiv. aſcendendo ex cochleari ſucci ſempervivi ultra XL. dies uſurpandum.)

Scardona (Jo. Fr.) Aphoriſm. de cognoſcend. et curand. morb. Padovae 1746. Lib. I. c. 8. (anceps eſſe et periculoſum remedium.)

Hypericum perforatum. (Herba.)

Quercetan. (Joſ.) Pharmacop. dogmat. cap. 9.

Riverii (Lazar.) Obſervat. med. Cent. I. obſ. 16. Cent. II. obſ. 16.

Schroeder (Jo.) Pharmacop. univerſal. p. 1279.

Hyſſopus officinalis. (Herba.)

Foreſt. (Petr.) Obſervat. Lib. X. obſ. 58.

Ruland (Mart.) Curat. empir. Lugd. 1628. 8. Cent. X. curat. 95.

Sennert (Dan.) Inſtitut. pract. Lib. I. P. II. c. 31.

Schroeder l. c. p. 1281. (Hyſſopi c. ▽ paeoniae decocti in epilepſia laudes ex Alexandro Tralliano et Camerario habet, nec Matthioli pilul. e Hyſſopo et Paeonia in epil. laudatas.)

I.

Ignatia amara. (Ignatiana Philippinica Loureiro. Faba.)

Acta Berolinenſ. Dec. II. Vol. X. p. 12. (laudatur.)

Herrmann (Paul.) Cynoſur. mater. med. T. II. p. 231.

Loureiro Flora Cochinchin. Tom. I. (convulſiones dispellere affirmat et a gr. vj — xij. concedit aqua vel vino captam.)

Stein (G. A.) D. de faba St. Ignatii. Erlang. 1793. 8. (Virgo annorum XXVII. plures per annos ex terrore epileptica et quotidie paroxyſmis vexata omni mane pulveris gr. iij. cum Sacchar. gr. xxxvj. et aequalem doſin appropinquante paroxyſmo ſumens intra bimeſtre ab epilepſia liberata eſt.)

Valentini (M. B.) Hiſtoria ſimplicium reformata. p. 198. (Exemplum ea peractae ſanationis infantis tenelli ſepties jam paroxyſmo epileptico afflicti.)

Imperatoria Oſtruthium. (Radix.)

E. N. C. Dec. I. Ann. IV. obſ. 42. (radicem recentem pollicibus pedum manuumque applicatum epilepſiae remedium eſſe.)

Miſcell. curioſ. Ann. IV. obſ. 38.

Inciſiones. cfr. *Scarificatio.*

Mead (Rich.) de imperio ſolis et lunae in corpora humana. London. 1704. 8. (commendat.)

Praxagoras et Themiſon, v. Cael. Aurelian. tard. paſſion. L. II. c. 4. (jam inciſiones in cutem occiput tegentem uſitaſſe.)

Infuſoria Chirurgia, v. *Chirurgia infuſoria.*

Inſitio Scabiei.

Gazette ſalutaire de Bouillon, 1775. p. 42. (epilepſiam a ſcabie retrograda ſuſtulit.)

Löffler's Beiträge zur Wundarzneik. B. I. Leipzig 1791.

Inſitio Tineae.

Beaumes, in Gazette ſalutaire de Bouillon, 1790. IV. (infantibus epilepticis proficuam putat ob derivationem acrimoniae irritantis ad cutis ſuperficiem. Hoc illuſtrare ſtudet caſu quodam in: Journal de Medecine 1789. Novembr. enarrato.)

Ipecacuanha, v. *Cynanchum Ipecacuanha.*

Iſis

Iſis nobilis. (Corallia rubra.)

Pulvis.

Intrat varia compoſita antepileptica, e. g. pulverem epil. marchionis, de gutteta, pannon. rubr. etc.

Tinctura.

Medicina experiment. Dygb. T. II. p. 358.

Juglans nigra. (Glandes toſt. ad pot. coffeiform.)

Marx (M. J.) beſtät. Kräfte d. Eicheln. Hannover 1781. p. 24. (Epil. ab onania iis ſanata.) p. 28. — — p. 34. Obſervat. Blochii Berolinenſis.

Jüngkenii Aqua antepileptica.

Jüngken (J. H.) Lexic. chym. pharmac. P. II. p. 53.

(*Formula:* ℞. Aquae Lil. conv. Fl. Tiliae. Ceraſ. nigr. Roſar. a roſ. recent. ſaepius cohobat. āā ℔ ij. His mixtis ſucceſſive immergantur Flor. Cheiri, Tunicae āā ℥ iij. Lavend. Anthos āā ℥ j ß. Herb. Majoran. recent. Thym. āā ℥ j. Cinnam. acut. ℥ iv. Mac. Cardam. Cubeb. āā ℥ ß. Maceratione per tempus facta, ſi lubet, deſtillentur, roſtro capitelli immiſſa Ligni Aloes ʒ ß.)

Jüngkenii Balſamum epilepticum.

Jüngken (J. H.) l. c. p. 99.

(℞. Balſam. Rutae, Succini āā ℈ j. Axung. Caſtor. ℈ ß. Camphor. gr. v. M. F. Balſ. quo nares et vertex inunguntur in paroxyſmo.)

Jüngkenii Pulvis antepilepticus.

Jüngken (J. H.) l. c. p. 310.

(℞. Rad. Valerian. Pulv. Secundin. puelli primogeniti ſiccatae āā ℥ ß. Succin. alb. praep. Smaragd. praepar. Cinnab. nativ. praep. āā ʒ j. Caſtor. ℈ ij. Camphor. ℈ j. M. F. P. Doſ. ℈ j — ʒ j. Eſſe pulverem quoad ſaporem quidem ingratum, ſed quoad effectum omnibus aliis palmam diſputantem.)

Juniperus communis. (Baccae.)

Act. Erud. Lipſ. 1691. Februar. p. 58. (efficaciae exemplum.)

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1210.

Spiritus.

E. N. C. Dec. II. Ann. VIII. obſ. 60.

Junkeri Extractum antepilepticum.
Schroeder l. c. p. 405. (formula.)

K.

Kermes minerale, v. *Antimonium.*
Kieſowii Eſſentia vitae.
Salzb. mediz. chirurg. Zeit. 1791. B. I. p. 166. (Hocce arcanum Medici Auguſtae Vindelicorum olim viventis conſtare forſan e Croco, Aloe, et Rheo. Contra epilepſiam absque fructu propinatam eſſe.)
Krügeri Pulvis antepilepticus.
Spina (D. de) l. c. p. 758.
(℞. Cryſtall. foſſil. ʒj. Corall. rubr. ppt. ℈ij. Margar. ppt. ʒj. Smaragd. ppt. ʒß. F. P.)
Kyphy.
Alexand. Trallian. L. I. c. 15. (hujus remedii magna cum laude mentionem facit. Suffimigium erat apud Aegyptios celebratum, ſedecim varias ingredientes continens ſpecies [e. g. Aſpalathum, myrrham, thus etc.], non ex arbitrio, ſed ſecundum certas magni apud eos aeſtimati numeri quaternarii regulas componendas. vid. Plutarch. de Iſid. et Oſirid. Opp. T. II. edit. Xylandr. fol. 1620. p. 383.)

L.

Lac. (uſus diaeteticus.)
Cheyne (Georg.) Eſſay on the Gout. London. 1724. 8. p. 103. (laudat.)
— — — Tr. de natura fibrae ejusque laxae ſeu reſolutae morbis. London. 1725. (Epilepſia lacteo victu ſanata.)
Nigriſoli (Fr. Mar.) Tractatus varii ad recentiorum mentem concinnati. Ferrariae 1690. (hyſterico-epilepticis convenire lactis uſum.)

Tiſ-

Tiſſot l. c. p. 366. ſqu. (laudat.)

Serum Lactis.

Plater (Fel.) Obſervat. ſelect. mantiſſa. Baſil. 1680. 8. (epilepſia ex aura aſcendente erumpens ſero lactis curata.)

Lac Aſininum, v. *Equus Aſinus*.

Lacerta Crocodilus. (Stercus.)

Cael. Aurelian. Chronicor. Lib. I. cap. 4. (a Serapione eſſe commendatum.)

Langhanſii Tinctura Liliorum alborum, v. *Lilium candidum*.

Langii (Jo.) Aqua antepileptica.

Langii (Jo.) Epiſtol. medicin. Francof. 1589. 8. L. III. c. 2.

Spina (D. de) l. c. p. 58.

(℞. Flor. Lil. conv. rec. Mp. xij. Lavend. ℥j. Rorism. Stoechad. āā ℥ß. Cinnam. ʒvj. Nuc. moſch. ℥ß. Piper. long. Cubeb. āā ʒij. Viſc. quern. Rad. Paeon. Dict. noſtr. āā ℥ß. infund. in vin. gener. M. jß. per octid. deſtill.)

Langii (Jo. Henr.) Tinctura antepileptica.

Kaempf (Jo.) Enchirid. medic. p. 30. (laudat ad avertendum paroxyſmum. Superbibendum eſſe infuſum meracum ſpecierum nervinarum infuſumque moſchatum ano injiciendum.)

Lange (Jo. Henr.) Tentamen de remediis domeſticis Brunſuicenſibus. Brunſuicae 1765. p. 83.

(*Formula*: ℞. Aſae foetidae ℈j. Solv. in Liqu. C.C. ſucc. ℥j. Doſ. gtt. xxx. in Aqua hirundinum c. Caſtoreo. Ante acceſſionem ad mitigandam, imo quandoque curandam epilepſiam idiopathicam eſſe adhibendam; non tamen plethoricis, niſi prius ſanguinis copia venaeſectione fuerit minuta.)

Lapis Armenus, v. *Cuprum nativum*.

Lapis Chelidonius.

Kovacs Tatai l. c. p. 115. (egregium eſſe in epil.)

Lapis Divinus, v. *Argentum*.

Lapis Lazuli, v. *Lazurus orientalis*.

Laurus Camphora. (Reſina.) Cfr. Locheri Mixtur. camphor. Petri Tinct. antepil.

Baldinger (E. G.) von den Krankh. einer Armee. 2te Ausg. Langenſalz. 1774. (Acetum camphoratum laudat.)

Comm. Lipſienſ. Vol. IV. p. 72. (e Gentlemans Magazine.)

Hornung (Jo.) Ciſta medic. Norimb. 1625. 4. p. 305.

Locher (Max.) Obſervat. pract. p. 42. (homo quidam per triennium epilepticus convaluit ope mixturae ex aceto et camphora.)

Medicina experimental. Dygbaean. T. II. p. 340. (oleum camphorae laudat.)

Prange (A. D.) D. de virtute camphorae anthelmintica. Gotting. 1759. recuſ. in Balding. Syllog. recent. opuſc. T. II. p. 125. (laudat.)

Tiſſot l. c. p. 322. (levamen ex ejus uſu obſervaſſe, nunquam autem plenariam epilepſiae medelam. Doſin gr. x. nunquam exceſſe et ultimam doſin ſemper ante horam iv. pomeridianam propinaſſe; ſerius datam excitare ſomnum inquietum.)

Laurus Cinnamomum. (Cortex.)

Aqua Cinnamomi contra epilepſiam Diſp. Noric.

Spina (D. de) l. c. p. 38.

(*Formula:* ℞. Cinnam. opt. ℔j. Sem. Paeon. recent. ℥j. Sclareae, Caryophyll. āā ʒ v. Viſc. quern. Rad. Paeon. āā ℥ ß. Inciſ. et Contuſ. macer. in ▽ Cinnam. ℔ v. per dies viij. dein f. deſtill. p. B.)

Oleum.

Medicina experiment. Dygbaean. T. II. p. 308. (doſ. gtt. vj.)

Lavendula Spica. (Oleum.)

Medicina experim. Dygb. T. II. p. 323.

Lazurus orientalis.

Sylvatic. (Bened.) Conſil. et reſponſ. med. Cent. IV. Patav. 1656. fol. (laudat.)

Leonis Stercus, v. *Felis Leo.*

Lepus Cuniculus. (Pinguedo.)

Kovacs Tatai l. c. p. 119. (Cuniculi violenta morte occiſi pinguedo recens liquata et ad gr. v — vj. in aqua picarum aut hirundinum propinata.)

Lepus

Lepus Timidus.

E matre exciſus, ſiccatus, pulveriſatus.

Hofmann (Fr.) Medic. rat. ſyſt. T. IV. P. III. Cap. I. §. 2.

Cor.

Cael. Aurelian. Chronic. Lib. I. cap. 4. (a Serapione eſſe commendatum.)

Macaſii (J. G.) Promptuar. Mater. medic. p. 8.

Pulmones.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1746. (cum ſale marino et myrrha conditi.)

Sanguis.

Schroeder l. c. p. 1746. (leporis canibus perſecuti ʒj. c. Vino.)

Lichen Cocciferus et pyxidatus.

Willis (Thom.) de morb. convulſiv.

Ligatura. cfr. P. II. App. II. §. 5. 6. et 7. de aura epileptica.

Bechſtedt D. de artuum ligaturis ad nonnullos morbos internos uſitatis. Duisburg. 1773.

Cullen (W.) Anfangsgr. der Arzneiw. T. III. p. 174. (commendat.)

Galen. de locis affect. L. III. c. 7.

Löffler's Beiträge zur Arzn. u. Wundarzn. Th. I. (ad genu applicata epilepſiam cum aura a planta pedis aſcendente ſuſtulit.)

Lyſons practical Eſſays. Bath. 1772. 8. p. 153. (felicis ſucceſſus exemplum.)

Mangor (C. E.) in Act. Societ. med. Havn. Vol. II. Havniae 1791. 8. p. 452. (epilepſia pediſymptomatica ſola ligatura ſanata.)

Maurer (F. G.) Comm. de medicam. antepil. Marburg. 1792. p. 39. (plerumque ab ejus uſu fractam eſſe morbi vehementiam. Una tantum vice ſpaſmos interne auctos eſſe, dum externe erant omnia tranquilla.)

Pew (Rich.) Skizzen aus d. Heilkunde; a. d. Engl. Leipzig 1787. 8. p. 34. 35. (plura de hacce chirurgica adminiſtratione profert.) p. 44. (ſanationis per ligaturam peractae exemplum.)

Preſſavin Nouveau Traité des vapeurs. à Lyon 1770. 12. p. 123. (laudat.)

Pura-

Purari, in Burnet. Theſaur. medic. practic. Genevae 1676. 12. T. II. p. 463. (paroxyſmi cum aura a pede aſcendente per ligaturam ſupra genu applicatam feliciter mitigati.)

Rahn (J. H.) Briefwechſel. B. I. p. 516. (efficaciae exemplum.)

Rhazes Lib. IX. ad Almanzor. c. 2. (jam ab eo uſitata.)

Salmuth (Phil.) Obſervat. Cent. I. obſ. 90.

Schenk (Jo.) Obſervat. rarior. Lib. I. obſ. 198. 231.

Lilium candidum. (Flores.)

Intrant varias veterum compoſitiones.

Tinctura florum Liliorum Langhanſii (Medici Bernenſis.) (praeparandi formula non plane nota.)

Baldinger Magaz. für Aerzte. 1777. St. VIII. p. 745.

Langhans Abhandl. von den Laſtern, d. ſ. a. d. Geſundheit d. Menſchen ſelbſt rächen. Bern 1773.

Linteum caeruleum.

Carl, in Comm. litter. Noric. 1733. p. 210. (uſtum pulveriſatum in connubio pulveris nigri epileptici.)

Liquor anodynus mineralis Hofmanni, v. *Hofmann.*

Liquor antimonialis Rollwagenii, v. *Rollwagen.*

Liquor Cornu Cervi ſuccinatus. cfr. Langii Tinctura antepil.

Weikard (M. A.) Obſervat. medic. Francof. 1775.

Liquor Lotharingicus, v. *Nicolas Liquor lotharingicus.*

Locheri-Mixtura Camphorata.

Locher (Max.) Obſervat. pract. etc. p. 42.

(*Formula:* ℞. Camphor. ʒ ß. Sacchar. canar. Mucilag. Gumm. arab. ā̄ā ʒ j. His invicem in mortario marmor. tritis adde Acet. calid. ℥ ß. Aqu. flor. Samb. ℥ vj. Symp. flor. Papav. Rhoead. ℥ j. Mixtura per diem ſumenda et multo cum fructu propinata.)

Ludovici Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 758.

(℞. Bezoard. alb. quod conſtat ex C.C. philoſ. Terra ſigill. et Unicorn. foſſ. ā̄ā. Succin. alb. ppt. ā̄ā ʒ ij. Cinnab. nativ. ℥ ß. Laudan. op. ʒ j. F. P.)

Waldſchmidt (J. J.) Oper. med. pract. p. 12.

Lujae (D.) Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) Medic. theor. pract. p. 114.

Lumbricus terreſtris.

Haen (A. de) Rat. medendi. (ptiſanam lumbricorum commendat.)

Kaempf (Jo.) Enchirid. medic. p. 28. (permultos tam adultos quam infantes absque ullo acidi indicio epilepticos pulvere cochlearum et lumbricorum terreſtrium ſanatos vidit.)

Luna potabilis, v. *Argentum.*

Lunaria annuá. (Herba.)

Kovacs Tatai l. c. p. 124. (laudat.)

Lupi hepar, v. *Canis Lupus.*

Lutra vulgaris. (Hepar.)

Gaſſer (Achill. Pyrmin.) Curat. et obſerv. medic. obſ. 30. in Hier. Welſchii Syllog. obſerv. et curat. med. Cent. VI.

Lycopodium clavatum. (Semen.)

E. N. C. Dec. I. Ann. I. obſ. 97. Ann. II. obſ. 15.

Miſcell. curioſ. Ann. III. obſ. 15. p. 20.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1334.

Lyſimachia purpurea. (Herba.)

Scherb D. de Lyſimachiae purp. virtute medicinali non dubia. Jenae 1790. p. 32. (commendat decoctum herbae in epilepſia.)

Radix (externe).

Gottſched Flora pruſſica. p. 155. (radicem, ſole ultimum cancri gradum accedente, collectam et collo appenſam certiſſimum epilepſiae remedium eſſe.)

M.

Magiſterium Auri, v. *Aurum.*

Magiſterium epilepticum.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 443. (formula.)

Magiſterium epilepticum Michaelis, v. *Michaelis.*

Magiſterium Wismuthi, v. *Wismuthum.*

Magnes.

Anonymus quidam, in Gazette ſalutaire de Bouillon. 1761. (brachio utrique epileptici alligato epilepſiam ſanaſſe teſtatur.)

Paracelſus (Theophr.) de vi magnetica. p. 1019. (in epilepſia quatuor magnetes ad extremitates inferiores, unum ad caput applicare ſuadet.)

Unzer (J. C.) Beſchreibung e. m. d. künſtl. Magnet. angeſtellt. Verſuchs. Altona 1775. (in duobus epilepticis fere nihil effeciſſe.)

Magneſia alba.

Gmelin (Jo. Fr.) Apparat. medicam. e regn. miner. T. I. Gotting. 1795. 8. p. 23. (in epil. ab acido primarum viarum antepileptici titulo multo magis dignam eſſe, quam ſesquipedales illae veterum formulae ex terris calcareis praefertim animalibus conflatae.)

Magnetiſmus animalis.

Feurſtein (J. H.) D. de epilepſia. p. 82. (Argentorati optimo cum ſucceſſu eum applicatum obſervavit tribus puellis, quae a prima aetate epilepſia vexatae erant. Per biennium enim paroxyſmus non rediit. Effectum vero laudatum a ſola irritatione partium corporis ſenſibilium atque imaginationis operationibus eſſe derivandum.)

Malachites, v. *Cuprum.*

Marchionis Pulvis epilepticus.

Pharmacop. Wirtemb. 1741. p. 261.

(*Formula:* ℞. Rad. Paeon. ℥iij. Viſc. quern. Raſur. Ebor. Ungul. Alc. Corn. Cerv. Spodii. Corall. rubr. albor. Margar. ppt. āā ʒ vj. Fol. Auri. n. xx. M. fiat Pulv. ſubtiliſſ. Doſ. gr. x. — ʒ ß.)

* * *

Ackermann, in not. ad Tiſſot. l. c. not. 62. 73. (non raro in epilepſia infantum ab eo optimum effectum obſervaſſe.)

Hofmann, in Baldingers N. Mag. f. A. B. IX. St. 5. p. 535. (Formula ſequenti modo reformata commendatur:
℞. Magneſ. e Sal. angl. ℥ij ß. Pulv. rhei. ℥ ß. Viſc. quern. Fol. Aurant. āā ℥ j. M. f. P.)

Hufeland Bemerk. über die natürl. und geimpft. Blattern. Leipzig 1793.

1793. 8. p. 345. (pulverem antepil. Marchionis [abſque auro] longe praefert Magneſiae in epilepſia infantili ab acido.)

Schreger (B. N. G.) krit. Diſpenſ. p. 101. (vituperat.)

Tiſſot l. c. p. 338. (inefficacem ſuperfluumque eſſe, niſi in epilepſia infantum ab acido aliquid frugis praebeat.)

Matrimonium, v. *Coitus*.

Mayerne Pulvis antepilepticus.

Mayerne (Th. de) Syntagma praxeos medicae. London. 1690. P. I. p. 16. et 44.

Meadii Electuarium antepilepticum.

Mead (Rich.) Monita et praecepta. Sect. III. c. 2. p. 37.

(℞. Pulv. cort. peruv. ℥j. Rad. Valerian. ſylveſtr. ʒij. M. F. c. Syrup. Aurant. qu. ſ. Elect. Hujus poſt debitas evacuationes devoret aeger bolum pondere ʒj. mane et veſpere tribus menſibus continuis, dein repetat triduo vel quatriduo ante novam plenamque lunam.)

Melaleuca Leucadendron. (Oleum Cajeput.)

Goetz, in Comm. litt. Noric. 1731. p. 5. (felici cum ſucceſſu in epilepſia adhibitae gttae ij — x. ſaccharo inſtillatae.)

Werlhof. (P. G.) Oper. medic. ed. Wichmann. p. 711. (in connubio cortic. peruviani.)

NB. Pulverem quoque antepilepticum Ragolo intrare putatur. vid. Ragolo.)

Meloe Veſicatorius (externe), v. *Veſicatoria.*

Interne.

Forſien, v. Beaumes l. c. p. 348.

Friccius de venenorum virtute medica. p. 161.

Mercurialis (Hieron.) de morbis puerorum. Lib. I. c. 3. (laudat in epilepſia infantum ideoque ingreditur ejus bolum antepilepticum, v. Mercurialis bolus antepilepticus.)

Neuforn (J. C. Stockar. de) D. de uſu cantharidum interno. Gotting. 1781. 4. p. 34.

Zacut. Luſitan. Prax. admir. Lib. I. obſ. 35. (epilepſiam ab urinae per calculum ſuppreſſione cantharidum uſu interno ſanaſſe.)

Mentha Pulegium.

Oleum.

Medicina experiment. Dygbaeana. T. II. p. 322.

Semen.

Plinii Hiſtor. natur. L. XX. cap. 14. (ex aceto propinandum.)

Mercurialis (Hieron.) Bolus antepilepticus.

Mercurialis de morbis puerorum. Lib. I. cap. 3.
(*Formula:* ℞. Pulv. Sem. Paeon. Viſc. quern. āā ℥ij. Card. ℥j. Canthar. ppt. ℈ij. M. F. c. mell. qu. ſ. Bolus, cujus ʒß — ʒj. ſingulis vicibus tribus horis ante cibum propinetur.)

Mercurius. cfr. Aethiops miner. Cinnabar. Troghieri pilulae catharticae.

Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzneiw. T. III. p. 186. (quaedam e Mercurii uſu ſperat.)

Deſſault Diſſ. ſur les maladies veneriennes. à Bourdeaux 1733. 8. p. 197. (plane inutilem eſſe in epilepſia.)

E. N. C. Déc. III. Ann. VII. obſ. 171. (ad ſalivationem usque propinatus epilepſiam ſanat.)

— — Cent. I. p. 272. (filia epileptica patris venerei per ſalivationem curata.)

— — Cent. III. p. 231. et 299. (epilepſia ſalivatione ſanata.)

Ettmüller (M.) Colleg. practic. in Oper. omn. p. 812. (cum fructu in epilepſia venerea adhibuiſſe.)

— — — Medicus theoria et praxi inſtructus, i. e. Fundamenta medicinae vera, curante Ausfeldio. Dresdae 1685. 4. (epilepſiam cum morbo venereo complicatam Mercurio ſanavit.)

Murray (Ad.), reſp. P. Dubb, D. ſ. meditamenta circa methodum luis venereae curandae. Upſaliae 1771. p. 25. ſqu.

Piſo (Homob.) De regimine magnor. auxiliorum. c. 4.
Rolfink Medicina conſultator. p. 193.
Scardona (J. Fr.) Aphoriſm. de cognoſcendis et curandis morbis. Lib. I. cap. 8. p. 163.
} (ſanationes epilepſiae per ſalivationem.)

Spörry üb. die Würkung des Queckſilbers in der Epilepſie; im Muſeum der Heilkunde. B. I. Zürch 1792. n. 35.

Sylvatic. (Bened.) Conſultat. medic. Conſult. 47.

Tiſ-

Tiſſot l. c. p. 328. ſqu. (in epilepſia a cauſa venerea, a humorum ſtaſi et acrimonia lymphae utilem eſſe ſtatuit.)

Willis (Th.) Pathologia cerebri. p. 46.

— — — de morbis convulſivis. cap. 3. (cum fructu in epilepſ. venerea adhibuiſſe.)

Mercurius dulcis.

cfr. Dolaei ☿ antepil. Plumeri ☿ alterans, et pilul. alterantes.

Acoluthus (J.), in E. N. C. Dec. II. Ann. IX. obſ. 166. (Epil. inveterata ſalivatione per Mercur. dulc. ſanata.)

Burſerii ab Kanilfeld Inſtitut. medic. pract. T. III. p. 253.

Dower, in Medical Eſſays. Edimburg. T. II. p. 510. (Mercur. dulcem cum cinnabari antimonii junctum in largiore dôſi commendat.)

Heiſter (Laur.) medic. chirurg. und anatom. Wahrnehm. Roſtock 1757. 4. (epil. a vermibus, hisce per Mercur. dulc. et Jalapp. expulſis, ſanata.)

Lyſon (Dan.) practical Eſſays. p. 117.

Thomaſius (Gothofr.), in E. N. C. Dec. III. Ann. III. obſ. 191. (epil. verminoſa eo ſanata.)

Tiſſot l. c. p. 350. (epil. ab acrimonia lymphae Mercur. dulc. et purgantibus ſanata.)

Mercurii inunctio.

Fabre nouvelles obſervations ſur les maladies veneriennes. à Paris 1779. 8. (epil. venerea ea ſanata.)

Houſſet (E. J. P.) Diſſ. ſur les parties ſenſibles du corps animal, ſuivi d'un mémoire ſur les avantages, que procurent les frictions mercurielles dans le traitement des quelques epilepſies idiopathiques etc. à Lauſanne 1770. 8. (Praecipuam epilepſiae cauſam aut in depravata viſcerum conditione, aut in ſumma humorum ſpiſſitudine ſtatuens [niſi contraindicans adſit, vel niſi compertum ſit, hunc morbum ortum eſſe a vitio quodam conformationis cerebri] ad inunctionem mercurialem quam potiſſimum ſpiſſos humores fundendi remedium perfugiendum eſſe putat, exemplisque ea peractae ſanationis confirmare ſtudet.)

Riedlini (Vit.) Obſervat. med. Cent. III. obſ. 71. p. 389. (Sanationis per inunctionem exemplum.)

Mercurii Oleum per ſe.

Medicin. experiment. Dygbaean. T. II. p. 112.

Mercurius Plenkii gummoſus.

Kaempf (Jo.) Enchirid. medic. p. 30.

— — — in Act. philoſ. med. Societ. acad. Scient. Haſſiac. Vol. I. Gieſſae 1771. 4. p. 152. (in epil. a cauſa venerea efficaciſſimum expertus eſt.)

Mercurius ſublimatus.

Bourru, v. Beaumes l. c. p. 228.

Gardane Gazette de Santé. p. 47. (in epil. venerea.)

Locher (M.) Obſervat. pract. p. 41. (cum felici ſucceſſu adhibuit in epil. venerea cum topho cranii.)

Turpethum minerale.

Sager (C. G.) Faſcic. obſervation. medic. practicar. Sundii. 1794. 8. (Epil. nocturna ab obſtruction. infim. ventris eo ſanata. Propinabatur omni biduo gr. j. cum Succ. Liquirit. gr. ij. in forma pilular.)

Metzgeri Specificum antepilepticum metallicum.

Metzger's (J. C.) deutl. und gründl. Beſchreib. zweier vortreflich. Specificor. chym. medicorum. Strasburg 1724.

Schreger's (B. N. G.) kritiſch. Diſpenſat. p. 284. (pulvis albo-cinereus ab inventore multis encomiis promulgatus. Secundum ipſius verba conſtare e quodam electro philoſophico totius regni mineralis metallici. Praecipuam baſin eſſe aurum argentumque. Doſis pro infante neonato gr. j. matris lacte mixtum, a quo ſecundum aetatis normam ad gr. vj. usque aſcendendum.)

Michaelis Decoctum antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 247.

(℞. Raſur. Lign. ſanct. ℥ iij. Viſc. quern. Tiliae ãã. ℥ ij. Lign. Rhod. bux. Saſſafr. ãã. ℥ j. Inf. in ſ. qu. aqu. fl. til. Lil. conv. Ceraſ. nigr. qu. ſ. ſpirit. vitr. epil. parum ſt. in inf. per aliqu. dies, poſtea coqu. in vitr. appoſ. alemb. deſtillat. affund. et edulcor. Syrup. fl. Paeon. qu. ſ. F. D.)

Micha-

Michaelis Emplaſtrum antepilepticum.
Spina (D. de) l. c. p. 396.
(℞. Succ. alb. Thur. Maſtych. āā ℥j ß. Galban. Opopan. āā ℈j. Viſc. quern. ʒij. Ambr. gryſ. gr. vj. Moſch. gr. iij. Sem. Paeon. mar. ʒß. Ladan. ʒj ß. Ol. nuc. moſch. parum aſperg. pulver. cubebar. F. Exempl.)

Michaelis Emulſio antepileptica.
Spina (D. de) l. c. p. 454.
(℞. Sem. Melon. ʒij ß. Paeon. ʒj. Papav. alb. ʒß. Aqu. fl. Til. Lil. conv. Paeon. āā ℥iij. Roſar. ʒj. Mar. chr. perl. ℥ß. F. Emulſ.)

Michaelis Enema antepilepticum.
Spina (D. de) l. c. p. 462.
(℞. Herb. Rut. mpl. ij. Fl. Paeon. Lil. conv. āā mpl. j. Rad. Paeon. ℥j ß. Squamar. ℥ß. Ariſtol. rot. ʒiij. Sem. Paeon. ʒij. Coqu. in ſ. qu. aqu. Colat. ℥xvj. add. Electuar. diaphan. ℥j. Vitell. ovor. n. j. Extr. Caſtor. ʒß. F. Enema.)

Michaelis Magiſterium antepilepticum.
Spina (D. de) l. c. p. 580.
(℞. Magiſt. Ungul. Alc. Cran. human. violent. mort. extinct. Corn. Alc. Cerv. āā ℥ß. Smaragd. ℥j. Unicorn. ver. ʒij. Succin. ʒj. F. Magiſt.)

Michaelis Rotulae antepilepticae.
Spina (D. de) l. c. p. 822.
(℞. Foecul. Aron. Viſc. quern. āā ʒj. Smaragd. ppt. Magiſt. epil. āā ℈ij. Sacchar. in aqu. epil. Lang. ſoluti qu. ſ. ut F. Rotul.)

Michaelis Specificum cephalicum.
Pharmacop. Wurtemberg. p. 291.
(*Formula:* Doſ. gr. x — xxiv.)
Schreger (B. N. G.) l. c. p. 102.

Michaelis Tinctura antepileptica.
Spina (D. de) l. c. p. 975.
(℞. Spirit. Ceraſ. nigr. Flor. Tiliae. Lilior. convall. āā ʒj. Eſſent. Flor. Paeon. Tunicae āā ʒß. M. F. Tinct. Doſ. gtt. xxv.)

Micha-

Michaelis Tinctura bezoardica.

Kovacs Tatai l. c. p. 116. (laudat in epilepſia.)

Schulze (Gothofr.) D. de natura Tincturae bezoardicae Michaelis. Halae 1678. 8.

Michaelis Vinum antepilepticum purgans.

Spina (D. de) l. c. p. 1014.

(℞. Rad. Paeon. ℥ ij. Herb. Primul. Ver. mpl. j. Flor. Paeon. Lil. convall. Tiliae āā pgl. iij. Rad. Helleb. nigr. ℥ ß. Rad. Jalapp. ℥ ß. Cardamom. Cubeb. āā ℥ j ß. Sem. Paeon. ʒ j. Aſperg. ſpirit. epil. incl. nod. et immitt. in Vinum.)

Moebii Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 760.

(℞. Cinnab. antim. rectif. et nativ. Hungar. āā ℥ ß. Smaragd. ppt. C. C. ſine ign. Corn. Alc. ſine ign. ppt. Viſc. coryl. āā ℥ j. M. F. P.)

* * *

Clauderi (Gabr.) D. de cinnabari nativa hungarica. Jenae 1684. 4. pag. 17.

Frauendorfer (Ph.) Tabula ſmaragdina. Norimberg. 1699. p. 234.

Kovacs Tatai l. c. p. 116. (laudat.)

Mort (le) Aqua antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 58.

(℞. Fol. et Flor. Lavend. Roriſm. Majoran. Salv. āā mpl. ij. Caſtor. ℥ ij. Camph. ʒ iij. Sp. Vin. ℔ iij. Sal. arm. ℥ iv. Tartar ℥ iij. Aqu. Lavend. qu. ſ. ut innat. poſſ. deſt. poſt digeſt. XIV. d. donec prodierit ℔ j ß. adde Ol. Rut. gtt. xxx. Succin. gtt. xx. Macis. Junip. āā gtt. xj.)

Moſchus arte factus.

Reineck (G. G.) D. de moſcho naturali et arte facto. Jenae 1784. 4. pag. 46.

Moſchus moſchiferus. (Humor ſpiſſus in folliculo umbilicali.)

Ackermann, in not. ad verſ. german. Tiſſot. l. c. p. 310. not. 66. (moſchum in epilepſia infantum a dentitione laudat.)

Ball Anweiſung z. mediz. Praxis. Frankf. u. Leipzig 1763. 8. p. 31.

Chi-

Chiliani (B.), praeſ. G. Moebio, D. de epilepſia. Jenae 1659.

Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzn. T. III. p. 128. (moſchum probum in non exigua doſi efficacem eſſe in epilepſia.)

Fabri (J. Petr.) Anatom. univerſ. L. III. c. 15. (laudat.)

Feurſtein (J. H.) Diſſ. cit. p. 73.

Galeati Inſtitut. Bononienſ. T. III. (non juvaſſe.)

Hannes (Ch. R.) de moſchi virtute antepileptica in proprio filio experta, in N. A. N. C. Vol. V. obſ. 63. p. 244.

Hemman (F. A.) mediz. chirurg. Auffätze. Berlin 1778. p. 208. (aqua moſcho impraegnata venis felici cum ſucceſſu injecta. vid. Infuſoria chirurgia.)

Hofmann (Caſp.) Comm. in Schroeder. Pharmacop. c. 26.

Hofmann (Fr.) Medic. rat. ſyſt. T. III. p. 25. Suppl. p. 59. 60. T. IV. p. 531.

Maſſa, in Journal etranger. Juillet. 1760. p. 235.

— — Gazette ſalutaire. 1761. (mulieri poſt febr. intermitt. quotidie epilepticis paroxyſmis vexatae matutino tempore dedit bolum e Moſchi gr. x. Øtr. antimon. gr. xx. et Extr. Chamom confectum addito inſuper infuſo theiformi. Jam prima doſis paroxyſmum mitigavit, ſecunda plane profligavit. Sudor inodorus. Urina et excrementa alvina moſchi odorem per aliquot dies retinebant.)

Maurer (F. G.) Comm. de medicam. antepil. p. 25. (plurium laudes enarrat.)

Michaelis (Chr. Fr.) mediz. pract. Bibl. B. I. St. 3.

Mönch (Fr.) Mater. medic. Artic. Moſch. (in adultis a gr. iv — xxiv. ſenſim augendo eſſe propinandum.)

Pharmacop. Helvetica. Baſil. 1771. (in camphorae connubio interdum juvaſſe.)

Quarin animadv. pract. p. 27. (laudat ad ſuperandum ſtuporem a frequentioribus paroxyſmis progenitum.)

Reineke (G. G.) D. de moſcho naturali et arte facto. Jenae 1784.

Rolfink (Guern.) Chim. in art. form. redact. Lib. V. Sect. 5.

Swieten (Ger. v.) Comment. T. III. p. 473.

Thouvenel Mémoire ſur les principes et vertus medicamenteuſes des ſubſtances animales. à Bourdeaux 1779. p. 352. (epilepſiam

a terrore eandemque a ſcabie retrogreſſa moſcho largiter propinato eſſe ſanatam.)

Tiſſot l. c. p. 305. ſqu. (multum ex ejus uſu ſperat in epilepſia, abſente plethora, ſanguinis congeſtione ad caput, primarumque viarum impuritate obſtructionibusque carentibus.)

Unzer (Matth.) ἱερονοσολογ. L. II. c. 11. (laudat.)

Moxa.

Brunner (Jo. Conr.), vid. Wepfer. Hiſtor. cicut. aquat. p. 97. (nuchae applicata epilepſiam ſanavit.)

Kaempfer Amoenitat. exotic. p. 595. (Nigritae et Sinenſes in epilepſia optimo cum emolumento totam ſuturam coronalem longa et ampla ſtupa adurunt.)

Naudau, in Journal de Medecine. T. LXXV. (Cylindri ardentes capiti.)

Pouteau Oeuvres poſthumes. T. II. p. 55. (Capiti applicanda. Tutior ferro ignito.)

Rhyne (ten) Diſſ. de Arthritide. London. 1683. 8. p. 108. 116. (Sinenſes eam in epilepſia capiti applicare et poſtea locum uſtum aqua ſalita lavare ſolent.)

Muſcus pyxidatus, v. *Lichen cocciferus.*

Muſica.

Quarin (Joſ.) Animadverſ. pract. p. 28. (Epilepſia ab animi pathematibus excitata per concentus muſicos fortuito appropinquante paroxyſmo auditos ſanata.)

Mus Muſculus (calcinatus).

Reusner (Hieron.) Obſervat. medic. obſ. 13. et 152.

Muſtela vulgaris.

Sanguis.

Augenii (Horat.) Epiſtol. et Conſult. medic. Francofurt. ad Moen. 1604. L. VIII. Epiſt. II. (laudat.)

Camerar. (Jo.) Syll. memorab. medic. Cent. XVI. partic. 39.

Galen. Compoſ. ſec. loc. L. III. (Archigenem jam laudaſſe. Et ipſe commendat.)

Spina dorſi.

Hartmann (Jo.) Praxis chymiatr. p. 19. (leniter pulveriſata.)

Myn-

Mynſichti Aqua antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 65.

(℞. Rad. Paeon. debite collect. ℥ ij. Ariſtoloch. rot. Diptamn. alb. Angelic. āā ℥ j ß. Viſc. quern. Sterc. pavon. Squill. praep. Anacard. āā ℥ j. Sem. Paeon. mar. Coriandr. praep. Carv. Foenic. āā ʒ vj. Secundin. exſiccat. in qua maſculus fuit. Caſtor. ver. āā ℥ ß. Herb Card. Bened. Millef. Rutae Sylveſtr. Salviae acut. Rorism. āā ʒ ij. Inciſa et contuſa infundantur in Vin. Malvat. ℔ xij. Diger. in loc. calid. p. octid. vaſe quotidie multoties commoto; poſtea p. alemb. deſtill. et liquori deſtillato a novo impone: Fl. Paeon. mar. Lilior convall. āā ℥ iv. Betonic. Tiliae, Lavend. Meliſſ. Borrag. Bugloſſ. āā ℥ j ß. Nuc. Moſch. Cubeb. Macis, Cinnam. acut. Piper. long. Caryophyll. āā ℥ j. M. et igne lentiſſimo ſecunda vice in B. Mariae deſtilla.)

Mynſichti Balſamum polychreſtum.

Spina (D. de) l. c. p. 176.

Mynſichti Claretum antepilepticum laxativum.

Spina (D. de) l. c. p. 220.

(℞. Fol. Senn. elect. ℥ ij. Turbith. alb. Gumm. Mechoacann. āā ℥ ß. Raſur. Corn. Alc. Cran. human. Nuc. Moſchat. āā ʒ ij. Rad. et Sem. Paeon. debite collect. Viſc. quern. āā ʒ ß. Cardam. min. Caſſiae lign. Caryophyll. āā ʒ j. Flor. Paeon. mar. Lilior. convall. Lavendul. Tiliae āā ʒ ß. Macerentur in Vin. rhenan. ℥ xxxvj. Stent in infuſione loco in calido p. biduum; Coquantur poſtea parum et additis Sacchari albiſſ. ʒ iij. clarificentur per manicam Hippocr. et F. Claretum.)

Mynſichti Elixir Paeoniae antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 364.

(℞. Rad. Palm. Chriſti. Angelic. Pyrethr. āa ℥ j. Viſc. quern. Sem. Foenic. Anacard. āa ʒ vj. Flor. Rorismar. Stoechad. arab. Lavend. āā ʒ iij. Raſur. Corn. alc. Cran. hum. Caſtor. ver. āā ʒ j ß. Majoran. ſicc. Mpl. j. Spirit. Vin. rectificatiſſ. ℔ ij. Inciſa et contuſa infundantur in vaſe vitreo bene tecto, in loco tepido, per XIV. dies, poſtea p. alemb. deſtilla et liquori deſtillato

Bb adde:

addc: Rad. Flor. et Sem. Paeon. debite collect. āā ℥j. Spec. diamoſch. dulc. Dyaxylo aloes āā ℥ß. Miſc. et diger. in leni calore per menſem ſaepius agitando; poſtea Spiritum Vini unctum aufer per inclinationem et ad medietatem ſaltem abstrahe; reliquum maneat cum eſſentia extracta, cujus recipe ℥xij. Spirit. Vitriol. diligent. rectific. et a Cinnab. nativ. prius ſpagyrice impraegnat. ℥iij. Sal. Paeon. ʒjß. Sic ſimul mixtum per octiduum circul. et diger. F. Elixir, in epil. curanda ſua facultate omnia alia remedia ſuperans.)

Mynſichti Emplaſtrum antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 396.

(℞. Ol. Caſtor. Rut. Ireoſ. āā ℥j. Rad. et Sem. Paeon. Pyrethr. āā ʒj. Viſc. quern. Squill. praep. Corn. Alc. Cran. human. āā. ſpagyrice calcinatorum ℈ij. Thur. elect. Maſtich. Ladan. Galban. Opopanac. āā ʒß. Flor. Lavend. Stoechad. arab. Spic. indic. āā Pgl. j. Ol. Still. Rorism. Hyſſop. Nuc. Moſch. expr. āā ℈j. Reſin. et Cerae qu. ſ. āā. F. Emplaſtr. ut eſt artis. In epilepſia etc. ſuturae coronali applicatum praeclarum praeſtare auxilium et ſpecifica vi contra illam virtuoſiſſime pugnare.)

Mynſichti Enema antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 462.

(℞. Sem. Cartham. ℥j. Agaric. opt. ℥ß. Pulp. Colocynth. ʒiij. Herb. Centaur. min. Lavend. Majoran. Hyſſop. Beton. Rutae hort. āā ʒij. Caſtor. ver. Flor. Convall. Anthos. āā ʒjß. Coqu. et ℞. Colatur. ℔j. Ol. Chamom. ℥iij. Mell. roſat. ℥ij. Acid. Tartar. Sal. Gemm. āā ℥j. Miſc. pro Enemate.)

Mynſichti Pilulae polychreſtae.

Spina (D. de) l. c. p. 731. (in epil. quoque laudantur.)

Mynſichti Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 762.

(℞. Cranii hominis ſtrangulati et ſine igne calcinati ℥j. Viſc. quern. Cinnab. factit. Ungul. Alc. āā ℥ß. Miſce et fiat pulvis, cujus ℈ß. pueris ſtatim poſt paroxyſmum datur, adultis vero ℈j. iteratusque certiſſime liberat.)

Myn-

Mynſichti Sal antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 83r.

(℞. Rad. Palm. Chriſt. ℔ ij. Angel. Paeon. Pyrethr. āā ℳ j. Sem. Paeon. Scob. lign. cupr. Viſc. quern. āā ℔ ß. Herb. pentaphyll. Millefol. Rut. hortenſ. Verbaſc. Lavend. Roriſmar. Morſus gallin. āā ℥ iv. Flor. Prim. ver. Stoech. arab. Tiliae. Paeon. Sambuc. āā ℥ ij. Mixta calcin. in reverb. poſtea adde Ciner. Picar. jun. Hirund. Stercor. Pavon. āā ℥ j. et c. liqu. appropr. F. leg. artis Sal cryſtall. alb.)

Mynſichti Suffimentum antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 899.

(℞. Succin. alb. ℨ xj. Myrrh. rubr. Maſtych. elect. Gummi. anim. Galban. Elem. āā ℨ ij. Viſc. quern. Sem. Paeon. excort. Bacc. Junip. Raſur. Corn. Alc. āā ℨ j. Abſynth. Majoran. Flor. Lavend. Lilior. convall. Roſar. rubr. āā ℨ ß. Miſc. et c. Infuſione Tragacanth. facta in aqu. antepil. noſtr. f. l. a. Trochiſci pro ſuffitu. Fumus hic ſupra carbones naribus epileptici admotus, paroxyſmum ipſe ſedat.)

Mynſichti Suppoſitorium in epilepſia applicandum.

Spina (D. de) l. c. p. 904.

(℞. Trochiſc. Alhandal. Agaric. trochiſcat. āā ℨ j. Hellebor. nigr. Fol. Senn. āā ℨ ß. Sal. Gemm. Nitr. āā ℈ j. Mell. qu. ſ. Fiant ſuppoſitoria duo groſſa et oblonga, ut eſt moris.)

Myrepſi (Nicol.) Hiera logadii.

Spina (D. de) l. c. p. 320. (epilepticis quoque convenire.)

Myrrhae Gummi.

Polyſii (Gothofr. Sam.) Myrrhologia. p. 129. v. E. N. C. Dec. II, Ann. VI. Append. Norimberg. 1688. 4.

N.

Naphta Vitrioli, v. *Vitriolum.*

Narciſſus . . . . (▽ et Oleum.)

Laurembergii (Guil.) Apparat. plantar. Lib. I. cap. 18.

Narciſſus Pſeudonarciſſus. (Extractum.)

Freſnoy (du) des proprietés du Narciſſe des Près. à Paris 1778. v. Hufeland N. Annal. B. I. p. 366.

Nepenthe Quercetani, v. *Quercetan.*

Nicolai Florentini Electuarium antepilepticum.

Kovacs Tatai l. c. p. 129. (Sequentem formulam tradit:

℞. Herbae, quae vocatur, Sancti Pauli, Herb. paralyticae āā. qu. vis. Incidantur minutim et miſceantur c. Melle qu. ſ. addaturque Pulv. Caryophyll. Pyrethr. Rad. Paeon. āā. qu. ſuff. Solo hujus electuarii uſu Nicolaum Florentinum feminam XL. annorum jam ab infantia epilepticam ſanaſſe.)

Nicolas Liquor lotharingicus.

Beaumes l. c. p. 348. (laudat.)

Nicolas Leçons publiques de Chymie. Tom. II. à Nancy 1787. p. 270. (*Formula*: Alcal. volat. liquid. et concreti c. Cornu Cervi ppti. ℥ vj. Saturentur c. ſuffic. quantitate acidi phosphorei. In ipſo illo liquore infundatur Caſtorei ʒ j. et Cort. Citr. recent. ʒ ij. poſt horas XXIV. trajiciatur liquor per pannum, coletur, et in lagena vitrea probe obturata aſſervetur uſui.

Mane jejuno ſtomacho ſumatur Cochl. j. parvum et ſuperbibatur Aqu. flor. Tiliae. Doſis repetatur tempore veſpertino. Valde laudat hocce remedium in epilepſia, caeteriſque morbis convulſivis, oleoque animali Dippelii longe praefert.)

Nicotiana Tabacum. (Herba.)

Sennert (Dan.) Inſtitution. medicae c. Paralipomenis. Viteberg. 1667. 4. Paralip. 13. ad L. I. (epilepſia Syrupo Nicotianae ſanata.)

Zacut. Luſitan. Prax. admir. Lib. I. obſ. 23. (epil. Syrupo Nicotianae ſanata.)

— — — obſ. 24. (epilepſ. a ſaburra vomitorio e Nicotiana curata.)

Nitri Spiritus dulcis.

Hofmann (Fr.) Medicina ration. ſyſtemat. T. IV. P. I. p. 20. (in inſultu epileptico a gtt. XL — CXX. eſſe proficuum.)

O.

Olea europaea. (Oleum Olivarum.)

Anonymus, in Reichsanzeiger 1796. p. 6201. (cum ſaccharo canarienſi mixtum commendat.)

Oleum Agathi, v. *Agathum.*

— — *animale Dippelii*, v. *Dippel.*

— — *Aniſi*, v. *Pimpinella Aniſum.*

— — *antepilepticum expreſſum.*

Spina (D. de) l. c. p. 668.

(℞. Nucleor. Perſicor. excort. ℔ ß. Ceraſor. ℥ ij ß. Sem. Paeon. excort. ℥ ij. Bardanae major. Baſilici āā ℥ j. Cubebar. Caryophyll. āā ʒ vj. Ex contuſ. et mixtis invicem exprimatur oleum lege artis quod praeſtat in epilepſia etc. non ſolum inunctione externa temporum, verticis et nuchae, verum etiam ab intra receptum.)

— — *Anthos*, v. *Rosmarinus officinalis.*

— — *Antimonii*, v. *Antimonium.*

— — *Cajeput*, v. *Melaleuca Leucadendron.*

— — *Camphorae*, v. *Laurus Camphora.*

— — *Caſtorei*, v. *Caſtor Fiber.*

— — *Cinnamomi*, v. *Laurus Cinnamomum.*

— — *Cranii Humani*, v. *Homo.*

— — *Epilepticum.*

Spina (D. de) l. c. p. 634.

(℞. Rad. Ariſtoloch. long. rec. mund. ℥ j. Caſtor. Euphorb. āā ʒ j. Ol. olivar. ℥ iv. — Rad. Ariſtol. inciſ. prius cum ol. oliv. coque et demum reliqua addenda invicem mixta tecta operculo coque et demum linteum cola.)

— — *Foeniculi*, v. *Anethum Foeniculum.*

— — *Hederae*, v. *Glecoma hederacea.*

— — *Heraclinum.*

Heers (Henr. ab) Obſervat. medic. p. 177. (Sequentem formulam in epilepſia valde laudans tradit:

℞. Vitriol. vener. ſ. Virid. aeris calcinat. ℔ j ß. Cran. human. Ungul.

gul. Alc. āā ℥ ij. Viſc. quern. Sem. Paeon. mar. āā ℥ j. c. Spirit. Vin. rectificatiſſimi ℔ ij. digere in retorta et deſtilla.)

Kovacs Tatai l. c. p. 123. (laudat.)

Rulandi (Mart.) Curat. empiricar. Centur. X. Lugdun. 1628. 8. Cent. II. curat. 6. 99. Cent. III. curat. 61. (laudat.)

Oleum Lavendulae, v. *Lavendula Spica*.

— — *Majoranae*, v. *Origanum Majorana*.

— — *Mercurii per ſe*, v. *Mercurius*.

— — *Narciſſi*, v. *Narciſſus* ....

— — *Philoſophorum*.

Medicina experiment. Dygbaean. T. II. p. 335. (formulam et laudes habet.)

— — *Pulegii*, v. *Mentha Pulegium*.

— — *Salis Veneris*, v. *Vitriolum caeruleum*.

— — *Succini*, v. *Succinum*.

— — *Vitrioli dulce*, v. *Vitriolum*.

Opium, v. *Papaver ſomniferum*.

Orchis maſcula. (Radix.)

Murray (Jo. Andr.) Apparat. medicam. Vol. V. p. 289. (apud gentes orientales in epilepſia laudari.)

Oreilly (de) (Medici Toeplitzenſis) Arcanum antepilepticum.

Salzburg. mediz. chirurg. Zeit. 1791. T. I. p. 46. (ejus mentionem facit. Pretium XL. floren. imperial.)

Origanum Majorana.

Oleum.

Ledel (Sam.), in E. N. C. Dec. III. Ann. IX. X. obſ. 32. (infantibus epilepticis proficuum eſſe.)

Medicina experim. Dygbaean. T. II. p. 321.

Pulvis Herbae.

Fonſeca (Roder. de) de tuenda valetudine et producenda vita. Florentiae 1602. 4. (laudat in epil. a gr. xx — ℨ ß. c. Julap. flor. Aurant. omni mane jejuno ſtomacho.)

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1309. (Dioſcoridem jam laudaſſe decoctum in epilepſia.)

Oris extenſio. cfr. Pibrac.

Gazette ſalutaire. 1761. n. 45. (ope nummi metallici ſufficientis magnitudinis os ita eſſe diſtendendum, ne maxillae ſeſe per quoddam temporis ſpatium attingere poſſint.)

Oſſa.

Detharding (G. C.), reſp. G. W. Balke, D. de oſſium uſu medico. Buetzowiae 1780. 4. p. 9.

Aqua ex oſſibus deſtillata.

Quercetani (Joſ.) Pharmacop. dogmat. reſtitut. Gieſſae 1607. 8.

Extractum oſſium antepilepticum.

Cardilucii (Jo. Hisk.) Officina ſanitatis. p. 67.

Tragea oſſium antepileptica.

Cardilucius l. c. p. 67.

Ova Corvi, v. *Corvus Corax.*

Ova Coturnicis, v. *Tetrao Coturnix.*

Oxycratum.

Galen. Conſil. pro puero epilept. ed. Charter. Opp. T. X. cap. 4.

Riverii (Lazar.) Obſervat. medic. et Curation. inſign. Centur. IVta. Hagae 1659. 8. obſ. 10. (ejus quotidiano uſu epilepſiam eſſe profligatam.)

Oxymel ſquilliticum, v. *Scilla maritima.*

P.

Pachii Hiera, ſ. *Electuarium Diacolocynthidos.*

Spina (D. de) l. c. p. 320. (epilepticis quoque conducere.)

Paeonia officinalis.

Flores.

Tiſſot l. c. p. 299. (ob odorem venenatum ei ſuſpectae videntur.)

Willis (Th.) Patholog. cerebr. C. III. p. 30. (et flores pulveri radicis addere ſuadet.) v. Praeparata e paeonia.

Radix (praeſertim maris).

Externe qua Amuletum (collo appenſum).

Apollonii Menabeni Tr. de Alce. Cap. 7.

Came-

Camerar. (Jo.) Syllog. memorab. Cent. III. partic. 30. 31.
— — — — Cent. VI. partic. 93.
Coſtaei (Jo.) L. de natura ſtirpium. fol. 82.
Fernel de abdit. rerum cauſis, L. II. cap. 17. p. 133.
Foreſt. (P.) Obſervat. medic. Lib. X. obſ. 61.
Galen. de ſimplic. medic. Lib. VI.
Lemnii (Levin.) de occult. natur. miracul. L. II. cap. 2.
Schenk (Jo.) Obſervat. medic. Lib. I.
Storch (Jo.) von d. Kinderkrankheiten. B. II. p. 115. (filo affixa et pone aegrotum cubiculo impoſita.)
Willis (Th.) Patholog. cerebr. Cap. III. p. 30. (taleolis et bracteolis radicis recentis filo affixis totum collum circumdare et, ut primum exaruerint, novas ſubſtituere jubet. Memorat quoque amuleti ficci.)
Zacut. Luſitan. de medic. princip. hiſtor. Lib. I. hiſt. 22.

Interne.

Pulvis Radicis.

Appel (J. J.) Diſcurſ. de epilepſia. Altenburg. 1713. 8. p. 39. (radicem die paraſceve aurei aut argentei inſtrumenti ope effodendam valde laudat.)
Berger (Sim.) Bericht von wunderbarlicher Kraft der Paeonienwurzel wider das Vergicht. Frankfurt 1599. 8.
Borelli (Jo.) Obſervat. medic. Cent. I. obſ. 18.
Foreſt. (Petr.) Obſervat. medic. Lib. X. obſ. 59.
Friderici (Jo. Arn.) D. de paeonia. Jenae 1670.
Haller. Hiſtor. ſtirp. helvet. p. 1187. (inertiae ejus teſtimonium a Boerhavio.)
Herrmann (Paul.) Cynoſur. mater. medic. Argentor. 1726. 4. p. 176. ſqu. (inefficacem eſſe.)
Home Clinical experiments etc. edit. 2. p. 209. (bina epilepticorum exempla, in quorum uno quater de die ʒ ſſ. eo ſucceſſu data, ut inſultus per aliquot dies pauciores inde fierent, ſed ſubſequentibus frequentibus octavo die; in altero autem fruſtra radix eodem modo per dies XI. ſubminiſtrata eſt.)
Kovács Tatai l. c. (paſſim.)

Ludo-

Ludovici Pharmac. modern. p. 494. (Saepius fallere exſpectationem.)

Moor (Barthol. de) Pathologiae cerebri delineatio practica. Amſterdam. 1704. 4. (non multum ab ea ſperat.)

Paracelſi (Theophr.) Paragran. L. p. 209. (ex obſervatis viribus Paeoniae epilepſiae originem et ſymptomata declarare ſtudet.)

Riverii (Lazar.) Arcana c. Bernard. Chriſtin. a Juvellina inſtitutionibus. Venetiae 1676. 4. (efficaciae exemplum.)

Schacht (Jo. Ooſterdyk) Inſtitution. medic. pract. Traject. ad Rhenum 1767. 4. p. 64. (efficaciſſimis remediis antepil. annumerat.)

Schenk (Jo.) Obſervat. medic. L. I. obſ. 227.

Sylvatic. (Bened.) Conſil. et reſponſ. medica. Cent. IV. Patav. 1656. fol. (laudat cum Tinctura picarum.)

Sylvii (de la Boe) Oper. medic. p. 427. (nihil praeſtitiſſe.)

Tiſſot l. c. p. 299. (inefficax ei videtur et plane negligenda.)

Vogel Hiſtoria Materiae medicae. p. 206. (Brendelium quoque eam laudaſſe adeo ſiccam.)

Willis (Thom.) Pathol. cerebr. Cap. III. p. 30. (laudat a ℨj—iij. bis de die.)

Succus Radicis.

Murray (Andr.) Appar. Medicam. T. III. p. 40. (plurimum ex eo ſperandum eſſe putat.)

Willis (Thom.) Pathol. Cerebr. C. III. p. 39. (cum vino hiſpanico contuſae radicis ſuccum ſaccharo dulcefactum laudat.)

Semen.

Eraſti (Th.) Diſputat. IV. p. 140.

Foreſt. (Petr.) Obſervat. medic. Lib. X. obſ. 59.

Lemnii (Levin.) de miracul. et occult. naturae. Francof. 1590. 12. Lib. II. c. III. p. 146.

Quercetani (Joſ.) Tetras. p. 157. (Paeoniam capiti aequare et foliorum rubrorum faſciculum in capſula alba fulgorem repraeſentare, ex quo epilepſiae ſymptomata declaranda. Ideoque hujus plantae ſemina tam egregium contra epilepſiam effectum praeſtare.)

Sylvii (de la Boe) Opera medic. p. 427.

Willis (Thom.) Patholog. cerebr. Cap. III. p. 30. (et pulveri radicis addere ſuadet.)

Praeparata e Paeonia olim in epilepſia uſitata.

Aqua Paeoniae.

Pharmacop. Wirtemberg. 1741. p. 7.
Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1372.

Conſerva Florum Paeoniae.

Pharmacop. Wirtemberg. p. 39.
Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1372.

Conſerva Radicis Paeoniae.

Horſtii (J. D.) Pharmacop. cathol. P. II. Lib. X. (laudat.)

Decoctum vinoſum cum Caſtoreo qua Balneum.

Reusner (Hier.) Obſervat. medic. obſ. 12.
Schroeder l. c. p. 1371.
Strobelberger de morbis pueror. cap. 1.

Elixir Paeoniae Mynſichti, v. Mynſicht.

Emulſio Seminum Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Extractum diapaeon.

Schroeder l. c. p. 413.

Fecula Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Mel Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Oleum deſtillatum Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Sal Paeoniae.

Schroeder l. c. p. 1372.

Spiritus Paeoniae.

Purmanni (Matth. Godofr.) Chirurgia curioſa. Francofurt. 1694. 4. (Feminae epilepticae ſpiritum Paeoniae in venas injecit eamque ſanavit.)

Syrupus Paeoniae.

Pharmacop. Wirtemberg. p. 216. (e ſucco recenti florum.)

Schroe-

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1372.

Syrupus Paeoniae Zwölferi, v. *Zwölfer*.

(NB. Intrat praeterea Paeonia omnes fere veterum compoſitiones antepilepticas.)

Panacea Anwaldina, v. *Anwald*.

Papaver Rhoeas. (Extractum e capitulis et herba paratum.)

Murray (Jo. Andr.) Apparat. medicam. T. II. p. 213. (Foucquet, [Medicus Monspelienſis] hocce extractum opio praefert eoque a gr. vj — xviij. epilepſiam compeſcuit teſtante Adolpho Murray.)

Papaver ſomniferum. (Opium purum. Extractum thebaicum. Laudan. liquid. Sydenh. Tinctura thebaica.)

Aaskow, in Act. Havnienſ. T. II. p. 17. (epilepſiam communicativam opio et aſa foetida mitigavit.)

Ackermann, in not. ad Verſion. german. Tiſſot. l. c. n. 65. (Indicationes opium propinandi nondum ſatis eſſe determinatas. Nunquam ſatisfeciſſe in totius ſyſtematis nervorum commotione.)

— — — n. 66. (In epilepſia infantum a dentitione non multum ab opio ſperat, plura a moſcho.)

Aetii Tetrabibl. IV. Serm. I. cap. 96. (jam opium laudat et ſpecificis antepilepticis annumerat.)

A. N. C. Dec. III. Ann. III. obſ. 64. (epilepticis eſſe noxium.)

Cullen (W.) Anfangsgründe der pract. Arzneiw. Th. III. p. 188. (Opium in epilepſia a plethora nunquam exhibendum.)

— — — Treatiſe of Mater. medic. Vol. II. p. 247. (ubi ab irritatione quadam naſcitur epilepſia regularesque acceſſiones habet, conferre opium, ut in aura epileptica ſummopere.)

Feurſtein (J. H.) Diſſ. citat. p. 60 et 77.

Fothergill (Jo.) Medical obſervat. and Inquir. Vol. VI. p. 80. (in epil. a pathemate commendat.)

Haen (A. de) Ratio medend. P. V. ed. ſecund. p. 117. (epil. triennis ex terrore nata et quotidie fere erumpens ejus uſu ſanata.)

Hornung (Jo.) Ciſta medica. Norimb. 1625. 4. p. 89.

Millars (Fr. Xav.) D. de medicam. antepil. Argent. 1787. p. 37.

Morgagni (Jo. Bapt.) Epiſtol. anat. med. L. IX. ep. 6. 7.

Murray (Jo. Andr.) Appar. medicam. T. II. p. 272. (multum promittere in epil. a ſenſibilitate et mobilitate nimia vel ab animi pathemate orta.)

Panzani, in Giornale di Medicina. Vol. XIII. Venet. 1776. (in epil. cum mentis alienatione gr. iv. cum levamine propinata.)

Quarin (Joſ.) Animadverſ. practic. p. 20. (in epilepſiae aeſtu propinatum non modo nihil levaminis adtulit, ſed quoque ſoporem apoplecticum induxit.)

Quercetanus, v. Quercetani Nepenthe.

Rehfeld (C. F.) Progr. (ad Diſſert. meam inaug.) ſiſt. hiſtoriam morbi cataleptico - epileptici opio potiſſimum ſanati. Gryphiae 1788. 4.

Scardona (Jo. Fr.) Aphoriſm. de cognoſcend. et curand. morbis. Lib. I. cap. 8. §. 14. (in epil. cum viſus tempore paroxyſmi obnubilatione adhibuit. Viſus hebetior inde factus, paroxyſmus quidem ſerior accedit, ita autem fortior evadit, ut vitae periculum inſiſteret.)

Sennert (Dan.) Medicin. pract. Tom. I. p. 370. (in camphorae connubio ad praecavendum paroxyſmum commendat.)

Spindler (Paul.) Obſervat. medic. Centur. edit. Car. Raiger. Francofurt. 1691. 4. obſ. 5. (eo peractae ſanationis exemplum.)

Tiſſot l. c. p. 307—317. (p. 307. Puellae e moerore epilepticae Laudani liquidi gtt. xxx. omni trihorio cum levamine dediſſe.

p. 309. ad avertendos paroxyſmos, per animi pathemata facile excitandos, commendandum felicique ſucceſſu Laudan. liquid. gtt. xv. dediſſe.

p. 310. cum fructu in epil. infantum a dentitione dediſſe.)

Tralles (B. L.) de uſu opii. Vratislav. 1760. 4. p. 16. (In epil. haereditaria et connata minus conferre. In epil. cujus cauſa in capite externo aut interno latet, ejus effectum eſſe imparem. In epil. ab interceptione evacuationis ſanguineae aut ſeroſae nihil efficere. In epil. a violenta totius ſyſtematis nervoſi irritatione et commotione maximae frugis. Nil valere in epil. cujus cauſa in externis partibus haeret.)

Whytt

Whytt (Rob.) Works. p. 680. (Largior doſis [gtt. xl.] Laud. liqu. Sydenh. epileptico ſubvenire non valuit.)

Paracelſi Spiritus antepilepticus.

Schreger (B. N. G.) kritiſch. Diſpenſ. p. 216. (Phlegma Vitriol. Spirit. Vin. rectif. Theriacam et Camphoram continet.)

Paracenteſis.

Schenk (Jo.) Obſervat. Lib. I. obſ. 232. (ex Paraeo.)

Paris quadrifolia. (Baccae.)

Blochwitz. (Mart.) Anatomia Sambuci. Lipſiae 1631. 12. p. 62.

Kovacs Tatai l. c. p. 124. (Baccarum n. v — ix. pulveriſat. et cum aqua flor. Lil. convall. vel Liquor. Tiliae propinat. laudat.)

Schroeder. Pharmacop. univerſal. p. 1356.

Pavo criſtatus. (*Stercus.*)

Borelli (Jo.) Obſervat. Cent. III. obſ. 15. (eo ſanatae epil. exemplum. ℥j. cum vino, luna ſilente, propinata.)

Kóvács Tatai l. c. p. 118.

Macaſii (Jo. Georg.) Prompt. mater. medic. p. 38.

Medicina experim. Dygbaean. T. II. p. 8.

Paulini (Chr. Fr.) Dreckapotheke. Sect. I. cap. 10. p. 20.

Scholzii (Laur.) Conſil. medic. Francof. 1598. fol. Conſil. 42.

Schroeder l. c. p. 1784.

Spiritus e ſtercore pavonis.

Schroeder l. c. p. 562.

Syrupus e ſtercore pavonis.

Spina (D. de) l. c. p. 941.

Peregrinatio.

Hippocratis Aphoriſm. L. II. aphor. 47.

Hofmann (Fr.), reſp. G. Th. Barthold, D. de peregrinationibus ſanitatis cauſa inſtituendis. Halae 1701. 4. p. 22.

Swieten (Ger. van) Comment. T. III. p. 436. (Plures epileptici Hollandia in Indiam orientalem profecti ibique commorantes ab epilepticis acceſſionibus liberi fuerunt. Redeuntes alteri denuo ab iis vexati, alteri autem plane ab iis liberati.)

Petri Tinctura antepileptica.

Hannes (L.) Epiſt. de puero epilept. p. 47. (cum ſucceſſu dedit.)

Schre-

Schreger's (B. N. G.) kritiſch. Diſpenſat. p. 141. (Sequentem formulam tradit:
℞. Granor. Kermes. ℥j ß. Spirit. Vin. rectificatiſſ. ℥x. Digere et poſt filtrationem in hac tinctura ſolve Camphorae ℥j ß. Doſis pro adulto gtt. XL.)

Petroleum

Dioscorides l. c. Lib. I. cap. 85.

Gmelin (Jo. Fr.) Appar. Medicam. Vol. I. p. 155. (Si unquam aliquid praeſtitit, in epilepſia verminoſa fuiſſe judicat.)

Ramazzini (B.) Oper. omn. Genevae 1717. 4. p. 339.

Wedel (G. W.) D. de epilepſia. Jenae 1676. 4.

Phoca Monachus. (Hancce ſpeciem eſſe veterum phocam, docet N. G. Leske, in Anſangsgr. der Naturg. Th. I. p. 166.

Coagulum. (πύτια φώκης.)

Serapion, v. Cael. Aurelian. Chronic. Lib. I. cap. 4. (contra epilepſiam commendaſſe.)

Phoenix dactilifera (Fructus.)

Beaumes l. c. p. 31. (Boerhavium in epilepſia a nimia irritabilitate et ſenſibilitate viſco fere ſemper pulverem dactylorum addidiſſe. Beaumes eum quoque commendat, propria experientia de ejus utilitate certior factus.)

Phosphorus Urinae.

Feurſtein (J. H.) Diſſ. cit. p. 80.

Haartmann (Jo.), reſp. E. Elfwenberg, D. de noxio phosphori urinae in medicina uſu. Aboae 1773. (Quatuor epilepticis incaſſum eſſe propinatum et ſaepius vomitum excitaſſe.)

Kramer, in Comm. litter. Noric. 1733. p. 137. (commendat.)

Quarin. (Joſ.) Animadv. pract. p. 23. (a gr. j — iij. ter quaterve in die vel in liquido congruo ſolutus vel in conſerva.)

Weikard (M. A.) vermiſchte Schriften. St. IV. p. 105. (anceps eſſe remedium.)

Phyſalis Alkekengi. (Fructuum Quinta eſſentia.)

Medicina experiment. Dygbaean. T. II. p. 147. (Formula; laudatur pro doſi ℈j.)

Pibrae

Pibrac Ligatura Linguae.

Greding (J. E.) ſämmtl. medic. Schrift. Th. I. p. 241. (optimum ejus effectum ad leniendum paroxyſmum, nec non ad ſanandam linguam dentibus in paroxyſmo laeſam affirmat.)

Pibrac, in Mémoires de Chirurgie. T. III.

Picarum Aqua, v. *Corvus Pica.*

Pilulae Alterantes Plumeri, v. *Antimonium.*

Pilulae Antepilepticae Cloſſaei, v. *Cloſſ.*

— — — *Gmelini,* v. *Gmelin.*

— — — *Hofmanni,* v. *Hofmann.*

— — — *praeſervativae Hofmanni,* v. *Hofmann.*

— — — *Struvii,* v. *Struv.*

Pilulae balſamicae Stablii, v. *Stabl.*

— — *catharticae Troghieri,* v. *Troghier.*

— — *polychreſtae Mynſichti,* v. *Mynſicht.*

Pimpinella Aniſum.

Plinii Hiſtor. natur. L. XX. cap. 17. (Pythagoram putaſſe, plantam in manu detentam eſſe antidotum epilepſiae.)

Oleum.

Kaempf (Jo.) Enchirid. medic. p. 27.

Medicina experiment. Digbaean. T. II. p. 316.

Plumbago europaea. (Radix.)

Kovacs Tatai l. c. p. 124.

Plumbum.

Acetum ex alembico plumbeo deſtillatum.

Majerne (Theod. de) Prax. medic. p. 46.

Calx Saturni.

Tode (Jo. Clem.) medicin. Journal. B. I. St. 3. Kopenhagen 1794. (Ewald dedit epileptico cuidam absque ſucceſſu gr. CLXXX. Inde ſalivatio.)

Saccharum Saturni.

Agricola (Jo.) Commentar. et Obſervation. in Jo. Poppii chymiſche Medicin. Lipſiae 1638. 4. p. 223. (in epilepſia infantum laudat.)

Jacob-

Jacobſon, v. Act. Societ. med. Havnienſ. T. III. Havniae 1792. p. 345. (in epil. ſaccharum Saturni propinavit a gr. $\frac{1}{4}$ — gr. ß. cum conch. praepar. ℈j. ſenſim ad tales doſes vj. in die aſcendendo. Vomituritio et alvus laxa inde obſervata. M. Saxtorph haſce obſervationes communicat. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XV. S. 2.)

cfr. Schachtii Arcanum antepilepticum.

Pollen Coryli, v. *Corylus Avellana*.

Populus nigra. (Semen.)

Plinii Hiſtor. natur. L. XXIV. cap. 8. (ex aceto datum.)

Portulaca oleracea.

Plinii Hiſtor. natur. L. XX. cap. 20.

Potaſſa arſenicata, v. *Arſenicum*.

Potentilla reptans. (Herba.)

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1387. (Thom. Eraſtum herbae decoctum cum fructu contra epilepſiam adhibuiſſe.)

Preſſavini Decoctum antepilepticum.

Nouveau traité des vapeurs, ou traité des maladies des nerfs, dans lequell on developpe les vrais principes des vapeurs; par Mr. Preſſavin. à Lyon 1770. 12. p. 119. (Sequenti remedio plures epilepticos ſanaſſe: Saſſaparill. ℔j. Guajac. ℔ß. Rad. Chinae, Bardan. Enulae āā ℥iv. per horas VI. ex aquae fontan. Menſur. xij. coqu. in olla operculo probe clauſa, in qua ſimul nodulus ſuſpendatur antimon. contuſ. ℥iv. et Sal. Tartar. ʒj. continens. Finita coctione addantur Rhei ℥j. Sennae mundat. ℥iv. Chamom. roman. ℥ij. Cumin. ℥j. et, olla iterum obtecta, coctio per hor. ß. continuetur. Colatus liquor effundatur in pelvim amplam, additis ℔iij. Sacchari farinacei [Caſſonade], ebulliat per hor. ß. ſolliciterque interea deſpumetur. Frigefacto addantur ℥vj. Spirit. Vini, in quo antea Cantharid. ʒj. infuſa fuerit; poſtea liquor in lagenis probe obturatis ſervetur in loco frigido. Doſ. ℥iv. mane et quatuor horis poſt prandium. Singulae doſi addi poteſt pulvis de gutteta vel pulvis radicis Valerianae vel Paeoniae ad ʒjß. aut oleum animale Dippelii ad gtt. viij — x. aut, quod tamen viribus inferius eſt, oleum ſuccini. Adjungenda auxilia diaetetica et reli-

reliqua ex ſignis generalioribus petenda, ex quibus praecipue cauteriis magna efficacia tribuenda eſt.)

Prunus avium. (Fructus.)

Aqua ex iis deſtillata.

Baricelli (Jul. Caeſ.) Hortulus genialis. p. 338.

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1178.

Spiritus Ceraſorum.

Kesler (Frid.) proceſſ. chymic. p. 37.

Schroeder l. c. p. 1179.

Pulſatilla nigricans, v. *Anemone pratenſis.*

Pulvis alterans Plumeri, v. *Antimonium.*

Pulvis anodynus Weismanni, v. *Weismann.*

Pulvis antepilepticus aureus Zwölferi, v. *Zwölfer.*

— — — *Bartholini*, v. *Bartholin.*

— — — *Beuceri*, v. *Beucer.*

— — — *Caroli V.*, v. *Carol.*

— — — *Cellarii cum Caſtoreo*, v. *Cellar.*

— — — *Cervinus.*

Spina (D. de) l. c. p. 762.

(℞. Pulv. cervin. ſimpl. ex typhis praepar. ℥vj. Sal. volat. Corn. Cerv. juxta modum Salis viperin. volat. parat. Sal. Succin. volat. āā ℥ß. Sacchar. Cand. alb. pulveriſ. ℥ij. Ol. ſtill. Coriandr. Majoran. Lavendul. āā ʒj. M. F. Pulv. cuſtodiatur in vitro cera optime obturato. Doſ. ℈j — ij.)

— — — *Cervinus Zwölferi*, v. *Zwölfer.*

— — — *Cratonis*, v. *Crato.*

— — — *Daniae Regis*, v. *Dan.*

— — — *D. F. H.*

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 520.

— — — *D. G. M.*

Schroeder l. c. p. 520.

— — — *Diaphoreticus.*

Spina l. c. p. 763.

(℞. Cinnab. ♄n. purificat. Magiſt. Corall. Perlar. Cran. human. āā. F. pulv. ſubtiliſſimus. Doſ. gr. x — xvj. bis in ſeptimana.)

Pulvis antepilepticus Doereri, v. *Doerer.*
— — — *Dolaei*, v. *Dol.*
— — — *Dorncrellii*, v. *Dorncr.*
— — — *Egſii*, v. *Egſ.*
— — — *Eiſenmengeri*, v. *Eiſenm.*
— — — *Engelhardi*, v. *Engelh.*
— — — *Ettmülleri*, v. *Ettmüll.*
— — — *Fauſii*, v. *Fauſ.*
— — — *(de) Gutteta*, v. *Guttet.*
— — — *Hartmanni*, v. *Hartm.*
— — — *Heidleri*, v. *Heidl.*
— — — *Holſaticus.*

Pharmacop. Wirtemberg. 1741. p. 260.

(℞. Rad. Paeon. Gentian. āā ℥ij. Herb. Betonic. Chamaedr. Pentaphyll. Flor. Paeon. Lilior. convall. Violar. Tiliae āā ℥j. Semin. Paeon. excortic. Coriandr. āā ʒ ij. Raſur. Ungul. Alcis. ʒ ij. Aſini ʒ v. Raſur. Corn. Cerv. Corn. Cerv. ſin. ign. praepar. āā ℥j. Cran. human. ppt. ʒ vj. Corall. rubr. albor. ppt. Margarit. orient. ppt. āā ℥ ß. Fol. Auri. n. xxiv. M. f. pulv. ſubtiliſſimus. Doſ. ℈ ß — ʒ ß.)

— — — *Jüngkenii*, v. *Jüngken.*
— — — *Krügeri*, v. *Krüger.*
— — — *Ludovici*, v. *Ludov.*
— — — *Lujae*, v. *Luja.*
— — — *Marchionis*, v. *March.*
— — — *Mayernii*, v. *Mayern.*
— — — *Mercurialis*, v. *Merc.*
— — — *Moebii*, v. *Moeb.*
— — — *Mynſichti mirabilis*, v. *Mynſicht.*
— — — *Niger.*

Pelargi (Jo.) medicin. Jahrg. I. p. 284.
Stahl (Jo. Ern.) Collegium practic. Lipſiae 1728. 4. p. 524.

— — — *Niger Viennenſis*, v. *Vienn.*
— — — *Officinalis Diſpenſ. Brand.*

Diſpen-

Diſpenſator. Brandenburg. edit. ab Ern. Fagino. Erford. 1734. fol. p. 155.

(℞. Corall. rubr. ppt. Cran. human. non humat. Matr. perlar. ppt. āā ℥ ij. Corn. Cerv. ſine igne ppt. ℥ iij. Rad. Paeon. mar. ℥ j. Sem Paeon. ℥ ij. Viſc. quern. Sacch. albiſſ. āā ℥ ß. Fol. Auri puriſſ. n. v. M. F. P.)

Pulvis antepilepticus P. H. D.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 520.

— — — *Ruber.*

Pharmacop. Wirtembergica. 1741. p. 261.

(℞. Rad. Paeon. Corall. rubr. ppt. āā ℥ ij. Unicorn. marin. Cinnab. nativ. Succin. ppt. āā ℥ j. M. F. P. Doſ. ℈ ß — ʒ ß.)

— — — *Rudolphi Imperatoris*, v. *Rudolph.*

— — — *Secundinae humanae.*

Spina (D. de) l. c. p. 763.

(℞. Secundin. puelli primogenit. exſiccat. ℥ ß. Cranii maris calcinat. ℥ j. Pulv. pullor. corvi ℥ ij. Coagul. lepor. ʒ j. Corn. Cerv. raſ. ʒ ij. Caſtor. ʒ ß. Succin. albiſſ. ʒ ij. Viſc. quern. luna decreſcente collect. ʒ ß. Granor. et rad. Paeon. ante novilun. collect. āā ʒ ß. Ambr. gryſ. Moſch. āā ℈ ß. Spec. Dianth. diaplaeres. Archont. laetific. Galen. Margarit. ppt. Corall. ppt. āā ℈ j. M. F. Pulv. ſubtiliſſ.)

— — — *de Spina*, v. *Spina.*

— — — *Timaei*, v. *Tim.*

— — — *Viridis.*

Bierling (C. Th.) adverſar. p. 117.

— — — (Baron a) *Wallenſtein*, v. *Wallenſt.*

— — — *Weikhardti*, v. *Weikh.*

— — — *Zwölferi*, v. *Zwölfer.*

Pulvis Cephalicus albus.

Pharmacop. Wirtemberg. 1741. p. 257. (Doſ. ʒ ß — ℈ ij.)

Pulvis Cephalicus Camerarii, cum Saccharo.

Pharmacop. Wirtemberg. p. 257. (Doſ. ℈ ß — ℈ iij.)

Pulvis Cephalicus Winteri.

Pharmacop. Wirtemb. p. 257. (Doſ. ℈ j — ʒ ß.)

Pulvis Dreſdenſis niger, v. *Dreſdenſ.*

Pulvis Halenſis niger, v. *Halenſ.*

Pulvis Pannonicus ruber.

Pharmacop. Wirtemberg. 1741. p. 264. (Doſ. ℈j — ʒß.)

Purgantia.

Barbette, (Paul.) Praxis Barbettian. Amſterdam. 1665. 8. (Biga obſervationum probat purgantium efficaciam.)

Caelii Aurelian. tardar. paſſion. L. II. c. 4. (Praxagoram et Themiſonem jam ea in epilepſia dediſſe.)

Cheſneau (Nicol.) Obſervat. medic. Lugdun. 1673. Lib. I. cap. IV. obſ. 3.

Deckers (Fr.) Exercitat. practic. circa medendi methodum. Leidae 1673. 8. p. 47.

Eraſti (Thom.) Diſputation. P. IV. p. 103. (frequenti purgatione epilepſia nonnunquam ſuperatur, facilius ea quae ab artu quodam aſcendit.)

Fabricii Hildani Obſervat. Cent. I. obſ. 41.

Galeni L. de purgantium medicamentorum facultate. (Se aptis purgantibus epilepſiam ſanaſſe teſtatur.)

Galeni Conſilium pro puero epileptico. (Suadet purgantia.)

Hamburg. Magazin. B. XV. Hamburg 1755. 8. p. 313. (purgans anthelminticum epilepſiam ſanans.)

Kinneir Eſſay on the Nerves. p. 179. (purgans rhabarbarinum feliciter adhibitum.)

Kovacs Tatai l. c. p. 88. ſqu. (magnam copiam formularum medicamentorum alvum ducentia et in epilepſia olim uſitatorum tradit.)

Mangold (Chr. Andr.) Pr. de epilepſiae nonnullis ſpeciebus, recuſ. in Ej. Opuſcul. Altenburg. 1767. 8. T. I. p. 49. (Tinctura rhei qua purgans felici cum ſucceſſu propinata.)

N. A. N. C. Vol. VII. obſ. 30.

Recueil periodique des Obſervations de Medecine et Chirurgie. T. I. à Paris 1754. 8. p. 403. (in quatuor epilepticis felici ſucceſſu data.)

Re-

Reneaulme (Paul.) Obſervat. Pariſ. 1606. 8. obſ. 47. 48. (purgans aloeticum.)

Rhazes Continens. L. I. (alvum mitibus ducere ſuadet.)

— — — L. VI. (Filogorium in L. de medicinis laxativis annotaſſe: ſola alvi ductione curatam eſſe epilepſiam.)

Ruland (Mart.) Curation. empiric. (paſſim.)

Saillant, in Mémoires de l'Academie royal. Tom. III. à Paris 1782. v. Giornale per ſervire alla ſtoria ragionata della Medicina di queſto ſecolo. T. II. Venezia 1784. p. 120. (epilepſiam ab abundantia humorum purgantibus ſanaſſe.)

Septalii (Ludov.) Animadverſ. et cautel. medic. Dordrecht. 1650. 8. p. 151. (purgantia in epil. adhibita interdum apoplexiam provocaſſe contendit.)

Tiſſot l. c. p. 225. ſqu. et p. 273. ſqu. (eorum efficaciam laudat, praeſertim in epil. a ſaburra primarum viarum et vermibus, prolixiusque de eorum juſta adminiſtratione tractat.)

Unzer (Jo. Aug.) der Arzt. B. V. et VI. (paſſim.)

Woodward (J.) Select caſes and obſervations. London 1737. 8. p. 93. (purgantibus epilepſiam pluries avertit.)

Q.

Quarzum Cryſtallus. (varias intrat veterum compoſitiones antepilepticas.)

E. N. C. Dec. II. Ann. IV. obſ. 12.

Kovacs Tatai l. c. p. 133.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 686.

Sennert (Dan.) Paralipom. ad Lib. I. Medicin. practic. paralip. 12.

Quercetani Elixir. vitae majus.

Spina l. c. p. 370.

Quercetani Nepenthe.

Quercetani (Joſ.) Pharmacop. dogmaticor. reſtituta. Lipſ. 1603. 8.

Tiſſot l. c. p. 314. (continere opium in aromatum connubio.)

Quercetani Spiritus antepilepticus.

Quercetan. l. c.

Schre-

Schreger's (B. N. G.) kritiſch. Diſpenſat. p. 216. (Sem. Hyperic. Paeon. Flor. Lilior. convall. Calendul. Rorismar. Hyperic. Ebur. Cranium human. Viſcum quern. c. phlegm. Vitriol. digeſt.)

Quercetani Syrupus antepilepticus.

Spina l. c. p. 922.

(℞. Rad Paeon. Viſc. quern. āā ℥ ß. Cinnam. ʒ ij. Flor. Calendul. Lilior. convall. Tiliae. Lavend. āā Pgl. j. Roſar. rubr. Pgl. ij. Fiat extr. c. Spirit. Junip. vel Spirit. Vin. ad emin. digit. iv. decantetur Tinctur. ℥ x. adde Sacchar. cand. ℥ iv. et accendantur flagrenturque continuo agitando, donec Syrupus ſit ſatis coctus.)

R.

Ragolo Remedium antepilepticum.

Partium conſtitutivarum exploratio.

Anonymus quidam in Allg. Litt. Ztg. 1793. n. 246. (ex agarico muſcario, Valeriana et oleo quodam deſtillato conſtare putat.)

Gmelin (Jo. Fr.), in Crell. chem. Annal. St. XII. 1792. p. 483. et in Feurſtein. Diſſ. cit. p. 84. (Non analyticis ſolum, ſed et ſyntheticis experimentis probare ſtudet, continere pulverem Valerianae Magneſia, Sale ammon. et Ol. Cajep. commixtum et quidem ſequens miſcela ipſi arcano maxime aequabat:

℞. Pulv. rad. Valer. ℥ ß. Magneſ. alb. ⊖ X c. depur. āā gr. iij. Singulis in pulverem tritis adde olei de Cajeput. gtt. ij.

Folia Aurantior. continere [quod Cl. Knopf putat], ei non probabile videtur.)

Knopf, in Balding. N. Mag. f. A. Vol. XI. St. 3. p. 232. (vegetabilia continere quoque putat et ſequens formula ei videtur arcano haud abſimilis:

℞. ♁ rad. Valer. ʒ j. Fol. Aurant. ℈ j. ⊖ X c. gr. ij. Ol. de Cajep. gtt. iv.)

Rozier, in Gazette de Paris. à Paris 1784.

Thi-

Thilemann, in Balding. N. Mag. f. A. B. XI. St. 1. p. 75. (e mineralibus conſtare putat.)

Therapeutica adminiſtratio.

(in ſchedula, quae pulveri venali additur, docetur.)

Vires obſervatae.

Abhandlung von dem berühmt. und wirkſam. Ragoloſchen Mittel zur Heilung d. Epil.; nebſt den Zeugniſſen derer, welche durch den Gebr. d. Mittels ſind geheilet worden. Von einigen deutſchen Aerzten zum Druck befördert. Leipzig 1788. (gratis remedii emtoribus exhibetur.)

Barnusconi (Medici Veneti) Abhandl. v. d. Ragoloſch. Mittel in d. Heilung der Epilepſie. (Loc. et ann. typogr. me fugit. An forſan idem cum praecedente?)

Dolle, in Balding N. Mag. f. A. B. XIV. St. 6. p. 441.

Feurſtein Diſſ. cit. p. 33. (epilepſiam a coitu, aliam ab onania, tertiamque a lacte nutricis iratae ingeſto ejus uſu profligatam vidit.)

Geſenius (W.) Heilmittellehre. Stendal 1791. p. 418.

Jahn, in Balding. N. Mag. f. A. B. XII. St. 6. p. 495. (inefficax ei ſeſe praebuit.)

Reinold üb. d. Gebrauch des Ragoloſch. Mittels in der fall. Sucht; in der Samml. f. pr. Aerzte. B. XIII. p. 676. ſqu. (laudat.)

Thilemann von d. Wirkung. d. Ragoloſch. Arzenei in d. Epilepſie; in Balding. N. Mag. f. A. B. XI. St. 1. p. 73—76. (laudat.)

Trecourt Traité des nerfs et des leurs maladies, dans laquelle on trouve auſſi une nouvelle methode, pour guerir les convulſions et l'epilepſie par le remede de Ragolo. (Verſio germanica in lucem prodiit Lipſiae 1792.)

Rana eſculenta. (Siccata tota.)

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1757. (pulveriſ. c. lacte nutricis Cuſp. j. in epilepſia infantum.)

Cor.

Schroeder l. c. p. 1757.

Hepar pulveriſat.

Abel (Henr. Caſp.) reformirter und ganz vollkommner Leibmedicus d. Studenten. Leipzig 1720. 8. p. 574. (laudat. Fridericum IV.

[Co-

[Comit. palatin.] per decennium ab epilepſia vexatum ejus ope ab ea eſſe liberatum.)

Camerarii (Jo. Rud.) Sylloge memorab. medic. Cent. XVI. partic. 41. (Specificum eſſe contra epilepſiam.)

E. N. C. Dec. III. Ann. IV. obſ. 73.

Hartmann (Jo.) Praxis chymiatr. p. 19. (laudat.)

Schroeder l. c. p. 1757.

Welſch (Georg. Hier.) Hecatoſt. II. obſ. 35. p. 20. (fruſtra adhibitum eſſe.)

Raphanus ſativus. (Radix.)

Riedlin (Vit.) Obſervat. medic. Cent. III. ed. filio Auguſt. Vindelicor. 1691. 12. Cent. I. obſ. 7. (cum fructu data.)

Regii Electuarium antepilepticum.

Spina (Dav. de) l. c. p. 315.

(℞. Conferv. flor. Anthos. ℥jß. Buglоſſ. ℥ß. Spec. diamoſch. dulc. ʒjß. Rad. Paeon. Sem. Paeon. jun. Cran. hum. Viſc. quern. āā ʒj. Spirit. Vitriol. gtt. xv. Syrup. de Stoech. qu. ſ. M. f. Elect.)

Renodaei Electuarium ſennatum.

Spina (Dav. de) l. c. p. 348. (epilepticis quoque convenire.)

Rheum palmatum. (Radix.)

Tinctura rhei.

Kinneir new Eſſay on the Nerves. p. 179.

Mangold (Chr. Andr.) Pr. de epilepſiae nonnullis ſpeciebus. recuſ. in Ej. Opuſcul. Altenb. 1767. 8.

Rhümelii Extractum e ſcoriis Argenti, v. *Argentum.*

Rollwagenii Liquor antimonialis.

Zeller (J.), reſp. Bauer, Theſes medicae. Tubing. 1704. 4.

Roſmarinus officinalis.

Oleum Anthos.

Medicina experiment. Dygbaean. T. II. p. 318.

Ros Solis, v. *Droſera rotundifolia.*

Rotulae antepilepticae Hartmanni, v. *Hartmann.*

— — — *Michaelis*, v. *Michael.*

— — — *de Spina*, v. *Spina.*

Rudol-

Rudolphi, Imperatoris, Pulvis antepilepticus.
Bierling (Caſp. Th.) Adverſar. medic. append. p. 113.
Dolaei Encyclop. medic. p. 136.
Schroeder l. c. p. 520.
Spina (D. de) l. c. p. 759.
(℞. Cinnab. antimon. ℥ß. Unicorn. ℥ij. Corn. Cerv. Viſc. quern. āā ʒj. Terr. ſigill. Cran. hum. ppt. Margar. ppt. āā gr. xv. Lap. Smaragd. Cinnamom. Croc. āā ℈ß. M. F. Pulvis.)

Rulandi Pulvis antepilepticus.
Spina l. c. p. 760.
(℞. Eſſent. Cran. human. ℥ij. Corall. rubr. Margarit. āā ℥j. Magiſter. Succin. ʒvj. Spirit. Vitriol. dulc. in coag. red. ℥j. Lap. Bezoar. ʒjß. Ambr. gryſ. ℈ij. Moſch. ℈ß. M. f. Pulvis.)

Ruta graveolens. (Herba.) (Aqua deſtillata, Decoctum, Infuſum, Oleum, Succus.)
Alexand. Trallian. Oper. omn. Lib. I. c. 15. (jam laudat.)
A. N. C. Cent. I. obſ. 85. (epilepſia decocto Rutae ſanata.)
Boerhave (Herm.) Inſtitut. Chemiae. T. II. p. 68. (aquam deſtillatam laudat ad levandos paroxyſmos.)
— — — Conſultat. medic. Gotting. 1752. p. 28. (infuſum theiforme commendat.)
Borell (Petr.) Obſervat. et Curat. Cap. I. obſ. 18. (laudat.)
Foreſt. (Petr.) de capitis et ventris morbis. Lib. III Lugdun. Batav. 1590. 8. (Rutae confricatae odorem paroxyſmum diſſipare.)
Γεωπονικων Λιβρ. XII. curant. Braſſican. Baſil. 1539. p. 349.
Mayerne (Th. de) Prax. medic. p. 20. (laudat.)
Moor (Barthol. de) Pathol. cerebr. p. 74. (laudat.)
Plinii Hiſtor. natur. Lib. XX. c. 13. (qua decoctum ante acceſſiones, quarum frigus intolerabile eſt.)
Riedlin (Vit.) Lin. medic. Ann. IV. Octobr. 1698. obſ. 25. p. 877. (infantum epilepſiam ſucco ſanavit.)
Schenk (Jo.) Obſervat. Lib. I. obſ. 228.
Scholzii Conſilior. L. III. conſ. 4. (caput oleo inungendum ad praecavendum paroxyſmum.)

Stenzel (Ch. Godofr.) D. de Ruta medicamento et veneno. Viteberg. 1735. 4.

Tiſſot l. c. p. 327.

Valleriola (Franc.) Obſervat. medicinal. L. VI. Lugdun. 1573. fol. L. III. obſ. 7. p. 156. (Succus cum oxymelle ſquillitico propinatus ei ſe comprobavit.)

S.

Saccharum officinarum (canarienſe).

Reichsanzeiger. pr. 1796. Octob. p. 6201. (Infantibus cochlear magnum dimidium cum cochl. j. olei olivarum. Adultis doſis duplex. Poſt tertiam doſin ſanatio, niſi malum inveteratum aut periodicum.)

Sacchari Saturni, v. *Plumbum.*

Sal antepilepticum Weismanni, v. *Vitriolum caeruleum.*

Sal Colcotharis.

Penoti (Bern. Georg.) Vademecum Theophraſtic. Magdeb. 1607. p. 118. (laudat.)

Quercetan. (Joſ.) Tetr. capit. affect. p. 153. (a ℈j — ʒß. cum felici ſucceſſu adhibitum.)

Sala (Angel.) Oper. medic. chymic. Francof. 1647. p. 498.

Sal commune.

Der Landarzt. St. XII. (epilepſia forſan verminoſa tribus quotidie per tres menſes ſalis communis cochlearibus deglutitis profligata.)

Sal epilepticum Mynſichti, v. *Mynſicht.*

Salia lixivioſa.

Sylvii (Franc.) praxeos medicae idea nova. Lib. II. Amſtelodam. 1674. 12. (epilepſiae potiſſimum ſalia lixiv. praeſertim ea ad volatilitatem perducta, ſubvenire.)

Sal ſedativum Hombergi.

Homberg, in Mémoir. de l'Academ. des Scienc. à Paris 1702. n. 2.

Reuſs (A. C.) D. de ſale ſedativo Hombergii. Tubing. 1778. 4. p. 43.

Sal Succini, v. *Succinum.*

Sam.

Sambucus nigra.

Blockwitzii (Mart.) Anatom. Sambuci. Lipſiae 1631. 12. Sect. III. cap. 4.

Dufour, in Gazette de Bouillon. 1775. p. 46. (baccae.)

Qua Amuletum, v. *Amuleta.*

Sanguis Aquilae, v. *Aquila.*

— — *Cervi*, v. *Cervus Elaphus.*

— — *Columbae*, v. *Columba Turtur.*

— — *Corvi*, v. *Corvus Corax.*

— — *Felis*, v. *Felis Catus.*

— — *Hirundinis*, v. *Hirundo urbica.*

— — *Humanus et ejus praeparata*, v. *Homo.*

— — *Leonis*, v. *Felis Leo.*

— — *Leporis*, v. *Lepus timidus.*

— — *Lupi*, v. *Canis Lupus.*

— — *Muſtelae*, v. *Muſtela vulgaris.*

— — *Talpae*, v. *Talpa europaea.*

— — *Teſtudinis*, v. *Teſtudo.*

Sapindus Saponaria. (Herba.)

Borell. (Petr.) Hiſtor. et Obſerv. Cent. II. obſ. 1. (epilepſia ejus ope ſanata.)

Semen.

Borell. (Petr.) l. c. obſ. 18.

Hofmann (Fr.) Method. medend. Lib. I. c. 19. (ante paroxyſmum ℥j. per trimeſtre ſemel in menſe.)

Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1415.

Sapo, hiſpanicus, venetus.

Barbette (Paul.) prax. Barbettiana. Amſtelod. 1665. 8. (laudat Sapon. hiſpan. ʒß. in lactis vaccini ℥iij. coctum et mane veſpereque per triginta dies ſumtum.)

Beccario (Profeſſ. olim Bononienſis), v. Burſerii Inſtitut. med. pract. T. III. edit. Lipſ. p. 257. (laudat ſaponem in liberaliore doſi cum lacte praeſertim aſinino coctum et diutius propinatum.)

Cohauſen (Fr. Ant.), in N. A. N. C. Tom. II. p. 31. (epilepſia

 idio-

idiopathica ſapone veneto in lacte ſoluto et per aliquot ſeptimanas adminiſtrato ſanata.)

Scabioſa ſuccifa. (Herba.)

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1439.

Schachtii (Ooſterdyk) Arcanum antepilepticum.

Abhandl. d. Geſellſch. d. Wiſſ. zu Vlieſsingen. Th. III. (ab Archiatro Gesnero accepit. Saccharo Saturni infundatur Spirit. Nitri. Saepius moveatur lagena et propinentur aegroto omni mane gtt. vj.)

Guerike, in Balding. Mag. f. A. 1778. St. XII. p. 1104. (ad gtt. xvj. intra novem ſeptimanas aſcendit absque ſucceſſu aut noxa.)

Schreger (B. N. G.) kritiſch. Diſpenſat. p. 146.

Scilla maritima. (Radix.)

Gardane Gazette ſalutaire. p. 223.

Hofmann (Fr.) Medic. rat. ſyſtem. T. IV. P. III. p. 357. (medelae ea peractae exemplum.)

Lemnii (Lev.) de miracul. occult. naturae. L. IV. p. 147.

Zacut. Luſitani Hiſtor. princip. med. Hiſtor. 29.

Oxymel ſquilliticum.

Plinii Hiſtor. natur. Lib. XXIII. cap. 2.

Saillant, in Mémoir. de l'Academ. roy. des Sciences à Paris. 1782. (usque ad vomitum dato adjunctis purgantibus épilepſiam ſanavit.)

Secale cereale. (Succus graminis.)

Wunderbare Kräfte der Natur durch die Sym- und Antipathie. Frankfurt u. Leipzig 1772. p. 107.

Secundinae humanae et earum praeparata, v. *Homo.*

Sempervivum tectorum; v. *Bachiene Arcan. antep.*

Sericum uſtum.

Bresl. Sammlung. 1718. Febr. p. 698. (laudatur.)

Heimreich jun. de holoſerico remedio antepileptico, in Act. N. C. Vol. IV. obſ. 17. p. 76. (vim medicatricem in ⊖ et ♀r. holoſerici ponit.)

Serum Lactis, v. *Lac.*

Seta-

Setaceum.

Beaumes l. c. p. 350.

Clarke, in London medical Journal. 1781. v. Samml. auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. B. VII. p. 201. (in dorſo cum fructu applicatum.)

Fabricii Hildani Obſervat. et epiſtol. Francoſ. 1646. fol. Cent. I. obſ. 41. (epilepſia ſetaceo ad nucham applicato ſanata.)

Frank (Joh.) Bericht vom Schnurziehen. Augsburg 1683. 12. (exempla efficaciae ſetaceorum in epilepſia tradit.)

Maret, in Nouveaux Mémoires de l'Acad. de Dijon. Premier Semeſtre 1784. à Dijon 1784. p. 149. (epilepſia a laeſione digiti indicis cum aura epileptica ſetaceo ad brachium applicato profligata.)

Muralt (Jo.) Schriften in der Wundarznei. Baſel 1691. 8. p. 113. (efficaciae exemplum.)

Parè (A.) Oeuvres de Chirurgie. Lib. IX. cap. 4.

Schenk (Jo.) Obſervat. Lib. I. obſ. 232.

Tiſſot l. c. p. 379.

Sinapis nigra. (Semen.)

Plinii Hiſtor. natur. Lib. XX. cap. 22. (aut cum ſucco cucumerum aut cum cumino et ficо contuſum.)

Smaragdus, v. *Borax Gemma nobilis Smaragdus.*

Solanum Dulcamara. (Stipites.)

Boerhave, v. Beaumes l. c. p. 353. (decoctum cum melle in epilepſia a metaſtaſi acri.)

Species antepilepticae Zwölferi, v. *Zwölfer.*

Specificum cephalicum Michaelis, v. *Michaelis.*

Spigelia anthelmintica. (Herba.)

Beaumes l. c. p. 204.

Quarin. (J.) Animadverſ. pract. p. 27.

Spina (Dav. de) Decoctum antepilepticum.

Spina l. c. p. 247.

(℞. Raſur. Lign. Guajac. ℥ij ß. Viſc. quern. ℥j. diger. in ▽ ℔vj. tum coqu. ad ℔v. adde Rad. Paeon. ℥ß. Sem. Aniſ. ʒj ß. Rad. Liquirit. ℥ß. Coqu. adhuc et cola. F. Decoct. pro potu ordinar. in epilepſia uſurpandum.)

Spina

Spina (D. de) Electuarium antepilepticum.

(℞. Conſerv. flor. betonic. Anthos. ãã ℥ ij ß. Rad. Eryng. cond. Mithridat. ãã ℥ j. Ligri. Saſſafr. ʒ vj. Caſtor. ʒ iij. Cran. human. calcin. Ungul. Alc. ãã ʒ ij. Rad. et Sem. Paeon. Rut. ſylveſtr. Nigell. Rad. Pyrethr. ãã ʒ j. Oxymell. ſquill. qu. ſ. ut F. Elect.)

Spina (D. de) Gelatina antepileptica.

Spina l. c. p. 533.

(℞. Raſur. Cran. human. Corn. Cerv. ãã ℥ vj. Ungul. Alc. Ebor. ãã ℥ ij. Flor. Paeon. Tiliae. Lil. conv. Anthos. ãã ℥ j. Succ. Citr. ℥ viij. Acet. Vin. ℥ x. Coqu. et col. F. Gelatina.)

Spina (de) Pulvis antepilepticus.

Spina l. c. p. 759.

(℞. Unic. ver. vel Lap. Bezoar. ʒ j. Ungul. Alcis. Margarit. non perforat. Corall. rubr. ppt. alb. Corn. Cerv. uſt. Rad. Paeon. Sem. Cydon. excortic. Viſc. quern. Auri ungar. ãã ʒ ß. Stercor. pavon. ℈ j. M. F. P. Doſis pueris ℈ j. adultis ʒ ß. in aqua appropriata.)

Spina (de) Rotulae antepilepticae.

Spina l. c. p. 822.

(℞. Cinnam. ʒ j. Rad. et Sem. Paeon. ãã ℈ ij. Cubeb. Caryoph. Macis ãã ℈ j. Spec. aromat. Roſar. Caryoph Diambr. Diamoſch. dulc. ãã ℈ ß. Sacchar. in aqu. flor. Tiliae et Paeon. ſolut. ℥ iv. Ol. Aniſ. Macis ãã gtt. iv. F. Rotulae.)

Spina (de) Syrupus antepilepticus laxativus.

Spina l. c. p. 950.

(℞. Rad. Paeon. ℥ j. Fumar. Apii ãã ʒ ij. Viſc. quern. ℥ ß. Flor. Paeon. Mpl. ß. Tunic. Tiliae. Borrag. Viol. Anthos. Hyſſop. ãã Pgll. ij. Cinnam. Macis. ãã Pgll. j. Coqu. in ſ. qu. aqu. ad ℔ ß. Colat. adde Fol. Senn. ℥ j. Rad. Mechoac. ℥ ß. Turbith. ʒ iij. Zingib. ℈ ß. Coqu. iterum colat. adde Syrup. de Cichor. c. Rheo. ℥ iij. Coqu. ad conſiſt. Syrupi.)

Spiraea Filipendula. (Radix.)

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1247. (aut cibis addita aut pul-

pulveriſata cum liquore appropriato epilepticis propinata laudatur a Matth. Sylvatico.)

Spiritus antepilepticus Baſilii, v. *Baſil.*

— — — *Colleg. Leidenſ.*

Jüngken (Jo. Helfr.) Lexicon chym. pharm. P. II. p. 355.

(℞. Fol. et Flor. Lavend. Rorism. Majoran. Salviae āā M. ij. Caſtor. ℥ij. Camphor. ʒij. Salis Ammon. ℥iv. Sal. Tartar. ℥iij. Spirit. Vin. ℔vj. ▽ Lavend. qu. ſ. ut ei ſimplicia innatare queant, poſt trium vel quatuor dierum digeſtionem deſtillentur, donec ℔iij. prodierunt Spiritus, cui adde Olei Sem. Rutae gtt. xxx. Succin. rectific. gtt. xx. Macis. Juniper. āā gtt. XL. Miſce et ſerva. — Hoc Sal volatile oleoſum eſſe penetrantiſſimum et inſignium virium ad omnes morbos convulſivos et ſpasmodicos, tam interne doſi gtt. x—xx. vel ultra propinatum quam externe in paroxyſmo naribus applicatum.)

— — — *Dolaei*, v. *Dol.*

— — — *Dreſleus*, v. *Felis Leo.*

— — — *Paracelſi*, v. *Paracelſ.*

— — — *Quercetan.*, v. *Querçet.*

— — — *Urinae humanae*, v. *Homo.*

— — — *Vitrioli Diſpenſ. Brand.*, v. *Vitriolum.*

— — — *Vitrioli Hartmanni*, v. *Hartmann.*

Spiritus Ceraſorum nigrorum, v. *Prunus avium.*

— — *Cranii humani*, v. *Homo.*

— — *Juniperi*, v. *Juniperus communis.*

— — *Nitri dulcis*, v. *Nitrum.*

— — *Sanguinis humani*, v. *Homo.*

— — *Stercoris Leonis*, v. *Felis Leo.*

— — *Vitrioli*, v. *Vitrioli Acidum.*

Stahlii Pilulae balſamicae.

Juch (H. M.), reſp. J. G. Hannimann, D. ſ. facillimam ac certiſſimam methodum curandi epilepſiam. Erfordi 1741. 4. (hasce pilulas valde laudat.)

Stannum (Limatura.)

Fothergill, in Medical Obſervations and Inquiries. Vol. VI. London

don 1784. n. 9. (per octiduum quotidie ℥j. in electuario laudat contra epilepſiam verminoſam.)

Stercorea.

Macaſii (Georg.) Promptuar. mater. medic. (paſſim.)

Paullini (Chr. Fr.) Dreckapotheke. Frankfurt u. Leipzig 1748. 8. Sect. I. p. 20. Sect. II. p. 6.

Sebitz (Melch.) Manuale ſ. ſpeculum medicinae practicae. Tom. I. Argentor. 1661. 4. p. 276. ſqu.

Stercus Aſini, v. *Equus Aſinus.*

— — *Cameli*, v. *Camelus.*

— — *Caprarum*, v. *Capra Hircus.*

— — *Ciconiae*, v. *Ardea Ciconia.*

— — *Coturnicis*, v. *Tetrao Coturnix.*

— — *Crocodili*, v. *Lacerta Crocodilus.*

— — *Hirci*, v. *Capra Hircus.*

— — *Humanum*, v. *Homo.*

— — *Leonis*, v. *Felis Leo.*

— — *Pavonis*, v. *Pavo criſtatus.*

— — *Vaccae nigrae*, v. *Bos Taurus.*

Sternutatoria.

Cael. Aurelian. Chronicor. Lib. I. cap. 4. (noxia eſſe.)

Celſus de medicina. Lib. III. cap. 28. (item.)

Diocles Caryſtius, v. Cael. Aurelian. l. c. (laudat.)

Kovacs Tatai l. c. p. 101. (commendat et ſternutatorii in epilepſia cum fructu adhibendi formulam tradit ſequentem:

℞. Sem. Lolii, Nigellae. Rad. Helleb. alb. āā ℈j. Herb. Majoran. Salviae. Anthos. āā ʒj. Moſchi. gr. ij. F. Pulv. ſubtiliſſ. ex quo piſi quantitas naribus inſpiretur.)

Marryat (Thom.) Handb. der pract. Arzneiw.; a. d. Engl. Leipzig 1793. 8. (pulverem Euphorbii, piperis et hellebori naribus epilepticorum inflare ſuadet.)

Praxagoras, v. Cael. Aurelian. Chronicor. L. II. c. 4. (laudat.)

Tiſſot l. c. p. 389. (noxia eſſe ob irritamentum et ſanguinis congeſtionem eo excitatam.)

Val.

Valſalva, v. Morgagni de ſed. et cauſ. morbor. Epiſt. IX. §. 6. (noxia eſſe.)

Struvii Pilulae antepilepticae.

Struve (O. G.) Eſſays ou reflexions intereſſantes etc. avec une diſſertation ſur la queſtion: Si les cauſes des maladies de l'ame et des nerfs ont toujours leur ſiege dans le cerveau? à Lauſanne 1772. 8.

Strychnos Nux Vomica. (Fructus. — Extractum.)

Gebauer, v. Jo. Henr. Schulzii Praelect. de virib. et uſu medicamentorum. p. 404.

Hufeland (C. W.), in Journ. der pract. Arzneik. B. I. St. I. p. 109.

Reſe (G. H. A.) D. de nuce vomica. Jenae 1788. 4. p. 20. (ob vim anthelminticam in epil. verminoſ. commendat.)

Schlereth Diſpenſator. Fuldenſe. p. 31.

Sidrèn (Jon.), in Act. medic. Suec. T. I. Upſal. 1783. 4. p. 367.

Styrax Benzoin. (Flores chemicae.)

Raümert (Car. Benj. Andr.), praeſ. P. J. Hartmann, D. ſiſt. varias epilepſiae medendi methodos. Francof. ad Viadr. 1787. p. 11. (ob vim analepticam commendat.)

Succinum. (cfr. Moſch. arte fact. Liquor. C. C. ſuccinat.)

Hofmann (Fr.) Medicin. ration. ſyſtem. T. IV. P. III. p. 20.

Ludovici (Dan.) Pharmac. p. 516.

Reinike (G. G.) D. de moſcho natural. et arte facto. Jenae 1784. (varia auctorum teſtimonia collecta tradit.)

Oleum.

Cullen (W.) Treatiſe of mater. medic. Vol. II. p. 361. (oleum ſuccini plus una vice deſtillatum medicinam eſſe efficacem in epilepſia ad gtt. xxx. propinandam.)

Riverii (Lazar.) Prax. medic. p. 32. (eo ſanatae epilepſiae exemplum.)

Sal volatile.

Beattie (Guil.) Aphoriſmi de cognoſcend. et curand. morbis. edit. D. S. de Matai. Halae 1780. 8. (praeſtantiſſimum eſſe remedium in epilepſia infantum.)

Moor (Barthol. de) Patholog. cerebri. (paſſim.)
Ricquet, v. Beaumes, l. c. p. 204.

Suffimentum antepilepticum Mynſichti, v. *Mynſicht.*

Sulphur. (Manu complexum aggrediente paroxyſmo.)

Ackermann, in annot. ad verſion. german. Tiſſot. l. c. p. 363. not. 67.

Whytt (Rob.) von den Nervenkrankheiten. p. 353. (interdum juvaſſe teſtatur et huncce effectum attentioni et fiduciae aegroti excitatae tribuit.)

Odor accenſi Sulphuris.

Bierling (Caſp. Th.) Adverſar. medic. p. 18. obſ. 7.
Plinii Hiſtor. natur. L. XXXV. cap. 15.

Sulphur venereum, v. *Cuprum.*

Superſtitioſa varia.

Bresl. Samml. Verſuch V. p. 1702. (mappa triclinaria, in qua antea jam ſacra coena adminiſtrata fuit, capiti aegroti imponenda.)

Oſiander (F. B.) Lehrb. der Hebammenk. Götting. 1796. 8. p. 629. (meminit moris, faciem infantum epilepticorum textura nigra [ſic dicta Flohr] obtegendi et pollices ſpaſtice in volam contractos omni adhibita vi explicandi.)

Storch (Jo.) von den Kinderkrankheiten. B. II. p. 116.
(Linea corallina a ſacerdote quodam conſecrata collo applicata.
Ahenum haereditate acquiſitum infantibus epilepticis impoſitum.
Panni haereditate acquiſiti, et induſia a compatre geſtata ad involvendos infantes.)

Wunderbare Kräfte der Natur durch die Sym- und Antipathie. Frankfurt u. Leipzig 1772. p. 107. (ad paroxyſmum profligandum aeger nomine in actu baptiſmatis accepto invocandus et ſequentia verba diſtincta voce ei acclamanda: „Creatura! memento creatoris tui!“)

Zulachtes, v. Haller. Bibl. med. pract. T. I. p. 303. (jam ſuperſtitioſa quaedam contra epilepſiam commendaſſe.)

Suppoſitorium antepilepticum Mynſichti, v. *Mynſicht.*

Sus

Sus ſcrofa. (Aper.)

Oſſa petroſa capitis.

Hartmann (Jo.) Prax. chymiatr. p. 19.

Teſticuli.

Cael. Aurelian. Chronic. Lib. I. cap. 4.
Plinii Hiſtor. natural. L. XXVIII. cap. 10.
Sinibaldi (Jo. B.) Geneanthrop. L. III. p. 310.

Urina.

Plinii Hiſtor. natural. l. c.

Veſica cum lotio.

Heers (Henr. ab) Obſervat. med. p. 210. (in furno ſiccata.)

Syrupus antepilepticus Quercetani, v. *Quercetan.*
— — — *de Spina*, v. *Spina.*

T.

Talpa Europaea.

Cinis.

Hirſchel (E. L.) von der Fallſucht. p. 5. §. 4.
Paullini (Chr. Fr.) Talpa. Francof. et Lipſiae 1689. 12. p. 132.
Waldſchmidt (Jo. Jac.) Prax. medic. p. 311.

Cor.

Bartholin (Thom.) Acta Havnienſ. Vol. IV. obſ. 50. p. 153.

Sanguis.

Mayerne (Th. de) Prax. medic. p. 21.
Reusner (Nicol.) Obſervat. medic. p. 30.

Viſcera.

Mayerne (Th. de) l. c. p. 21.

Tartarus emeticus, v. *Antimonium.*

Taxus baccata. (Extractum.)

Harmand, in Journal de Medecine. 1790. vid. Hufeland Annal. der franzöſ. Arzeneikunde. B. I. p. 148. (per reſtitutionem menſium epilepſiam mitigans. Doſ. gr. j — ij. ſenſim augendo.)

Loder (J. Chr.), reſp. J. C. Reddelien, D. de taxo baccata. Jenae 1794. 4.

Teucrium Chamaepytis. (Aqua ex herba deſtillata.)
Schroeder Pharmacop. univerſ. p. 1181.

Terentii Electuarium antepilepticum.
Kovacs Tatai l. c. p. 128.
Murellus (Phil.) de Myſter. medic. p. 87.

Teſticuli Apri, v. *Sus Scrofa.*
— — *Aſini*, v. *Equus Aſini.*
— — *Urſi*, v. *Urſus Arctos.*

Teſtudo.

Fel.

Plinii Hiſtor. natural. L. XXXVII. cap. 4. (naribus illitum paroxyſmos ſedare.)

Sanguis.

Camerarii (Jo.) Sylloge memorab. medic. Cent. XVI. partic. 38.
Plinii Hiſtor. natural. l. c.
Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 1804. (Siccati ʒij.)
Serapion, v. Cael. Aurelian. Chronic. Lib. I. cap. 4.

Tetrao Coturnix.

Cerebrum.

Camerarii (Jo.) Sylloge l. c. partic. 42.

Ova.

Hoefer (Wolfg.), v. Le Clerc leichte Medicin. Dresden 1711. 8. p. 85. (Siccat. pulveriſat. ʒß.)

Stercus.

Hartmann (Jo.) Prax. chymiatr. p. 19.
Hoefer Hercules medicus. p. 97.
Macaſii (Jo. Georg.) Promptuar. mater. med. p. 35.

Tetrao Perdix. (*Hepar.*)
Craton. a Craftsheim Epiſtol. et conſil. medic. p. 263.

Tetrao Urogallus. (*Lingua.*)
Appel (J. J.) Diſcurſus de epilepſiā. Altenburg 1713. 8. p. 39. (viventibus exciſa ſiccataque.)

Thea Bohea. (Folia.)
Molinariis (Sim. de) Ambroſia Aſiatica ſeu de virtute et uſu her-

bae

bae Theae ſive Cia. Genovae 1672. 12. (eorum laudes contra epilepſiam habet.)

Tilia europaea. (Flores, Ligni carbones, Radix.)

Aqua deſtillata e floribus parata.

Mizaldi (Ant.) Memorabil. Cent. IX. aphor. 25.

Infuſum florum theiforme.

Hofmann (Fr.) Opuſcul. medic. p. 227. (ejus diuturno uſu chronicam epilepſiam profligaſſe.)

Ligni Carbones.

Hirſchel (E. L.) l. c. §. 4. p. 5.

Hofmann (Fr.) Obſervat. phyſic. chemic. ſelect. Libr. III. Halae 1736. 4. p. 304. obſ. 13.

Rulandi (M.) Theſaur. medic. ed. Car. Raiger. p. 4 et 7.

Radicis Liquor.

Tilemann L. de mater. medica. p. 308. (e radice tiliae menſe Februar. transverſim inciſa ſuppoſito vaſe vitreo bene tecto collectus, dein rectificatus et purificatus contra epilepſiam laudatur.)

Somnus in tiliae umbra.

Paulini (Chr. Fr.) Obſervat. med. phyſic. Cent. I. obſ. 41.

Timaei a Güldenklee Electuarium antepilepticum.

Spina l. c. p. 315.

(℞. Pulv. antep. Timaei ℥ ß. Medull. nuc. indic. cond. ʒ vj. Confect. Alkerm. de Hyac. āā ʒ ij. Magiſt. Lunae ʒ ij. Spirit. Lil. convall. flor. Tiliae, Roſar. āā ℈ j. Eſſent. Ambr. ʒ ij. Syrup. Paeon. qu. ſ. F. Elect.)

Timaei a Güldenklee Elixir antepilepticum.

Spina l. c. p. 361.

(℞. Rad. Paeon. ℥ j. Doron. Dictamn. Dentar. āā ℥ ß. Flor. Paeon. ʒ vj. Lil. conc. Lavend. Stoech. arab. Prim. ver. Tunic. Anthos. Tiliae āā ℥ ß. Sem. Paeon. Viſc. quern. āā ʒ v. Nuc moſch.... affunde Spirit. Ceraſ. nigr. ad emin. 4. digit. Spirit. in digeſt. NB. p. 3. d. poſtea exprim. fortiſſ. et colat. Sp. abſtrah. ad dimid. reſid. adde Theriac. Androm. ℥ j ß. Mithrid. ℥ ß. Caſtor. ʒ iij. Sal. Succin. ℈ iv. diger. p. triduum et filtrat. adde Tinct. Lunae ℥ ß. F. Elix.)

Ti-

Timaei a Güldenklee Pulvis antepilepticus.

Bierling (Caſp. Th.) Adverſar. curioſ. Append. p. 108. (laudat.)

Spina (D. de) l. c. p. 758.

(℞. Magiſt. Lunae ℥iij. Perl. orient. Corall. rubr. Lap. Cancr. Succin. alb. Matr. perlar. āā ℥j. Cran. human. ℈iv. Corn. Alc. philoſoph. ppt. ℥ij. Corn. Cerv. ſine igne ppt. ℥jß. Faecul. Paeon. ℈v. M. F. P.)

Timaei a Güldenklee (Balthaſ.) Oper. medic. pract. Lipſ. 1677. p. 157.

Tinctura antepileptica Dolaei, v. *Dol.*

— — — *Fulleri*, v. *Fuller.*

— — — *Langii*, v. *Lang.*

— — — *Michaelis*, v. *Michael.*

— — — *Petri*, v. *Petr.*

— — — *Vitrioli Fiſcheri*, v. *Fiſcher.*

— — — *Waldſchmidti*, v. *Waldſchmidt.*

Tinctura Auri, v. *Aurum.*

— — *Bezoardica Michaelis*, v. *Michaelis.*

— — *Coralliorum*, v. *Iſis nobilis.*

— — *Cupri alcalina*, v. *Cuprum.*

— — — *Stiſſeri*, v. *Vitriol. caeruleum.*

— — *Liliorum alborum Langhanſii*, v. *Lilium candidum.*

— — *Lunae*, v. *Argentum.*

— — *Martis helleborata*, v. *Ferrum.*

— — *Picarum*, v. *Corvus Pica.*

— — *Rhei*, v. *Rheum palmatum.*

— — *Solis*, v. *Aurum.*

— — *Veneris Helvetii*, v. *Vitriol. caerul.*

— — *Zincea*, v. *Zincum.*

Tonſio Capitis.

Celſus (Aurel. Corn.) de medicina. L. III. c. 28. edit. Almelov. p. 174.

Trepanatio.

Abernethè Quaeſtiones medicae Monſpelienſes. Monſpeliae 1617. 4. p. 97. (ventilatur quaeſtio: an epilepſiae cranii perforatio.)

Are-

Aretaei diuturn. curat. Lib. I. cap. 4. (optimo cum eventu cranium perforabat in epilepſia, quum dura mater eſſet denigrata.)

Caelii Aurelian. tardar. paſſion. Lib. II. cap. 4. (terebrae uſum rejicit in epilepſia.)

Kite (K.) über die Wiederherſtellung ſcheinbar todter Menſchen etc. a. d. Engl. von D. C. F. Michaelis. Leipzig 1790. 8. p. 190. (feminam epilepticam, quae triginta quadragintave paroxyſmos per diem [intercedente graviſſimo delirio] experta fuerat, trepanationis ope ſanavit.)

Lyſons (Dan.) Eſſays etc. p. 111.

Marchettis (Petr. de) Obſervat. chirurg. Patav. 1664. (Epilepſiam a vulnere capitis juſto citius clauſo trepanatione ſanavit.)

Motte (de la) Traité complet de Chirurgie. Tom. II. p. 409. obſ. 172. (in epilepſia absque manifeſta cauſa cum levamine adhibuit terebrae uſum. Occluſo vulnere autem rediit epilepſia.)

Rhodii (Jo.) Obſervation. Cent. I. obſ. 66.

Stalpart van der Wiel Obſervat. medic. Cent. I. obſ. 8. p. 36. (epil. a lapſu plenarie ſanata trepanatione.)

Themiſon, v. Cael. Aurel. tard. paſſion. Lib. II. cap. 4. (jam bregmatis perforationem in epilepſia commendavit.)

Tiſſot l. c. p. 246. ſqu.

Troghieri Pilulae catharticae.

Dell' Arme Saggio di Medicina pratica. T. II. p. 92.

Novelle Lettere di Firenze 1762. p. 183.

(℞. Hydrargyr. ℥j. Solv. et exſtingu. c. Therebint. ʒvj. add. Agaric. Extract. Rhei. āā ʒij. Aloes. ſuccotr. ℥iij. M. f. Pilul. quarum ſemidrachma alternis diebus per VI. menſes, deinde per alios VI. quovis quarto vel quinto die dumtaxat data et deſuper hauſto decocto Radic. Valerian. ſylveſtr. feminam epilepticam feliciter perſanavit.)

Trutta Fluviatilis. (an Salmo fluviatilis. L.?) (Oſſa.)

Welſch (Georg. Hier.) Hecatoſt. II. obſ. 90. p. 57. (proficua eſſe in epilepſia infantum.)

Tuſſilago Petaſites. (Radix.)

Swieten (Ger. van), v. Cranz. Mater. medic. T. II. p. 162. (lau-

dat infuſum ex radicis ℥j. et hydromell. ℔j. cujus aliquot unciae omni mane jejuno ſtomacho diutius potandae, ſubjuncta bis vel ter de menſe medicina laxante.)

U.

Ulcera arte facta. (cfr. Cauterium, Granticul. Setaceum. Uſtio. Veſicatoria.)

Bromfield (Will.) chirurgical obſervations and Caſes. T. I. London 1773. (Ulcera arte facta in epilepſia a ſero in capitis laeſione extravaſato in partem poſteriorem ſuturae ſquammoſae ſic dictum additamentum ſuturae temporalis applicata utiliſſima putat.)

Maurer (F. G.) Comm. de medicam. antepilept. p. 37.

Umbilicus hominis, v. *Homo.*

Unctio.

Albertini, v. Jo. B. Morgagni Opuſcul. miſcell. Venetiis 1763. p. 77. (olei amygdalor. calefacti magno cum levamine tentata.)

Celſus (Aur. Corn.) de Medicina. Lib. III. cap. 23. Edit. Almelov. p. 174. (olei, adjecto aceto et nitro.)

Tiſſot l. c. p. 390. (non plane eſſe rejiciendam.)

Unguentum antepilepticum.

Spina (D. de) l. c. p. 1033.

(℞. Cinnab. nat. ℥ß. Lap. Ophit. ℥jß. Magnet. ʒij. Olei deſtill. macis. expreſſ. nuc. moſch. deſtill. Guajac. Coryl. āā gtt. iij. Confect. Alkerm. de Hyacynth. āā ℈ß. Ungu. de Alabaſtr. qu. ſ. F. Ungu.)

Ungula Alces, v. *Cervus Alces.*

Unicornu foſſile.

Boodt (B. de) de Lapid. et gemm. L. II. cap. 242.

Grubel (J. G.), in E. N. C. Dec. II. Ann. VIII. obſ. 36.

Kovacs Tatai l. c. p. 118. (Unicornu foſſile, quod in ſpecu Baumanniano reperitur contra epilepſiam uſitatum.)

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 706.

Unzeri Liquor viridis, v. *Argentum.*

Urina humana, v. *Homo.*

Urina

Urina Suis, v. *Sus ſcrofa.*
— — *vaccae*, v. *Bos Taurus.*
Urſus Arctos. (*Fel.*)
Waenerberg, v. kongl. Svensk. Vet. Ac. Handl. för År 1765. Stockholm 1765. p. 324. (in comitiis 1756. remedium antepilepticum obtuliſſe e felle urſi et floribus liliorum convalliorum.)
Teſticuli.
Plinii Hiſtor. natur. L. XXVIII. cap. 10.
Urticatio.
Miccoli (Joſeph.), vid. Erneſt. Setti (Medic. Doctor. Correggiani) Diſſ. de urticatione in L. Brugnatelli Bibliotheca fiſica. Tom. XI. Pavia 1789. n. 6. (feliciter eam adhibuiſſe in epilepſia obſtinata.)
Uſtio. (cfr. Moxa.)
Albucaſis Chirurgicor. Lib. I. (uſtionem jam commendat in epilepſia.)
Beaumes l. c. p. 349. ſqu.
Bernais (du), in Journ. de Medecine. 1790. Fevrier. (inefficacem fuiſſe.)
Comte (de la), in Journ. de Medecine. T. LXXVII. p. 53.
— — — — — — 1789. Novbr. n. 9.
Delius (H. Fr.), reſp. J. P. J. Rudolph, D. de cranii uſtione in epilepſia. Erlang. 1768. vid. Balding. Auszüg. T. I. p. 44. (exempla felicis ſucceſſus collecta. Periculum Vindobonae a Cl. de Haen factum male ſucceſſiſſe, quod tegumenta fuerint remota et reſecta.) (cfr. cit. de Haen.)
E. N. C. Dec. I. Ann. II. obſ. 9.
— — — II. Ann. V. obſ. 155.
Foreſt. (Petr.) Obſervat. Lib. X. obſ. 61. (nuchae et calvariae.)
Haen (Ant. de) Rat. medend. P. VI. p. 254. (periculoſiſſimam eſſe habendam; imo lethalem eſſe expertum. cfr. cit. Delius.)
Heiſter (Laur.) Inſtitut. chirurg. P. II. p. 38.
Lamzweerde (Jo. B.) App. ad Armament. medic. chirurg. p. 133. (cranii.)

Marcell. Donat. de medic. hiſtor. mirab. Lib. II. cap. 4. p. 149. (cranii.)

Marles (Rich.) et Fr. Pijart D. Ergo epilepſiae πυρότικα. Paris 1622.

Maurer (F. G.) Comm. de medicam. antepil. p. 37.

Meekren (Job van) Heel- en geneeskondige Anmerkingen. Amſterdam 1668. 8. Cap. 5. p. 45. (epilepſia cauterio ad coronariae et ſagittalis ſuturae concurſum admoto ſanata.)

Mercuriis (Scip. de) degli errori populari d'Italia. Venet. 1603. 4. Lib. VI. (Florentinos ad epilepſiam avertendam infantibus mox poſt partum nucham adurere.)

Panaroli (Domin.) Jatrologism. Pentecoſtae V. Romae 1652. 4. Pent. II. obſ. 39. Pent. IV. obſ. 37. (abuſum cauterii in nucha vituperat.)

Piſo (Car.) de morbis capitis. S. II. P. II. cap. 8. (nuchae uſtionem laudat.)

Praxagoras, v. Cael. Aurelian. tard. paſſion. Lib. II. cap. 4. (jam uſtionem in epilepſia commendavit.)

Rochard, in Journ. de Medecine. 1789. Aout. n. 5. (laudat.)

Schenk (Jo.) Obſervat. Lib. I. obſ. 233. (varia felicis ſucceſſus exempla.)

Sennert (Dan.) Paralipom. ad Lib. I. Medic. pract. n. 14. (uſtio pollicis pedis cum fructu tentata.)

Severini (Marc. Aur.) de efficac. medic. L. III. Francof. 1671. fol. p. 212.

Themiſon, v. Cael. Aurelian. tard. paſſ. L. II. cap. 4. (jam laudat eam in epilepſia.)

Tiſſot l. c. p. 243 et 379. ſqu.

Tulpii (Nicol.) Obſervat. medic. Lib. I. cap. 56. (nuchae.)

— — — Lib. IV. cap. 3. (pollicis pedis.)

Zechii (Jo.) Conſultat. medicin. Romae 1601. 4. (cauterium admovet inter primam et ſecundam vertebram.)

V. Va-

V.

Valeriana officinalis. (Radix.)

Andree Caſes of Epilepſy. p. 262. (ex ejus uſu ventriculum labefactari.)

Anſiaux Obſervation ſur une epilepſie epidemique guerie par l'uſage de la racine de Valeriane, in Eſprit des Journaux. T. XI. Paris 1785. p. 355 et 377. (laudat.)

Aretaei diuturn. curat. Lib. I. cap. 4. (jam epilepticis commendat.)

Beaumes l. c. p. 203. (variorum laudes de ejus uſu collectae.)

Bergii Mater. medic. e regno vegetab. T. I. p. 31.

Bouteille, in Journal de Medecine. Tom. L. (praecipue in Epil. a ſaburra primarum viarum et vermibus. Interdum autem ſpem quoque fallere.)

Burſerii Inſtitut. medic. pract. T. III. ed. Lipſ. p. 84.

Cannengieſſer D. de epilepſia. Lugd. Batav. 1672.

Chomel Abregé de l'hiſtoire des plantes uſuelles. T. I. p. 71 et 228. (plures epilepticos ſe ea ſanaſſe refert.)

Columna (Fab.) Phytobaſanos. Napoli 1592. 4. p. 97. (ſe ipſum ejus ope ab epilepſia liberavit.)

Comparetti (Andr.) Occurſus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum. Venetiis 1780. 8. p. 303. (ejus efficaciam affirmat propriaque experientia edoctus ſtatuit, eam iis eſſe proficuam, quibus ſunt fibrae craſſae et laxae; inutilem vero, imo noxiam, graciliorem tenſamque fibram habentibus.)

Crüger (Dan.), in E. N. C. Dec. II. Ann. VII. obſ. 78. (epilepſiam ex terrore eandemque ab ira ejus uſu profligavit.)

Cullen (Will.) Treatiſe of Mater. medic. p. 372. (Saepius efficacem reperit.)

Cullen (Will.) Anfangsgr. d. Arzneiw. T. III. p. 187. (maximam partem antiſpasmodicorum e regno vegetabili depromptorum inefficacem eſſe et non ſperandum, fore, ut vires radicis Valerianae a multis laudatae experientia confirmarentur.)

Diſpenſator. Fuldenſ. p. 40. (laudat. Effodiendam eſſe menſe Martio, antequam caulem edidit.)

Gg 2 Dres-

Dresky (Guil.) D. de Valeriana officinali. Erlangae 1776.
Feurſtein (J. H.) Diſſ. cit. p. 66.
Fothergill, in Medical Obſervat. and Inquir. Vol. VI. London 1784. (cauſam epilepſiae praecipue in ventriculi diſtenſionem ejusque et inteſtinorum repletionem ſtatuens, Valerianae ſimiliumque medicamentorum ſalutarem effectum ab aegrotorum iis imminuto appetitu derivat.)
Friborg, v. Tode medicin. Bibl. B. I. p. 117.
Groſſin Dühaume Traité de petite verole, augmentée d'une Traité ſur les remedes domeſtiques. à Paris 1779. 8. p. 507. (laudat.)
Haen (Ant. de) Rat. med. P. V. c. 4. §. 2.
— — — P. VI. p. 317. (efficaciae exempla.)
Haller (Alb. ab) Hiſtor. ſtirp. helvet. p. 92 et p. 210. (laudat.)
Hill von d. Tugenden d. Baldrians; a. d. Engl. Nürnberg 1765.
Hirſchel (L. E.) Gedank. über d. Heil. d. fall. Sucht. ed. ſecunda. p. 34. (cortici peruviano eſſe poſtponendam.)
Lentilius (Roſ.), in E. N. C. App. ad Dec. III. Ann. III. p. 86. (feminis ex obſtructione menſium epilepticis praeſertim conducere.)
Locher (Max.) Obſervat. pract. p. 40. (initio levamen quidem attuliſſe, paulo poſt autem priſtinum malum eadem vehementia repullulaſſe.)
Marchant, in Mémoir. de l'Acad. des Scienc. à Paris 1700. p. 335. (pluribus epilepticis cum fructu dedit.)
Maurer (Fr. Guil.) Comm. de medicam. antepil. p. 13. ſq.
Mead, v. Mead Electuar.
Medizin. Wochenblatt. 1781. n. 21. (adhibitis jam antea anthelminticis cum fructu in epil. propinata.)
Panaroli (Dominic.) Jatrologiſm. Pentecoſt. I. obſ. 33. p. 20. (Sanationis ea peractae exempla.)
Pfündel, in C. W. Hufeland, Journal der pract. Arzneiw. B. II. St. 2. p. 256. (in connubio viſc. querni et infuſi theiform. folior. aurantior. cum fructu data.)
p. 281. (in viſci connubio.)

Plan-

Plancus (Jan.), in Annotat. ad Fab. Columnae Phytobaſanum. (ſolam efficaciam in epil. verminoſa ei tribuit.)

Quarin (Joſ.) Animadverſ. practic. p. 25. (praeſtantiſſimum longe remedium eſſe.)

Riverii (Laz.) Prax. medic. Lib. I. p. 62.

Sauvages (Boiſſ. de) Noſol. method. T. III. P. II. p. 231. (epilepticum per XII. annos ſub quolibet veneris exercitio paroxyſmo correptum ea ſanaſſe.)

Schacht (Joh. Ooſterdyk.) Inſtitut. medic. pract. Traject. ad Rhen. 1767. 4. p. 64. (efficaciſſimum eſſe remedium antepilepticum.)

Schuchmann (Chriſtoph.), in E. N. C. Dec. II. Ann. IV. obſ. 44. p. 116. (epilepſiam ex terrore ortam ejus ope ſanaſſe.)

Scopoli Flora Carniol. p. 347. (epil. ex terrore ea ſanavit.)

Sebitz (Melch.) Conſpect. Medic. pract. P. II. Sect. II. c. 4. p. 278.

Selle neue Beiträge. Th. I. (laudat.)

Spiefs (J. G.) D. de Valeriana. Helmſtad. 1724.

Sprengel (K.), in Annot. ad W. Buchan. Hausarzneikunde; aus d. Engl. Altenburg 1792. (principem eſſe antepilepticorum.)

Sylvii (de la Boe) Opera omn. p. 427. (paeoniae praefert.)

Thilenius medic. chirurg. Bemerk. Frankfurt am M. 1789. p. 129. (multos ea ſanaſſe.)

Tiſſot l. c. p. 285. ſqu. (primum locum inter ſic dicta ſpecifica antepileptica tenere. Contra Cl. Andree contendit, minime ejus uſum debilitare digeſtionis organa. Initio quidem majori doſi ſumtam producere anxietatem, quod autem evitari poſſe, ſi in minori doſi et in pulveris florum macis connubio propinetur.)

Tode (Jo. Clem.) Diſſ. ſiſt. praeſtantiſſimam rationem illuſtrandi materiam medicam practicam. Havniae 1778. (absque ſucceſſu datam eſſe.)

Unzer Beſtätigte Beobachtungen v. d. Mittel des Fabius Columna wider die fallende Sucht. v. Geſellſchaftl. Erzählungen. St. 64. et N. Hamburg. Magaz. B. XVIII. St. 103. p. 74—83.

Whytt (Rob.) von d. Nervenkrankheiten. p. 513. (in mentis alienatione cum epilepſia juncta proficuam fuiſſe.)

Willis (Thom.) Tr. de morbis convulſivis. c. 24.

Oleum deſtillatum.

Sagar (Jo. Mich.) Syſtema morbor. ſymptom. Viennae 1771. p. 39. (ſummum in epilepſia remedium eſſe.)

Thilenius medicin. chirurg. Bemerkungen. p. 131. (juvenem ex terrore epilepticum hocce oleo ſanavit.)

Valeriana Phu. (Radix.)

Bergius Materia medica e regn. veget. T. I. p. 31. (amaritie et foetore ſuperare praecedentem.)

Linnée Amoenitat. academ. P. II. p. 135. (officinali longe praeſtantiorem eſſe.)

Scopoli Annus Hiſtor. natur. IV. p. 141. (epilepticis commendat.)

Venaeſectio.

Arcelin (Petr.) Quaeſt. medic. an epilepſiae rara venaeſectio? affirmat Lud. Gilbert. Boyrot de Joncheres. Paris 1761. 4.

Aſclepiades, v. Cael. Aurelian. Chronic. L. II. c. 4. (jam epilepticis eam commendavit.)

Barbette (Paul.) Prax. Barbettian. Amſtelodam. 1665. 8. p. 93. (epil. ſola venaeſectione et medicam. purgantibus ſanata.)

Beaumes l. c. p. 116. et p. 353.

Bonet (Theoph.) Mercur. compilatitius. Cap. de Epilepſ. §. 5. (in epil. ex terrore proficua erat.)

Burſerii a Kanilfeld Inſtitut. med. pract. T. III. edit. Lipſiae. p. 246. ſqu. (laudatur in Epil. a plethora, haemorrhoidibus menſibus et narium haemorrhagiis ſuppreſſis.)

Cael. Aurelian. tardar. paſſion. Lib. I. c. 4.

Celſus (Aur. Corn.) de Medicina. ed. Almeloven. p. 172.

Diocles Caryſtius, v. Cael. Aurelian. Chronic. L. II. cap. 4. (in epil. a vinolentia et carneo victu orta venam ſecabat.)

Edimburg. Medical Comment. B. VII. p. 72.

E. N. C. Centur. III. et IV. obſ. 132.

— — Decur. III. Ann. IX. obſ. 185.

Fevre (J. F. le) Opera medic. Veruntiae 1737. p. 61.

Friborg, v. Tode, medicin. Bibl. B. I. p. 117.

Graef (Jo. Paul.) D. ſiſt. caſum de motibus epileptico-convulſivis herniae

niae incarceratae ſupervenientibus per venaeſectionem ſublatis. Altorf. 1747.

Hagendorn (Ehrenfr.), in Medicin. ſeptentr. T. I. p. 115. (venae jugularis ſectio cum fructu inſtituta.)

Hoechſtaetter (Phil.) Obſervat. med. Decur. VIII. caſ. 20.

Hofmann (Fr.) D. de vera mali epileptici cauſa. §. 31. (venae jugularis ſectionem commendat.)

Marryat (Thom.) Handb. d. pract. Arzneikunde; a. d. Engl. Leipzig 1793. 8. p. 109. (nunquam in epilepſia venaeſectionem eſſe adhibendam.)

Moor (Barthol. de) Patholog. cerebri. (paſſim commendat.)

Panzani, in Giornale di Medicina. Vol. XIII. Venetiis 1776. (repetita paroxyſmos non mitigavit, ſanguine etſi nimis denſo.)

Pargetes (Will.) Abhandl. über d. Wahnſinn; a. d. Engl. Leipzig 1793. p. 91. (praecipue in epilepſia cum mentis alienatione eſſe proficuam.)

Pechlin (Jo. Nicol.) Obſervat. med. Lib. II. obſ. 30.

Recueil periodique des obſervations de Medecine. T. I. à Paris 1754. 8. p. 403. (Anonymus quidam ventilat quaeſtionem: „Utrum venaeſectio epilepſiae paroxyſmos praecaveat aut potius revocet?“ Quatuor epilepticos in medium profert, purgatione et venaeſectione curatos, quibus omnibus ſub finem curationis venaeſectionem prophylacticam quolibet trimeſtri repetendam feliciſſimo cum ſucceſſu commendavit.)

Richard. (Nicol.) et Phil. Caron. D. Ergo epilepſiae venarum jugularium ſectio. Pariſiis 1689.

Rhodii (Jo.) Obſervat. medic. Cent. I. obſ. 64.

Riedlin (Vit.) Lin. medic. Ann. I. p. 454.

Roſetti, in Epiſt. ad Burſerium. v. Burſerii l. c. p. 248. (in epil. idiopathica cum fructu eam tentavit.)

Sauvages (Boiſſ. de) Noſolog. method. T. I. p. 581.

Severinus (M. Aur.) de efficac. medicinae p. 42.

Themiſon, v. Cael. Aurelian. Chron. Lib. I. cap. 4. (jam eam in epilepſia commendavit.)

Tiſſot l. c. p. 263. ſqu. et 390. ſqu. (ſaepius eſſe neceſſariam, praeſertim in plethoricis.)

Tralles (Balth. Lud.) de vena jugulari ſaepius ſecanda. Lipſiae 1735. p. 181. (venae jugularis ſectionem epilepticis proficuam eſſe.)

Valleriola (Franc.) Obſervation. medicinal. L. VI. Lugdun. Batav. 1581. 8. L. III. obſ. 7.

Zacut. Luſitan. Prax. admir. Lib. I. obſ. 21. 29. 30. et 32.

Veratrum album. (Radix.)

Celſus (Aur. Corn.) L. III. cap. 23. edit. Almelov. p. 172. (commendat emeſin per veratrum album.)

Greding (J. E.) vermiſchte medic. und chirurg. Schriften. Altenburg 1781. p. 30. ſqu. (in epilepſia ambiguo cum ſucceſſu adhibuit hocce remedium. Uſus fuit cortice radicum verno tempore collectarum, rejecta parte interna lignoſa. Initium fecit exigua cum doſi [unius grani cum ſaccharo] intra nychthemerum data ſenſim augendo eam. Extractum Stoerkiana arte paratum quibusdam quoque eſt datum, cui autem pulverem praefert.)

Greding (J. E.) ſämmtl. Schrift. Th. I. n. 6. (exiguam efficaciam ei tribuit.)

Hippocrates περὶ ἐλλεβορισμοῦ, in Oper. ed. Linden. T. I. p. 610.

Mayerne (Th. de) Praxis medic. Lib. I. cap. 3. p. 15. (pulveris radicis gr. iij. robuſtis epilepticis optimo cum ſucceſſu exhibuit, qua doſi vomitum et alvi purgationes excitavit)

Plinii Hiſtor. natur. L. XXV. (cum lacte aut dulci quodam propinatam commendat.)

Schulzii (Jo. Henr.) D. de Helleborismis veterum. Halae 1717. (de ejus apud veteres uſu in morbo comitiali tractat.)

Smyth, in Medical Communications. Vol. I. p. 207. (epilepſiae Tincturae Veratri ope quidem mitigatae, per tempus autem redeuntis exemplum.)

Starke (J. C.) Auszüge aus d. Tageb. d. klin. Inſtit. zu Jena. Jena 1789. p. 176. (cum fructu dedit.)

Themiſon, v. Cael. Aurelian. tardar. paſſ. L. II. cap. 4. (epilepticos helleboro purgavit.)

Vera-

Veratrum Sabadilla. (Semen.)

Loeffler's Beiträge zur Arzn. und Wundarzneiwiſſ. Th. II. p. 616. (laudat.)

Schmucker (J. L.) vermiſcht. Schrift. Th. III. p. 1—45. obſ. 1—6. (laudat, praeſertim in epil. verminoſa. Propinavit Pulv. Sem. Sabadill. Elaeoſacch. foenic. āā ʒ ß. aut ʒ ß. cum melle in forma boli omni mane. Haecce doſis ſuperbib. pot. theiform. fl. Chamom. vomitum alvique dejectiones excitavit. Poſt quatriduum mane et veſpere dedit gr. xv. cum melle ad boli conſiſtentiam.)

Seeliger, in Schmucker. l. c. p. 38. ſqu. obſ. 12. 13. (adultis ℈j — ʒj. cum melle in forma boli omni mane. Continuetur uſus per XIV. dies, interpolato quolibet quinto die laxante rhabarbarino.)

Verbena officinalis. (Herba.)

Act. Erud. Lipſ. Ann. 1699. Septemb. p. 284.

Albert. Magn. de virtut. herbar.

Mizaldi (Ant.) Memorabil. Cent. IV. aph. 26.

Riedlin (Vit.) Lin. medic. Ann. IV. Auguſt. obſ. 10.

Sebitz (Melch.) Manuale ſ. ſpeculum medic. pract. p. 278. (Sole in arietis ſigno habitante, collecta.)

Radix (qua Amuletum, v. Amuleta).

Roſenſtein (N.) v. d. Kinderkrankh. p. 62. (ejus mentionem fecit.)

Veſicatoria.

Aretaei diuturn. curat. Lib. I. cap. 4. (veſicatorii uſum in epilepſia tentavit.)

Beaumes l. c. p. 351.

E. N. C. Cent. I. et II. obſ. 80. (parti, unde aura, applicanda.)

— — Dec. I. Ann. IX. X. obſ. 14.

Gruebel (Jo. Georg.), in E. N. C. Dec. III. Ann. I. obſ. 72. (efficaciae exemplum.)

Mead (Rich.) de imperio ſolis et lunae. C. II. pag. 8. (capiti applicanda.)

Panaroli l. c. Pentecoſt. IV. obſ. 30. (cum fructu ſuturae coronali impoſita.)

Percival Eſſays. Vol. I. p. 183. (laudat in idiopathica.)

Quarin (Joſ.) Animadverſ. p. 21. (ſaepius incaſſum in epil. pedi-ſymptomatica tentata vidit.)

Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. B. II. p. 125.

Septalii (Ludov.) Animadv. et caut. med. L. VI. p. 55. (capiti applicata commendat.)

Serrao (Franc.), in Morgagni epiſt. anat. med. Lib. X. n. 8. (capiti impoſita laudat.)

Tiſſot l. c. p. 243. et p. 385. ſqu. (ulterius de eorum in epilepſia uſu tractat.)

Wepfer de Cicuta aquatica. p. 97. (epilepſiam a dorſo pedis orientem veſicatorio in huncce locum affectum poſito ſanavit.)

Viennenſis, Pulvis antepilepticus niger.

Pharmacopoea Wirtemberg. 1741. p. 261.

(℞. Rad. Paeon. ℨx. Dictamn. alb. Viſc. quern. āā ℨv. Lign. Aloes. Sem. Paeon. āā ℨiij. Corall. rubr. ppt. Matr. perlar. āā ℥ß. Ungul. Alc. ℨiij. Succin. alb. ppt. Unicorn. marin. āā ℨij. Carbon. Tiliae ℥ß. F. pulv. ſubtiliſſ. add. Folior. Aur. n. xx. Doſ. in tenellis gr. v — ℈ß. in adultioribus ℨß.)

Vinum antepilepticum Michaelis, v. *Michael.*

— — — *purgans Waldſchmidtii*, v. *Waldſchmidt.*

Vinum bugloſſatum, v. *Anchuſa officinalis.*

— — *Rhenanum* (*externe*).

Roſenſtein (N.) von d. Kinderkrhten. p. 61. (infantes epilepticos panno, hocce vino calido humectato, involvendos eſſe.)

Viola odorata. (Flores.) (id quod purpurei coloris eſt in flore.)

Dioſcorides. L. IV. cap. 105. et 122. (pueris comitialibus commendat.)

Mediolano (Jo. de) Schola Salernitana. edit. Ratisbon. 1722. 12. p. 292.

Plinii Hiſtor. natur. Lib. XXI. cap. 19.

Viola tricolor. (Herba.)

Haaſe (Aug.) D. de Viola tricolore. Erlang. 1782. caſ. 15. (epilepſia infantis ſeptem menſium ejus ope profligata. v. Samml. f. pract. Aerzte. B. VIII. St. 2. p. 329.)

Mat-

Matthioli (Jo.) Comment. in Dioſcorid. p. 822.

Theodori Kräuterbuch. Th. II. p. 691. (vires antepilepticas ei tribuit.)

Vipera.

Caro.

Galen. de locis affect. Lib. II.

— — de ſimpl. medicam. facultat. L. II. (epilepticis proficuam eſſe.)

Oſſa, v. *Amuletum.*

Virgatio.

E. N. C. Dec. III. Ann. VII. et VIII. obſ. 187.

Viſcum album (inprimis quernum). (Lignum.)

Andrée (John) Caſes of Epilepſy. p. 261. (ſemel tantum ei ſatisfecit.)

Baier (Jo. Jac.) D. de Viſco. Altorf. 1706.

Bergii (P. J.) Mater. medic. e regno vegetabili. T. I. p. 789. (dubium eſſe.)

Borelli (Jo.) Obſervat. medic. Cent. II. obſ. 96. (efficaciae exemplum.)

Boyle (Rob.) Uſefullneſs of experim. philoſ. p. 174. (epilepſia haereditaria pulveris ℥j. omni mane prope plenilunium cum aqua ceraſorum ſumta ſanata.)

Buchwald (Balth. Jo. de), reſp. Mackerang, D. ſ. analyſin Viſci ejusque in diverſis morbis uſum. Hafniae 1753.

Cartheuſer (Jo. Fr.) Fundam. mater. med. T. II. Francof. ad Viadr. 1767. p. 528. (laudat.)

Colbatch (Jo.) Diſſertation concerning Miſleto a moſt wonderful ſpecifick remedy for the Cure of convulſive diſtempers. Edit. 3. London 1723. Joh. Colbatch's Abhandl. v. d. Miſtel und deſſen Kraft wider die Epilepſie; a. d. Engl. mit Anm. u. Zuſätzen eines teutſch. Arztes. Altenburg 1776. 8. (Prae reliquis maxime hocce remedium celebravit Cl. Colbatch. Dedit vel ſolum in pulvere ſive bolo cum Syrupo Paeoniae ad ℥ß. ſupraque ſive qua infuſum vel Aſa foetida ſive alio medicamine mixtum. Ipſe tamen fatetur, in epilepſiis magis inveteratis vel quando cauſa quaedam

 per-

pertinax remotior alicubi haerens ad morbum vellicat, nonniſi levamen afferre.)

Cole (Guil.) Conſil. aetiolog. de caſu quodam epileptico. London. 1702. 8. (Viſcum commendat.)

Cullen (Will.) Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. p. 183. (nunquam ejus efficaciam expertus in magna tamen doſi aliquid praeſtare ſtatuit.)

E. N. C. Cent. VI. obſ. 58. (efficaciae exemplum.)

Eraſti (Thom.) Diſputat. IV. p. 140.

Gordon Lilium medicinae. Venet. 1496. fol. 119. b.

Haen (Ant. de) Rat. medend. P. V. Cap. IV. §. 2. (Valerianae et Paeoniae aequiparat.)

Hannes (C. R.) de puero epileptico etc. p. 39. (Agyrtam quendam Erfordienſem arcani inſtar cum felici ſucceſſu viſcum exhibuiſſe.)

Hartmann (Jo.) Prax. chymiatr. p. 20. (corylinum praecipue commendat.)

Jacobi, v. Vogel medic. Bibl. B. I. p. 363.

Koelderer (Jo. Georg.) D. de Viſco. Argent. 1747. p. 23.

Kovacs Tatai l. c. p. 123. ſqu.

Lemnius (Lev.) de mirac. occult. natur. p. 148. (laudat.)

Lewis (Will.) experiment. hiſtory of mater. medic. p. 574. (virtutes ejus negat.)

Linden (Ditr. Weſſel) vier chemiſche Abhandl. N. III. von d. beſondr. Kraft der Miſtel gegen Epilepſie; von d. Verfaſſer a. d. Engliſch. überſ. und erläutert. Amſterdam u. Leipzig 1771. 8.

Löſeke (Fr.) Abhandl. von auserleſ. Arzneim. Vierte Aufl. p. 400. (pulveris ʒß. omni trihorio data, juncto decocto ejus pro potu ordinario, duos epilepticos ſanavit.)

Maurer (Fr. Gu.) l. c. p. 29. (non plane eſſe rejiciendum.)

Moor (Barth. de) Pathol. cerebr. p. 74. (exiguam ei tribuit efficaciam.)

Paracelſus (Theophr.) de caduco. p. 602. (Aſtro aſcendente eſſe propinandum. Ob hujus regulae neglectum tam ſaepe nil juvare.)

Pfündel (Chr. Fr.) D. de ſpasmis tonicis viſco perſanatis. Jenae 1783.

Pfün-

Pfündel (Chr. Fr.), in C. W. Hufeland Journal. B. II. St. 2. p. 256. et 281. (cum fructu in connubio Valerianae adhibitum.)

Plinii Hiſtor. natur. L. XVI. cap. 45. et L. XXIV. cap. 4.

Quarin (Joſ.) Animadverſ. p. 22.

Swieten (Ger. v.) Commentar. §. 1084. (laudat.)

Tiſſot l. c. p. 301. (etſi non magnam, tamen quamdam, ei tribuit efficaciam in mucilagine et tonico principio quaerendam et decoctum ejus Valerianae propinatae ſuperaddit.)

Tode (Jo. Cl.) D. ſ. praeſtantiſſimam rationem illuſtrandi materiam medicam. Havniae 1778. (absque ſucceſſu datum eſſe.)

Vogel Hiſtor. mater. medic. Ed. ſecund. p. 279.

Vitrioli Acidum. (cfr. Halleri Elixir acidum. Hartmanni Spirit. antepil. Vitriol.)

Quercetani (Joſ.) Tetras. p. 360. (in acido Vitrioli eſſe vim magneticam, per quam epilepſiam ſanat.)

Naphta Vitrioli.

Friborg, in Tode medicin. Bibl. B. I. p. 117.

Oleum Vitrioli dulce.

Panaroli (Dominic.) Jatrologism. Pentecoſt. II.

Spiritus Vitrioli.

Agricola (Jo.) Comment. in Poppium de Vitriolo. p. 386.

Cnofell, v. Tiſſot l. c. p. 361.

Heers (Henr. ab) Obſervat. medic. obſ. 18.

Paracelſus (Theophr.) de morbis ament. L. II. p. 499.

Roſenberg (Jo. Car.) Roſa nobilis iatrica. Argentor. 1624. 12. cap. 30.

Ruland (Mart.) Curat. empiric. Cent. VI. obſ. 96.

Sala (Angel.), v. Tiſſot l. c. p. 361.

Spiritus Vitrioli antepilept. Brandenburg.

Spina (Dav. de) l. c. p. 896.

(℞. Vitriol. hungar. ad albed. calcin. et pulv. ℔iij. Limat. Cran. human. violent. mort. peremt. Raſur. Ungul. Alc. Corn. Alc. Cerv. cum cran. Corall. rubr. ppt. Viſc. quern. Sem. Paeon. āā ℥ij. M. ac retort. inde affund. Spirit. Vin. rect. qu. ſ. ℔ iij -- iv.

tum

tum igne aperto aut balnei ſicci, quod tutius gradatim adhibito ac ſucceſſive aucto ad candeſcentiam usque retortae omnimodam ſpiritus omnes elice. Spiritum egreſſum ex arena rectific. eique adde Sal. Paeon. Rutae, Succin. volat. āā ℥j. Digere per menſem et circulant. donec exacte uniantur vi.)

Vitriolum album.

Johnſon, in Medic. and Philoſ. Comment. of Edinburgh. Vol. V. p. 311. (granis v. pedetentim xij. bis de die exhibitis absque moleſtia ſuperaſſe epilepſiam, jam per tres annos ſingulis quatuordecim diebus infeſtantem et efficaciſſimis remediis reſiſtentem. Diutius autem eſſe continuandum.)

Lettſom, in Memoirs of the Medical Society of London, inſtituted in the Year 1773. Vol. III. London 1792. n. 18. (ejus ope in connubio Corticis peruviani et Limaturae martis epilepſiam ſanaſſe.)

Pearſon, v. Samml. auserleſ. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIII. p. 574. (praecipitatum ex eo florum Zinci loco commendat.)

Vitriolum caeruleum.

Cullen (Will.) Treatiſe of mater. medic. Vol. II. p. 24. (a quarta grani parte usque ad gr. j. bis de die ſenſim augendo doſin, ita ut nauſeam moveat, propinandum et diutius continuandum.)

Heers (Henr. ab) Obſervat. rarior. obſ. 18.

Heredia (Petr. Mich. ab) Illuſtrat. et obſervat. medic. obſ. 14.

Schulze (J. H.) Theſes de mater. medica. Halae 1736. 8. p. 33. (gr. j — ij. in aqua ſolut. in infantum epilepſia commendat.)

Cuprum ammoniacum. (ſ. Cryſtalli Cupri, ſ. Sal antepil. Weismanni.)

Beaumes, in Journ. de Medec. et Chirurg. T. LXX. 1787. Februar. p. 273. (efficaciae exemplum.)

Bland (Thom.), in Duncan Medical Comment. T. VII. p. 300.

Causland, in Duncan Medical Comment. T. VIII. p. 213. (efficacem eſſe medicinam, nauſea autem et vomitu, quos ciet, aegris magnopere moleſtam.)

Chandelier, in Journal de Medecine. T. XI. p. 45. (in quatuor epilepticis inane fuiſſe.)

Cul-

Cullen (W.) Treatiſe of Mater. medic. Vol. II. p. 25. (Si per menſem continuatum non juvet, abſtinendum eſſe ab ejus uſu, ob timendam venenatam cupri qualitatem.)

Duncan (Andr.) Krankengeſchichten nebſt einigen Bemerkungen; a. d. Engl. Leipzig 1779. 8. p. 1 et 12. Anmerkung. p. 200. ſqu. (cum fructu in epil. adhibuit.)

Feurſtein (J. H.) Diſſ. cit. p. 72. not. l. (hujus remedii efficaciam e vi emetica, irritante et derivante declarare ſtudet.)

Gmelin (Jo. Fr.) Appar. medicam. e regn. miner. T. I. p. 137. ſqu. (a quarta unius grani parte ſenſim ad gr. j — iij. aſcendendo propinatur, donec aegrotus primos vomitus prodromos experiatur, ſive aqua ſimplici ſolutum, ſive cum quinque partibus micae panis et ſpiritu ſalis ammoniaci qu. ſ. in pillulas redactum [Pilulae caeruleae. v. Pharmac. Edinb. p. 118.]. Iis maxime convenit, qui debilitate, relaxatione et nimia irritabilitate laborant, non perinde plethoricis, niſi per evacuantia, vitae genus accommodatum et refrigerantia obſtaculum iſtud ſublatum ſit.)

Maurer (F. G.) l. c. p. 21.

Michaelis Medicin. pract. Bibl. B. I. St. 3. p. 355. (e XIV. Epilepticis quatuor plenarie ejus ope ſanavit morbumque in caeteris mitigavit.)

Pfündel (Chr. Fr.) über d. Gebrauch d. Kupferſalm. in der Epil., in C. W. Hufeland Journ. d. practiſch. Arzn. B. II. St. 2. p. 271. (Puerum XII. annorum jam per triennium epilepticum ejus ope plenarie ſanavit idemque remedium virgini epilepticae XXII. annorum cum levamine dedit.)

Reil (J. C.), reſp. A. Neumann, D. de criſibus genuinis morbis nervoſis peculiaribus. Halae 1792. (Sanatio puellae epilepticae chloroticae ejus ope peracta.)

Thilenius Mediz. und chirurg. Bemerkungen. Frankfurt am Mayn 1789. p. 129. (epilepſiam absque manifeſta cauſa faepius ſuſtuliſſe neque unquam noxam peperiſſe.)

Walker, in Duncan Medical Commentar. for 1785. Vol. X. n. 5. (laudat.)

Weismann, in Nov. Act. Nat. Curioſ. T. I. Norimberg. 1757. 4.

Arti-

Articul. 67. p. 276. (Inventor hujus remedii magnopere illud laudat, praecipue ad profligandam epilepſiam habitualem.)

Weizenbreyer (C. G.) D. de cupro medicato. Erford. 1783. p. 12. 13.

Whithers Bemerk. über die Fehler beim Gebrauche der Arzneimittel. p. 365. (laudat.)

Willan, in Medical Journal. London 1786. Vol. II. n. 13. (laudat.)

Helvetii Tinctura Veneris ſ. antepilepticum puerorum.

Boerhave (H.) Element. Chem. T. II. Proc. CLXXXIX. p. 263. (guttulas pauculas in hydromelle datas jejunis, levi motu, alvi ſubductione nauſeaque inducta mire mutare pigros tenellos ſtomachos, hos excitare, aquam pituitamque educere, vermes necare, quibusque viribus quasdam quoque epilepſiae ſpecies ſanare.)

Helvetius (Adr.) Traité des maladies les plus frequentes et des remedes ſpecifiques pour les guerir. Paris 1704. 12. (ab inventore contra epilepſiam laudata haecce Tinctura amoene caerulea e Spirit. Sal. ammon. et Vitriol. caerul. c. duabus Salis ammon. partibus leni igne prius liquato et in pulverem contuſo parata a gtt. iij — x. propinanda.)

Oleum e Sale Veneris.

Willis (Thom.) Patholog. cerebr. p. 187.

Stiſſeri Tinctura Cupri.

Stiſſer (J. A.) Act. Laborat. chemic. in Acad. Julia edit. Specim. I. Helmſtad. 1690. 4. C. 4. (Tinctura ſive viridis, ſive inſtillatis aliquot Spiritus Salis ammoniaci cauſtici guttulis caerulea e Spiritu Vini rectificato a ſublimato cum ſale communi ſale ammoniaco per deſtillationem abſtracto et vitriolo caeruleo contuſo parata, metallici ſaporis, laudatur a gtt. ij — vij. cum Vino Malvatico.)

Vitrum Antimonii ceratum, v. *Antimonium.*

Vulturis Cor.

Macaſii (Jo. Georg.) Promptuar. Mater. medic. p. 11. (laudatur in epilepſia.)

W. Wag-

W.

Wagleri (Judicis Kunersdorfienſis prope Annabergam)

Remedium antepilepticum.

Reichsanzeiger. 1796. Auguſt. p. 5705. (ad hujus remedii promulgationem provocatur.)

Waldſchmidtii Tinctura antepileptica.

Spina (D. de) l. c. p. 975. X

(℞. Tinct. Lunae ℥ß. Succin. ℥ij. M. f. Tinct. Doſ. gtt. xv.)

Waldſchmidtii Vinum antepilepticum purgans.

Spina (D. de) l. c. p. 1014.

(℞. Rad. Paeon. ℥ij. Herb. Primul. Veris. M. j. Flor. Paeon. Lil. convall. Tiliae P. iij. Rad. Helleb. nigr. ℥j. Rad. Jalapp. ℥ß. Cardamom. Cubeb. āā ʒjß. Sem. Paeon. ʒj. Aſperg. Spirit. epilept. incluſ. nod. et immitt. in Vinum.)

Wallenſtein (Lib. Bar. a) Pulvis antepilepticus.

Bierling (C. Th.) adverſaria. p. 114.

Weikhardti Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 762.

(℞. Rad. Paeon. decreſcente luna collect. ℥j. Sem. Paeon. maſc. excortic. ℥ß. Ungul. Alc. ʒiij. Succ. alb. C. C. uſt. ppt. āā ʒij. Margar. ppt. Corall. rubr. ppt. āā ʒj. Stercor. Pavon. ℈iv. Lap. Bezoar. orient. ʒj. Unicorn. ver. ℈ij. Limat. Aur. Hungar. ʒj. Croci. ℈j. Man. Chriſt. perlat. ℥ß. M. F. Pulv. ſubtiliſſ. addendo Ol. ſtill. Macis. ʒß. Doſ. ℈ß. — ʒß.)

Weismanni Pulvis anodynus.

Hofmann (Fr.) Medicin. ration. ſyſtem. T. IV. P. III. C. I. p. 21.

Weismanni Specificum antepilepticum, v. *Vitriolum caeruleum.*

Willichii Arcanum antepilepticum.

Willich (Chr.), in Thom. Bartholini Epiſtol. medicinal. 1662. n. 69.

Wismuthum nativum.

Aqua Wismuthi.

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 913.

Magiſterium.

Carminati Opuſc. therapeutica. Ticini 1788. (dedit gr. j — ij. bis, ter, quaterve de die cum levamine aegri.)

Odier, in Journ. de Medecine. T. LXVIII. Juill. 1786. (nihil effeciſſe in epilepſia.)

X.

Xenocratis Medicamentum contra epilepſiam.

Alexand. Trallian. Lib. I.

Z.

Zincum.

Calx Zinci praecipitata.

Neumann (Caſp.) Praelection. chemic. p. 1870. (laudat.)

Flores Zinci.

Ackermann, in annot. ad verſ. germ. Tiſſot. l. c. p. 356. n. 76.

Armbrecht, in Müller et Reichard mediz. Wochenbl. Th. VIII. (eorum uſu epilepſiam verminoſam adjuncto decocto rad. Valerianae et flor. Arnicae profligavit.)

Arnaud, in Journal de Medecine. T. LXXV. Juill. 1788. (laudat.)

Beaumes l. c. p. 203. (laudat pluresque obſervationes citat.)

Beireis, v. Hurlebuſch Diſſ. cit. p. 35. (laudat.)

Bell, in Medical Commentar. of Edinburgh. Vol. I. P. II. p. 126. (quotidie ad gr. xxxvi.)

Carminati (B.) Opuſcul. therapeut. Vol. I. Paviae 1788. 8. n. 2. (Nullum effectum ab eorum uſu obſervaſſe.)

Crell, v. Hurlebuſch Diſſ. cit. p. 37. et Martini Diſſ. cit. p. 50. (laudat.)

Cullen (W.) Anfangsgr. d. Arzneiw. Th. III. p. 186. (nunquam eos efficaces expertum eſſe.)

Dehne (B.), v. Martini Diſſ. cit. p. 56 — 62. 64. (efficaciae documenta.)

Duroi

Duroi (B.), v. Martini, Diſſ. cit. p. 76. (abſque fructu exhibuit epileptico.)

Feurſtein (J. H.) Diſſ. cit. p. 74.

Foucquet, in Gardane Gazette de Santé. 1775. (efficaciae exemplum.)

Gaubii (H. D.) Adverſar. var. argum. Lugd. Batav. 1771. p. 113. ſq. (ab empirico quodam Amſtelodamenſi [Ludemann] ſub nomine Lunae ſixatae cum fructu eſſe propinatos. Se ipſum quoque eorum efficaciam eſſe expertum.)

Goodſer, in Medical Comment. of Edinburgh. T. I. P. IV. (profuiſſe ei in epilepſia.)

Haigarth, in Duncan medic. Comm. Vol. III. P. II. p. 187.

Hart (Jacob) De Zinco ejusque florum uſu medico obſervationibus confirmato. Lugdun. Batavor. 1772. (efficaciae documenta.)

Hartmann (P. J.) D. ſiſt. quaeſtiones medicas ſuper florum Zinci uſu interno. Francofurt. ad Viadr. 1778. (paroxyſmos interdum eorum uſu auctos eſſe.)

Herz, v. Martini Diſſ. cit. p. 54. (in eclampſia infantum tantummodo intervalla prolongarunt et ipſos paroxyſmos mitigarunt.)

Hirſchel (L. E.) medicin. Nebenſtunden. p. 161. (laudat.)

Hurlebuſch (G. L.) D. Zincum medicum inquirens. Helmſtad. 1776.

Kaempf (Jo.) Enchirid. medic. p. 30. (laudat.)

Lichtenſtein, v. Martini Diſſ. cit. p. 51. (efficaciae exemplum.)

Löffler's Beiträge z. Arzn. und Wundarzn. Th. II. (eorum efficaciam affirmat.)

Martini D. de Zinco medico recent. obſervat. Helmſtad. 1780. (varia efficaciae documenta habet.)

Meglin, in Journal de Medecine. T. LXIX. Decembr. à Paris 1786. (nullum fructum ab iis in epil. adhibitis obſervaſſe.)

Metzger Adverſar. medic. P. II. p. 98. (efficaciae exemplum.)

Meza (Theoph. de) Compend. medic. pract. Faſcic. V. Havniae 1781. p. 7. (interdum efficaces, ſaepius tamen plane inertes fuiſſe.)

Mönch ſyſtemat. Lehre von d. Arzneimitt. Marburg 1789. p. 277. (in epil. a vermibus eorum efficaciam expertum eſſe.)

Muzel, v. Hirſchel medizin. Nebenſt. p. 190. (jam ante quinquaginta et plures annos ſpecifici nomine a multis contra epilepſiam adhibitos eſſe teſtatur.)

Odier, in Duncan Medical Comment. Vol. III. (Interdum bono ſucceſſu, ſaepius tamen incaſſum tentavit.)

Parmentier, in de Garaye Chymie hydraulique pour extraire les ſels eſſentiels des vegetaux. à Paris 1775. (efficaciam affirmat.)

Percival, in Duncan Medical Commentar. Vol. II. P. II. p. 257. (quotidie ter gr. v. cum fructu dedit.)

Ponche, in Journal de Medecine. T. LX. p. 311.

Pott, v. Hurlebuſch. Diſſ. cit. p. 40. (efficaciae exemplum.)

Rahlwes, v. Martini Diſſ. cit. p. 76. (nunquam aliquid ei praeſtitiſſe.)

Ranoe, in Act. Societ. medic. Havn. T. I. p. 451. (efficaciam exemplo affirmat.)

Reimarus, v. Martini Diſſ. cit. p. 68. (efficac. exemplo affirm.)

Richter (A. G.) Medizin. chirurg. Bemerk. B. I. Göttingen 1793. p. 140. (efficaciae eorum exempla habet.)

Roboel, in Handelingen van het Geneeskondige Genootſchapp: Servandis civibus. Deel II. 1776. (infantem a tinea capitis retrogreſſa epilepticum eorum ope ſanaſſe.)

Roche (de la), in Journal de Medecine. T. LII. p. 518. 1779. Decembre. (rarius in epilepſia aliquid praeſtitiſſe.)

Rush, in Duncan Medical Commentar. Vol. III. P. I. p. 114. (laudat.)

Starke Einricht. d. klin. Inſtit. zu Jena. Jena 1782. 4. (in epil. a terrore et menſibus ſuppreſſis optimo ſucceſſu propinavit.)

— — — — — — 1784. p. 13. (in epil. a vermibus.)

— — Auszüge a. d. Tageb. d. klin. Inſtit. z. Jena. 1789. p. 89. 178. (efficaciae exempla.)

Stoerk Mediz. pract. Unterricht für Feld- und Wundärzte. Vol. I. p. 348. (laudat.)

Veckoſkrift för Läkare och Naturforskare. Vol. V. Stockholm 1784. (laudat.)

Tinctura Zinci.

Dehne, v. Martini Diſſ. cit. p. 11. (juveni epileptico eam una cum floribus optimo ſucceſſu exhibuiſſe.)

Zwölferi Aqua antapoplectica.

Spina (Dav. de) l. c. p. 28. (infantibus epilepſia vexatis convenire a ʒj — ij. in grato aliquo vehiculo.)

— — — *antepileptica.*

Schroeder Pharmacop. univerſal. p. 138.

— — — — — — *ex avibus deſtillata.*

Schroeder l. c. p. 139.

— — *Electuarium anacardinum.*

Spina l. c. p. 291. (Epilepticis ʒij — ℥ß.)

— — *Extractum antepilepticum.*

Spina l. c. p. 491.

(℞. Rad. Paeon. debit. tempor. collect. Doronici veri āā ℥ij. Zedoariae ℥j. Lign. Viſc. quern. ℥jß. Aloes ponderoſ. Rhodii, Santal. citrin. āā ℥j. Croc. auſtriac. ℥ß. Flor. Paralyſ. Paeon. Tiliae āā ʒvj. Sem. Paeon. ℥j. Bardan. major. ℥ß. Citri ʒvj. Succin. alb. ℥j. Corti Aurant. extim. Raſur. Ungul. Alc. āā ℥ß. Cran. human. ℥j. Incìſa craſſiuſcule et contuſa immittantur cucurbitae vitreae, ſuper quae fundatur Spirit. Vin. rectif. ℔ß. ut ſpecies ſaltem parum humectent; facta autem maceratione per diem unum alterumque deſtillentur in Balneo ℥iij. circiter ſpiritus fragrantis, quo interim curioſe aſſervato in vitro ſatis clauſo, fiat ſpecierum reſiduarum cum ſ. q. Spiritus Vini rectificati extractio, et quidem repetitis vicibus ad virtutum earum plenariam extractionem; Colaturae ſeu Spiritus omnes tincti et filtrati in M. B. abſtrahantur ad remanentiam circiter ℔j. vel ℥x. Hic liquor, cui pauxillum reſinae inhaerebit, coletur per linteum. Reſina in colatorio reſidua leni calore nonnihil exſiccetur, qua interim ſervata, liquor colatus in diplomate ſeu vaſe duplicato ad conſiſtentiam ſpiſſam Extracti evaporet, cui Extracto tandem jungatur ſua Reſina, cum ſuperiori primitus deſtil-

deſtillato et aſſervato Spiritu ſoluta, additisque porro ſubſequentibus, utpote Ol. Nuc. Moſch. expreſſ. ℥ ß. Ol. ſtillat. Cinnam. Lign. Rhodii ää ℈ j. Lavendul. Coriandr. Succin. ää ℈ ß. prius cum Pulv. Sacchar. albiſſ. ℥ j ß. in Elaeoſaccharum converſorum; item: Magiſt. ſolub. Matris Perlar. c. Spirit. Veneris parat. ℈ iij. Magiſter. ſolub. Lapid. Carpion. itid. cum Spirit. Vener. parat. ℥ ij. Fiat Extractum juſtae conſiſtentiae. Doſ. ℈ j — ß.)

Zwölferi Pulvis antepilepticus.

Spina (D. de) l. c. p. 763.

(℞. Pulv. ex typhis Cervi ℥ ß. Unicorn. veri marin. Cran. homin. ſuſpenſ. raſpat. Bezoar. occident. Lapid. ſublun. Carpion. ſupra eorum oculos reperiundorum ää ℈ ij. Vermiculor. in ſpongiis Cynoſtat. inventor. ℥ ß. Ol. ſtill. Cinnam. ℈ j. Caryophyll. ℈ ß. Magiſter. ſolub. Matr. perlar. ℥ ß. F. Pulv. ſubtil. Doſ. ℈ j — ℥ ß.)

Sub Pulveris antepilept. Zwölferi titulo alteram adhuc in eadem pagina tradit formulam:

℞. Nucl. Ceraſor. nigror. ℥ ß. Sem. Paeon. excort. ℥ ij. Citr. excortic. Bardam. ää ℥ j ß. Contundantur ſubtiliſſime in mortario, addita ſemper particula Aquae flor. Aurant. ad pultis formam, ut per ſetaceum tranſmitti poſſint: Cui adde parum antea conquaſſata ſequentia: Nempe Rad. Paeon. debite collect. Doronic. ver. ää ℥ iij. Viſc. quern. Nuc. Moſchat. Cardamom. minor. Croc. auſtriac. ää ℥ ij. Succin. alb. ppt. ℥ iij. Magiſt. ſolub. Corall. rubr. ℥ ij. Cranii human. raſpat. ℥ iij. Ol. ſtillat. Cinnam. ℈ j. Lign. Rhodii ℈ j. F. Pulv. ſubt. Doſ. ℥ ß — ℈ ij.)

Zwölferi Pulvis antepilepticus aureus ſ. ſolaris.

Spina (D. de) l. c. p. 764.

(℞. Croc. Auri cum Tinctura Antimonii fermentat. ℥ ij. Unicorn. foſſil. alb. Unicorn. marin. ää ℥ ß. Cran. homin. ſtrangulat. raſpat. ℥ ij. Pulv. ex typhis vel ſaltem ex junioribus lanuginoſis et mollibus adhuc Cervorum cornubus n. m. parat. ℥ ß. Magiſter.

giſter. ſolub. Matr. perlar. Corall. rubr. āā ʒ j ß. Nuc. Moſchat. ʒ ß. Ol. ſtillat. Cinnam. ℈ j. vel ʒ ß. F. Pulv. ſubtil. Doſ. ℈ j — ℈ ij.)

Zwölferi Pulvis antepilepticus Cervinus.

Spina (Dav. de) l. c. p. 761.

(℞. Flor. Tiliae recent. ℥ iij. Rad. Paeon. recent. dec. r. coll. ℥ ij. Semin. ejusd. excortic. ℥ j. Inciſa et contuſa coquantur in aquae ſimplicis ſ. q. repetitis vicibus affuſae et expreſſae, quousque tota virtus prolectata ſit: Decoctiones expreſſae junctim optime clarificentur et ad ℥ vj circiter evaporentur. Cui relicto decocto ſive extracto liquido cucurbitae vitreae immiſſo, adde Pulv. cervini ſimpl. ex typhis parati ℔ ß. Margarit. Oriental. ppt. ſive earundem ſolutionis menſtruo Zwölfero proprio paratae ℥ j. Corall. rubr. ppt. ſ. eorundem ſolutionis indicato modo menſtruo paratae ℥ ß. Lenta deſtillatione per Balneum Mariae iterum totaliter exſiccentur, ut in Alcohol redigi queant, cui pro aromatiſatione addatur Elaeoſacchar. Cinnamom. ℥ j ß. Olei Coriandr. deſtill. ʒ j. M. F. Pulv. Doſ. ℈ j — ij.)

Zwölferi Species antepilepticae.

Spina (D. de) l. c. p. 849.

(℞. Sem. Paeon. excorticat. ℥ ß. Bardan. ʒ ij. Contundantur minutiſſime in mortario, ad pultis formam, addita ſ. q. aquae florum et radicum Paeoniae ſine addit. ſtillatae ac per cribrum cogantur. Huic pulpae adde Bezoard. cervin. ſimpl. ℥ ß. Rad. Paeon. debit. tempor. collect. Doronic. veri, Nucum Moſchatar. āā ʒ ij. Cranii humani ſubtiliter raſpati, Succin. alb. praepar. āā ℥ iij. Margarit. praep. ʒ j ß. Viſc. quern. Cardamom. āā ʒ ij. Quae omnia leni in calore exſiccentur et in pulverem tandem ſubtilem redigantur. Doſ. ℈ j — ʒ ß.

p. 50. Aliam priori haud abſimilem tradit formulam:

℞. Bezoard. cervin. ſimpl. ſeu Pulv. ex typhis Cervi ʒ vj. Cran. human. ſubtiliter raſpati ℥ ß. Raſur. Ungul. Alcis. ʒ ij. Rad.

Paeon.

Paeon. mar. debit. tempor. collect. Doronic. veri āā ℥ ß. Sem. Paeoniae excorticat. Bardan. Nuc. Moſchat. āā ʒ ij. Magiſter. ſolub. Margarit. oriental. Corall. rubr. āā ʒ j. M. F. Pulv. ſubtil. Doſ. ℈ j — ʒ j.)

Zwölferi Syrupus de Paeonia.

Spina (Dav. de) l. c. p. 934. (epilepticis ℥ ß — j. pro doſi.)

PARS IV.

PARS IV.

BIBLIOGRAPHICA

SISTENS

SERIEM CHRONOLOGICAM SCRIPTORUM DE EPILEPSIA SEORSIM TRACTANTIUM.

Scripta incerti anni.

Ignoti auctoris, Hippocrati olim addictus Liber περὶ ἱερῆς νούσου. v. Haller. Bibl. pract. T. I. p. 69. extat in omnib. Hippocrat. operum editionibus.

Poſidonii Fragmentum de morbo comitiali. v. Aetii L. II. cap. 20.

Theodorus de morbo comitiali citatur a Tralliano. v. Haller. Bibl. pract. p. 183.

Didymi Fragmentum: Quae collabentes comitiales excitant. v. Aetii Tetr. II. Serm. II. cap. 15.

Pelops (Galeni Praeceptor) jam de epilepſia eum egiſſe teſtatur Galen. de loc. affect. L. III. v. Haller. Bibl. pract. T. I. p. 219.

Galeni Documentum de puero epileptico. Extat in omnibus Galeni operum editionibus, e. g. in Charterianae T. X. Seorſim cum nonnullis aliis Galeni libris prodiit Baſil. 1531. v. Haller. Bibl. praet. T. I. p. 262.

* * *

1544. Thiebault (Iean) Treſor des remedes préſervatifs et curatifs de la peſte, des cauſes de la goute de l'epilepſie, de l'apoplexie, de la pleureſie. à Paris.

1548. Roth D. de ortu et cura morbi comitialis. Lipſiae.

1561. Gabuccini Faneſtrini (Hieron.) de comitiali morbo. L. III. Venetiis. 4.

1564. Paracelſi etliche Tractaten vom Podagra, Schlag und fallende Sucht. Cöln. 4.

——— — — Philoſophia ad Athenienſes. Drei Bücher von Urſachen und Cur der Epilepſie. Cöln. 4.

1567. — — de Phyſiognomia morborum, therebinthina et utroque helleboro, morbo caduco etc. Cöln. 4.

1568. — — Pyrophilia vexationumque liber. Accedunt contracturae origines et cauſae. Quatuor morborum capitalium, ſcil. podagrae, epilepſiae, paralyſis et hydropis, curae. Baſileae. 4.

1570. Peuceri (Caſp.) Tractatus de epilepſia, pleuritide, arthritide. Witteberg. 8.

1573. Huguet (J.) et Nicol. Marchant, Ergo epilepſia in omni aetate curabilis. Pariſiis. 4.

1575. Georg. Phaedronis (alias Fedronis) von Rhodach (Rhodochaei) Eleenus ſ. perfecta epilepſiae curatio, tum aquilae coeleſtis ſ. hydrargyri praecipitatio. Baſileae. 8.

—— Tenot (Lazar.) et Philib. Gilles, Ergo epilepſiae febris ſuperveniens curatio. Pariſiis. 4.

1580. Liebault (J.) et Carn. Gerbault, Ergo ingenioſi et libidinoſi epilepſiae obnoxii ſunt. Pariſiis. 4.

—— Val (Ant. du) et Pierr. de l'Ecluſe, Ergo epilepſia ſternutamento ſolvitur. Pariſiis. 4.

1581. Fernelii (Joh.) Conſilium pro epileptico. Francofurt. 8. extat quoque in Ej. Univerſ. Medicina. Lugdun. 1645. 8.

1584. Plateri (Felic.) et Baucynet D. de epilepſia. Baſileae. 4.

—— Steinbach (Joh.) de epilepſia. Baſileae. 4.

1586. Hafenreuter (Jo. Ludov.) Tract. de epilepſia. Argentorat. 4.

—— Planeri (Andr.) Tract. de epilepſia. Tubingae. 4.

1589. Tomaro (Jacob.) de epilepſiae curatione Libellus. Sevillae. 4.

1590. Fichard (Joh.) Conſilium de morbo comitiali. Francofurti ad Moenum. 8.

1592. Nymman (Hieron.) de epilepſia. Witteberg. 4.

1596. Seidel (Jacob.), reſp. M. D. Herlitz et C. Calendo, Theſes de epilepſia. Gryphiswaldiae. 4.

1598. Tacquet (Hieron.) et Bonavent. Hachette, Non ergo in epilepſia Θεῖον τί. Pariſiis. 4.

* * *

1600. Schatonis (Andr.) Theſes de vertigine, epilepſia etc. Witteberg. 4.

1601. Hofmann's (Pet.) Freyſambüchlein, von der Praeſervation und Curation des Freyſams oder Epilepſie an kleinen Kindern. Coburg. 8.

1602. Möller (Sebaſt.) de epilepſia. Francof. ad Viadr. 4.

—— Taxil (Jean.) Traité de l'epilepſie. Tournon. 8.

1603. Alſarii de Cruce (Vincent.) de epilepſia ſ. comitiali morbo praelectionum Bononienſium L. III. Venetiis. 4.

—— Nagel (H.) D. de epilepſia. Baſileae.

—— Warenius (H.) D. de morbis, attonito et ſacro. Roſtochii. 4.

1604. Hoechſtaetter (Phil.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.

1605. Bazin (Sim.) et Char. Bouvard, Ergo epilepſia poſt vigeſimum annum ſanabilis. Pariſiis.

1606. Siglicius (Joh.) περὶ διαγνώσεος καὶ προγνώσεος τῆς ἐπιληψίας. Lipſiae. 4.

1607. Oltermann D. de epilepſia. Roſtochii. 4.

—— Pijart (Pierr.) et Gabr. Breard, Ergo in epilepſia quid occultum. Pariſiis. 4.

—— Rumbaum (Georg.) Tr. de epilepſia. Sedani. 4.

1608. Spieſs (Frid.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.

1609. Mock (Jacob.) Tr. de epilepſia. Friburgi. 4.

—— Siegfried (Jo.) D. de epilepſia. Helmſtad. 4.

1610. Arniſaei (Henning.) D. de apoplexia et epilepſia cognoſcendis et curandis. Francofurt. ad Viadrum. 4.

—— Bazin (Sim.) Non ergo a ſola copia humorum epilepſia. Pariſiis. 4.

—— Helmbach (Jo. ab) D. de morbi ſacri διαγνώσει et θεραπείᾳ. Baſileae. 4.

—— Loeppen (Joach.) D. de epilepſia. Gieſſae. 4.

—— Rex ſ. Koenig (Dav.) D. de morbo ſacro. Baſil. 4.

—— Victoria (Petr. Valent. de) de ſingulari curatione affectus epileptici in praegnante femina. Madriti. 8.

1611. Deckers D. de epilepſia adultorum. Lugdun. Batavor. 4.

1611. Halvegii (Nicol. Estern.) D. de ſacro morbo et igne. Baſileae. 4.

—— Henault (Nicol.) et Guil. Desdames D. non ergo epilepſiae cranium humanum. Pariſiis. 4.

—— Lucii (Jo. Jodoc.) D. de epilepſia. Heidelberg. 4.

1613. Culigii (Chriſtoph.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.

—— Eiſenmenger (Jo. Chriſtoph.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.

—— Petraei (Henr.) D. de epilepſia. Marburg. 4.

1614. Opſopoei D. de epilepſia. Heidelberg. 4.

—— Otter (Frid.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.

—— Sennert (Dan.) de epilepſia. Witteberg. 4.

1615. A Collection of engliſh medicines experienced againſt the jaundice, dropſy, falling ſickneſs and peſtilence. London.

—— Beckh D. de epilepſia. Baſileae. 4.

—— Guenault (Fr.) et Ludov. Robillat D. ergo epilepſiae aetatis mutatio. Pariſiis. 4.

1616. Gesner (Jerem.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.

—— Schroeteri (Phil. Jacob.) Syllabus diſputationis medicae ex tortuoſis, nodoſis et rigidis epilepſiae fraxinis conglomeratae et compactae. Jenae. 4.

—— Untzeri (Matth.) ἱερονοσολογία chymiatrica, i. e. epilepſiae accuratiſſima principia, deſcriptio et curatio. Halae. 4.

1617. Alſarii a Cruce (Vincent.) de morbis capitis frequentioribus, quorum cognitio et curatio traduntur, de catarrho, phrenitide, lethargo et epilepſia. L. VIII. Romae. 4. (Venetiis. 1619.)

—— Carterii (Melch.) Exercitationes in epilepſiam. Toloſae. 12.

—— Joel (Fr.) D. ſiſt. contemplationem dogmatico-hermeticam morbi ſacri. Marburgi.

—— Ramſower D. περὶ διαγνώσεως, προγνώσεως καὶ θεραπείας τῆς ἐπιληψίας. Baſileae.

—— Streiter (Jo. Hulder.) D. de graviſſimo cerebri affectu, epilepſia. Baſileae. 4.

1618. Schaller D. de epilepſia. Witteberg. 4.

—— Sennert (Dan.) D. de epilepſia. Viteberg. 4. (an idem cum praecedente?)

1619. Schroeter D. περὶ ἐπιληψίας. Jenae. 4.

1619. Ziegler (Chriſtoph.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.
1620. Aſtorii D. de epilepſia. Erford. 4.
1621. Heintze D. de epilepſia. Lipſiae. 4.
—— Wolf (Jo.) D. de epilepſia. Helmſtad. 4.
1622. Marles (Rich.) et Fr. Pijart, Ergo epilepſiae πυρέτικα. Pariſiis.
1625. Torraei (Georg.) epileptica conſideratio. Francof. ad Viadr. 4.
1626. Mouram (Didacius) de paſſione hyſterica ſive de epilepſia hyſterica. Orthoſii. 4.
1628. Vega (Petr. de) Gemmula de epilepſia. Extat c. Ejusd. Pace methodicorum cum Spagyricis. Genevae. 12.
1629. Charles (Hugo) et Dyon. Bazin, Ergo epilepſia hydropi ſuperveniens lethalis. Pariſiis.
—— Rolfink (Werner.) D. de epilepſia. Jenae. 4.
1630. Rhümelii (Jo. Conr.) D. de morbo ſacro. Altorf. 4.
—— Rolfink (Werner.) D. de epilepſia. Jenae. 4.
1631. Ponce de Santa Cruz (Anton.) Praelectiones Valliſoletanae in Hippocratis L. de morbo ſacro. Madriti. fol.
1634. Bouche (Honorat.) de morbo ſcelesto, in quo cauſa, ſigna et curatio explanantur. Avenionae. 8.
—— Scharlach (Sam.) D. de epilepſia. Francofurt. ad Viadr. 4.
—— Serna (Joh. Gallego de la) (Malacitani) L. de calculi et epilepſiae in pueris praecautione et curatione. Extat quoque in Oper. omn. Lugdun. fol.
1636. Michaelis D. de epilepſia. Lipſiae. 4.
—— Schilling D. de morbo caduco ſ. epilepſia. Altorf.
—— Tinctorii D. de epilepſia. Regiomonti. 4.
—— Willich (Chriſt. Frid.) D. de epilepſia. Argentorat. 4.
1637. Rolfinck (Wern.) D. de epilepſia. Jenae. 4.
1640. Langlois (Flor) et Euſeb. Renaudot, Ergo epilepſiae et melancholiae haemorrhoides ſalutares. Pariſiis. 4.
—— Maſius (Jo.) D. de morbo ſacro ſ. epilepſia. Regiomont. 4.
—— Rolfink (Wern.) D. de epilepſia. Jenae. 4.
1642. Conring (Herm.) D. de epilepſia. Helmſtad. 4.
—— Slegel (J. M.), reſp. G. Gartz, D. de epilepſia. Jenae. 4.
1643. Beets (Henr. van der) D. de morbo comitiali. Lugdun. Batav. 4.

1643. Guenault (Petr.) et J. Foreſtier, Ergo epilepſiae per conſenſum Aquae Borbonienſes archimbaldicae. Pariſiis. 4.
—— Horſt (Jo. Dan.) D. de epilepſia. Marburg. 4.
1644. Engelhard (Andr.) D. de epilepſia. Franecker. 4.
—— Schellhammer (Chriſtoph.), reſp. Jo. Georg. Macaſio, D. de epilepſia. Jenae. 4.
—— Schoner (Joh.) de epilepſia. Gryphiswald. 4.
1645. Du Cledet, Ergo ab humore bilioſo epilepſia. Pariſiis. 4.
1646. Velden (Petr.) D. de epilepſia. Leidae. 4.
—— Walaei (Jo.), reſp. Jo. de Schafter, D. de epilepſia. Lugdun. Batav. 4.
1647. Langelott (Joel.) D. de epilepſia. Lugdun. Batav. 4.
1648. Sebitz (Melch.) D. de epilepſia. Argentorat. 4.
1650. Manet (Fr.) et J. Ant. Bourgaud, Ergo epilepſiae et melancholiae mutuae vires. Pariſiis. 4.
—— Schneider (C. V.), reſp. Sam. Sturm, D. de epilepſia. Witteberg. 4.
1651. Eggebert (Jo.) D. de epilepſia. Leidae. 4.
—— Lubini (J. E. F.) Bedenken von der Epilepſia, wie dieſe mit gebührlichen Mitteln möge curiret werden. Stralſund. 8.
1652. Rolfink (Werner.) D. de epilepſia. Jenae. 4.
—— Thulemeier (Conr.) D. de epilepſia. Leidae. 4.
1653. Gilgii D. de epilepſia. Baſileae. 4.
1656. Conring (Herm.), reſp. Friſio, D. de epilepſia. Helmſtad. 4.
1657. Fontani (Gabr.) Epitome Tractatus de febribus. Acced. Tetras graviſſimorum capitis affectuum: vertiginis, epilepſiae, convulſionis et apoplexiae. Lion. 4.
—— Hoefer (Wolfg.) Hercules medicus. Tom. I. Vindobonae. 4.
1658. Bindi (Jo. Bapt.) de nova epilepſiae differentia conſultatio. Romae. 8.
—— Brandes (Jo. Dietr.) D. de epilepſia. Ultraject. 4.
—— Coeller (Henr.) Disquiſitio, morbum ſacrum veluti ignotum in republica medica humani corporis hoſpitem, vulgata medicorum de eodem dogmata refellendo ac veram eſſentiam et ſedem declarando, introducens. Gieſſae. 4.
—— Frieſe (Mart. Frid.) D. de epilepſia. Lipſiae. 4.

1659.

1659. Andreae (Tob.) Caſus epileptici. Duisburg. 4.
—— Moebii (Gothofr.), reſp. Theod. Buſſio, D. de epilepſia. Jenae. 4.
1660. Tappe (J.) D. de epilepſia ejusque cauſis contra communem opinionem. Helmſtad. 4.
1662. Petit (Guil.) et Nicol. Rainſſant, Ergo tantum ab habitu epilepſia. Pariſiis. 4.
1664. Moebii (Gothofr.), reſp. Chiliani, D. de epilepſia. Jenae. 4.
—— Schneider (Conr. Vict.), reſp. J. Kockert, D. de morbo comitiali. Viteberg. 4.
1666. Fleiſchhauer (Salom.) D. de epilepſia. Gieſſae. 4.
1667. Nettelbladt (Jo. Chriſt.) D. de epilepſia. Lipſiae. 4.
—— Schneider (Conr. Vict.) D. de epilepſia. Viteberg. 4.
1669. Bultingk (Abrah.) D. de epilepſia. Leidae. 4.
1670. Schneider (Conr. Vict.) D. de epilepſia. Viteberg. 4.
—— Tien (Petr. de) de epilepſia. Neomagi.
—— Weneſteel (Jo.) D. ſiſt. caſum epilepticum. Leidae. 4.
—— Hercules vere cognitus, certus exul; id eſt, Epilepſiae vera dignotio et ejusdem certa curatio, libris duobus comprehenſa, ſtudio et opera Georgii Kovacs Tatai, N. M. K. Nobilis Ungari. Lugdun. Batavor. 12.
—— Daalhemii (Dan.) D. de epilepſia. Ultraject. 4.
1671. Teicher (Jo.) D. de epilepſia. Lugdun. Bat. 4.
1672. Bauhin (Jo. Caſp.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.
—— Bieſter (Jo.) D. de epilepſia. Ultraject. 4.
—— Kanngieſſer (Jo. Dietr.) D. de epilepſia. Lugd. Bat. 4.
—— Mangold (Jo. Georg.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.
—— Riccii D. de doctrina Galeno-chymica tam veterum quam neotericorum circa epilepſiam. Lugdun. Batav.
1673. Wedel (Georg. Wolfg.), reſp. Jac. Roeſer, D. ſiſt. aegrum epilepticum. Jenae. 4.
1675. Hofmann (Jo. Maur.) D. de paroxyſmis frequentioribus et vehementioribus, ſcilicet febrilibus, aſthmaticis, epilepticis, colicis et hyſtericis. Altorf.

1675.

1675. Schoenfeld (Phil. Jac.) Tractat von dem Kinderweh, Frais und Hinfallen, nebſt eilf Regeln an die Hebammen. Ingolſtadt. 8.

1676. Craanen (Theod.), reſp. B. Albino, D. de epilepſia. Lugdun. Batavor. 4.

— Ettmüller (Mich.), reſp. Godofr. Weinlig, D. de epilepſia. Lipſiae. 4.

— Waldſchmidt (Jo. Jac.) D. de epilepſia ſive von der ſchweren Noth. Marburg. 4.

— Wedel (Georg. Wolfg.), reſp. F. W. Gründel, D. de epilepſia. Jenae. 4.

1677. Tilemann (Ad.) dictus Schenk, de epilepſia hypochondriaca. Lugd. Batav. 4.

1678. Kronland (Joh. Marcus Marci a) Liturgia mentis ſive diſceptatio medico-philoſophica de natura epilepſiae, ejusque ortu et cauſis. Ratisbonae. 4. acced. Tract. medicus de urinae natura et Conſilia III. medica.

— Pechlin (Jo. Nicol.) D. de epilepſia et contra eam remediis. Kiloniae. 4.

— Stiſſer D. de epilepſia. Lugdun. Batav.

1679. Faſch (Aug. Henr.), reſp. Joſ. Fuhrmann, D. de epilepſia. Jenae. 4.

— Foſter (Georg.) D. de epilepſia. Lugd. Batav. 4.

— Simon (Berthold.) D. de epilepſia. Lugd. Batav. 4.

1680. Ameldoncii von Forſt D. de epilepſia puerorum. Leidae. 4.

— Arnold (Erneſt.) D. de epilepſia. Erford. 4.

— Camerarii (El. Rud.) D. cur hodie epilepſia inter nos tam frequens ſit. Tubingae. 4.

— Scheitsmeier (Petr.) D. de epilepſia. Ultraject. 4.

— Winneſeil D. ſiſt. caſum epilepticum. Lugd. Batav. 4.

1681. Beddevole (Dominic.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.

1682. Peierlen (J. B.) D. de epilepſia puerorum. Lugd. Bat. 4.

1683. Engelen (Engelb. ab) D. de epilepſia. Ultraject. 4.

— Ettmüller (Mich.) D. de epilepſia. Lipſiae. 4.

— Herrmann (P.), reſp. C. B. Behrens, D. de epilepſia. Lugdun. Batav. 4.

1684. Dietrich (Balthaſ.) D. de epilepſia. Lugd. Batav. 4.
—— Jägerſchmidt (J. V.) D. ſiſt. infantem epilepticum. Altorf. 4.
—— Richter (Chriſtoph.) D. de morbo caduco. Jenae. 4.
1685. Munting (Albert.) D. de epilepſia. Utrecht. 4.
—— Schwartz (W. R.) D. de epilepſia. Lugd. Batav. 4.
1686. Faſch (Aug. Henr.) D. de epilepſia. Jenae. 4.
1687. Veſti (Juſt.) D. de epilepſia. Erford. 4.
1688. Hartenfels (Georg. Chr. Petr. a) D. de morbo comitiali. Erford. 4.
—— Link D. ſiſt. caſum aegri epileptici. Altorf. 4.
—— Schmidt (Franc. Joach.) D. de epilepſia. Lugdun. Batav. 4.
1689. Richard (Nicol.) et Phil. Caron, Ergo epilepſiae venarum jugularium ſectio. Pariſiis. 4.
1690. Albini (Bernard.) D. de epilepſia. Francofurt. ad Viadr. 4.
—— Berger (Jo. Gottfr. de), reſp. C. Etzler, D. de epilepſia. Viteberg. 4.
—— Camerarii (El. Rudolph.) D. ſiſt. catalepſin epilepticam. Tubing. 4.
—— Tiesma D. de epilepſia. Lugd. Batav. 4.
1691. Hartenfels (Georg. Chr. Petr. a) D. de morbo herculeo ſive epilepſia. Erford. 4.
1692. Briſſeau (Pierre) Traité des mouvemens ſympathiques, avec explication des ceux, qui arrivent dans le vertige, l'epilepſie, l'affection hypochondriaque et la paſſion hyſterique. à Montpellier. 12.
—— Fitzmann (Jo.) D. de epilepſia. Utrecht. 4.
—— Meyer (Marc. de) D. de epilepſia. Utrecht. 4. (an idem cum praecedente?)
1693. Gaulken (Chriſt.) D. de morbo caduco, ſive der fallenden Sucht. Erford. 4.
—— Johnſton (Jo.) D. de motibus convulſivis et epilepſia infantum. Lugd. Batav. 4.
1695. Schaper (Jo. Ern.), reſp. H. M. Bartholomaei, D. de epilepſia. Roſtochii. 4.
—— Ejusd. Progr. (ad hanc diſſert.) de epilepſia. ibid. 4.
—— Stern (H) D. ſiſt. de epilepſia caſum reſolutum. Lugd. Batav. 4.
1696. Slevogt (Jo. Hadrian.) D. de epilepſia infantili. Jenae. 4.
1697. Faber (Jo.) D. de epilepſia. Marburg. 4.

1697. Satler (D. G.) D. de epilepſia. Traject. ad Rhenum. 4.
—— Schmidt (J.) D. de epilepſia adultorum et infantum inſultis epilepticis. Lugdun. Batav. 4.
1698. Eikmeyer D. de epilepſia uterina. Ultraject. 4.
—— Eyſelii D. de epilepſia. Erford. 4.
1699. Bruno (Jac. Pancrat.) D. de epilepſia puerili. Altorf. 4.

* * *

1700. Johrenii (Jo. Conr.) D. de epilepſia. Francofurt. ad Viadr. 4.
1701. Hübner D. de epilepſia. Traject. ad Rhen. 4.
—— Winter D. de epilepſia. Rintelae. 4.
1702. Cole (Guil.) Conſilium aetiologicum de caſu quodam epileptico, quo reſpondetur Thomae Hobart. Londini. 8.
—— Vater (Chriſtian.) D. de morbo ſontico, olim ſacro dicto. Viteberg. 4.
1704. Freudenberg D. de maculis volaticis epilepſia comitatis. Gieſſae. 4.
—— Guillermet D. de epilepſia. Lugd. Batav. 4.
—— Moor (Barthol. de) Tract. de epilepſia et convulſionibus. Amſtelod.
1705. Erberfeld D. de epilepſia haereditaria caſum exhibens. Duisburg. 4.
1706. Hannemann D. de dolore capitis et epilepſia. Kiloniae. 4.
—— Lange (Chriſt. J.) D. de morbo caduco. Lipſiae. 4. recuſ. in Ej. Oper. omn. ed. Rivino. Lipſiae 1715. T. III. fol.
—— Woellner (Petr. Mich.) D. de epilepſia ejusque curatione medicamento ſpecifico eſſentia dulcis nominato. Lugdun. Batav. 4.
1707. Mercerii (J.) D. de epilepſia. Harderovici. 4.
1708. Scheidt (Jo. Valent.) D. de epilepſia verminoſa. Argentorati. 4.
—— Teucher (Sam.) D. de remediis antepilepticis aliis foſſilibus. Lipſ. 4.
—— Wedel (Georg. Wolfg.), reſp. J. H. Naſſe, D. de epilepſia. Jenae. 4.
1710. Henrici (H.), reſp. J. J. Kolb, D. de epilepſia. Halae. 4.
—— Rivini (Aug. Quirin.) D. de remediis antepilepticis terreis. Lipſiae. 4.
1711. Des D. J. F. Forlaſſe unſchätzbare Arzenei wider die Epilepſie, von 31 Perſonen bewährt gefunden; von D. L. L. B.
1712. Crauſe (Rud. Wilh.) D. de epilepſia. Jenae. 4.

1712.

1712. Crüger Epicriſis de naevis maternis et de epilepſia. Zittaviae. 8.
1713. Kornzweig D. de epilepſia ex terrore. Gieſſae. 4.
—— Diſcurſus de epilepſia, d. i. eine kurz zuſammengefaſste, jedoch ausführliche, Beſchreibung von der gröſseſten Krankheit der Epilepſie; von J. J. A. (ppel) M. (ed.) L. (icent.) und P. (ract.) zu C. (ahla.) Altenburg. 1713. 40 S. in 8.
1714. Zwinger (Theod.) D. de epilepſia. Baſileae. 4.
1718. Alberti (Mich.), reſp. J. E. Stahl, D. de epilepſia. Halae. 4.
1719. Wiele (van der) D. de epilepſia. Lugd. Batav. 4.
—— Wucherer, reſp. Welſch, D. de epilepſia. Jenae. 4.
1720. Buchwald (de) D. de epilepſia. Havniae. 4.
1722. Kriegel D. de epilepſia rotatoria. Lugd. Batav. 4.
1723. Colbatch (J.) Diſſertation concerning Misleto, a moſt wonderful ſpecifik remedy for the Cure of convulſive diſtempers. London. 8.
1724. Boretius (Matth. Ern.), reſp. J. G. Arnold, D. de epilepſia ex depreſſo cranio. Regiomonti. 4. recuſ. in Alb. ab Haller. Collect. Diſput. T. I. et in L. Crell's Auszüge. B. I. p. 78—87.
—— Frankenau (a) D. de morbo comitiali. Hayniae. 4.
1725. Cunningham (Alexand.) D. de epilepſia. Lugdun. Batav. 4.
—— Karcher D. de epilepſia. Argentorat. 4.
—— Vater (Abrah.) De ſpecificorum antepilepticorum ſigillatim olei animalis virtutibus hujusque virtute et efficacia in curanda epilepſia rationibus et experimentis confirmata. Viteberg.
1727. Fiſcher (Jo. Andr.) D. de convulſionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erford. 4.
—— Goelike (Andr. Ottom.) D. de epilepſiae conſenſualis ſingulari ſpecie. Francof. ad Viadr. 4.
—— Vrye (Theod. van) D. de epilepſia idiopathica. Lugdun. Batav. 4.
1730. Luther (C. F.), reſp. D. H. Höflich, D. de epilepſia. Kiloniae. 4.
—— Stahl (J. J.) D. de morbo caduco. Erford. 4.
1732. Hofmann (Fr.), reſp. C. G. Büttner, D. de vera mali epileptici cauſa. Halae. 4.
—— Porcinus (J.) D. de epilepſia. Lugd. Batav. 4.
—— Schacher (Polyc. Gottl.) D. de epilepſia ſimulata. Lipſiae. 4.

1734. Fries D. de morbo herculeo, vulgo epilepſia. Argentorat. 4.
1736. Behling, praeſ. J. J. Jantke, D. de epilepſia. Altorf. 4.
—— Hovii D. de epilepſia. Lugdun. Batav. 4.
—— Schulze D. exhibens reſolutionem caſus hyſterico - epileptici. Halae. 4.
1738. Fabricius (P. C.) D. de epilepſia ſaltatoria. Gieſſae. 4.
1740. Meibom (Brandan.), reſp. S. Buchholz, D. de epilepſia ſtomachica. Helmſtad. 4.
1741. Juch (H. M.), reſp. J. G. Hannimann, D. ſiſt. facillimam ac certiſſimam methodum curandi epilepſiam. Erford. 4. (pilulis balſamicis Stahlii.)
—— Junker (J.), reſp. A. ab Heimbach, D. de nova methodo curandi epilepſiam ſine ſpecificis. Halae. 4.
1742. Traité de l'epilepſie avec ſa deſcription, ſes differences, ſes cauſes etc. par Mſr. Pierre Breſcon. à Bourdeaux. 8.
1747. Doederlein (C. Z.) D. de epilepſia autocratia naturae curata. Altorf. 4.
—— Graeff (J. P.) D. de motibus epileptico - convulſivis herniae incarceratae ſupervenientibus per venaeſectionem ſublatis. Altorf. 4.
1748. Colbatch (Jo.) Abhandl. von dem Miſtel und deſſen Kraft wider die Epilepſie; a. d. Engl. Altenburg. 8.
1752. Rügemer D. de epilepſia. Wirceburg. 4.
—— Wiert (Cornel. van) D. de epilepſia. Trajecti ad Rhenum. 4.
1753. Pietſch (J. G.) Erklärte Urſachen und Cur der Fallſucht. Hamburg u. Leipzig. 8.
—— Watts D. de epilepſia. Lugdun. Batav. 4.
1754. Falk (Joh. Gottfr.) D. de epilepſia ſeu convulſivis virginum motibus. Gottingae. 4.
—— Roſén (Nicol.), reſp. Petr. Sundio, D. de epilepſia. Upſaliae. 4.
1756. Samſon (Petr.) D. de epilepſia et praecipuis ejusdem ſic dictis ſpecificis. Helmſtad. 4.
1757. Müller (Paul. Sam.) Convulſionum et epilepſiae infantum ex leviore dolore prodeuntium rationes medicae. Halae. 4.
1759. Orlovius (Andr. Jo.), reſp. Jo. Guil. Werner, D. ſiſt. obſervationes circa nonnulla remedia antepileptica uſitatiora. Regiomont. 4.

1761.

1761. Arcelin (Petr.) Quaeſt. medic. an epilepſiae rara venaeſectio? affirmat Lud. Gilb. Boyrot de Joncheres. Pariſiis. 4.

1762. Locher (Maxim.) Obſervationes practicae circa luem veneream, epilepſiam et maniam. Vindobon. 8.

1763. Junker (Frid. Chriſt.); reſp. Ein. Guil. Horn, D. ſiſt. raram epilepſiae ſpeciem. Halae. 4.

1764. Mangold Progr. de epilepſiae nonnullis ſpeciebus. Erfordiae. recuſ. in Ej. Opuſc. Tom. I. p. 49. Altenburg. 1767.

—— Caſes of the epilepſy, hyſteric fits and St. Vits dance, by J. Andree. London. 8.

—— Nunn (A.) D. de epilepſia uterina. Erford. 4.

—— Retenbacher (J.) D. de epilepſia. Lugd. Batav. 4.

—— Siegwart D. ſiſt. exemplum epileptici verminoſi non a vermibus epileptici. Tubingae. 4.

1765. Ahlefeld (J.), reſp. Jo. Andr. Schreiber, D. de epilepſia febrium intermittentium comite. Gieſſae. 4.

—— Traitement periodique de la Goute ou moyens d'adoucir les accés et gueriſon de l'epilepſie et des ecrouelles, par Mſr. Moncerbert. à Paris. 8.

—— Weſtphal (Andr.), reſp. Jo. Georg. Akermann, D. de epilepſiae et motuum convulſivorum infantum praecipuis cauſis. Gryphiae. 4.

1766. Hannes (C. R.) de puero epileptico foliis aurantiorum recentibus curato. Lipſiae. 4. recuſ. in E. Sandifort. Theſaur. Diſſertation. Vol. III. Lugd. Batav. 1778. p. 311.

—— Kortum D. de epilepſia. Duisburg. 4.

—— Pasquallati (Joſ. Bened.) D. de epilepſia. Vindobon. 4.

1768. Boehmer (Ph. Ad.), reſp. Jo. Ern. Stahl, D. de nonnullis momentis ad curationem epilepſiae ſpectantibus. Halae. 4.

—— Delius (Henr. Frid.), reſp. J. Ph. J. Rudolph, D. de uſtione cranii in epilepſia. Erlangae. 4.

—— Hirſchel (Leon Elias) Gedanken die Heilart der fallenden Sucht betreffend, nebſt einem Anhange von einigen gegen die Würmer dienlichen Mitteln. Berlin. 8. 2te Auflage. Berlin. 1770. 3te Auflage. Mietau. 1774.

1770.

1770. Diſſertation ſur les parties ſenſibles du corps animal, ſuivie d'une memoiree ſur les avantages, que procurent les frictions mercurielles dans le traitement de quelques epilepſies idiopathiques; par Mſr. E. J. P. Houſſet. à Lauſanne. 8.

— Gordack Geſchichte der Krankheit und Cur eines 27 Jahre mit der Epilepſie geplagten Frauenzimmers. Königsberg. 8.

— Tiſſot (S. A. D.) Traité de l'epilepſie. à Lauſanne et Paris. 8. recuſ. in Ej. Traité des Nerfs et leurs maladies. T. III. à Basle. 1779. Ackermanni Verſ. german. T. III. Leipz. 1782. Sämmtl. Schriften. Th. V.

1771. Baldinger (Ern. Gottfr.) D. de epilepſia ex tumore durae matris ſcirrhoſo et carie cranii. Jenae. 1771. 4. recuſ. in Waiz. Auszüg. B. VI. n. 7.

— Loof (Jul. Aug.) Hiſtoria epilepſiae foliis aurantiorum ſanatae. Groningae.

— Roſen (Eberh.), reſp. Paul. Bånge, D. de ſanatione epilepſiae per imminutum vitium irritabilitatis nervorum. Londini Gothorum. 4.

— Tiſſot (S. A. T.) Abhandl. von der Epilepſie; a. d. Franz. überſ. v. Krünitz. Berlin. 8. Leipzig. 1773. 1778.

1772. Practical eſſays upon intermitting fevers, dropſy, diſeaſes of the liver, the epilepſy, the colic, dyſenterial fluxes etc. by Dan. Lyſons. Bath. 8. german. verſ. prodiit Lipſiae. 1774. 8.

— Eſſay on epilepſy, in which a new theory of that diſeaſe is attempted, from which the proximate cauſe is inveſtigated and indications brought from thence ſhewing clearly the conſiſtency of the method of cure; by W. Threlful, M. D. London. 8.

1774. Leveling (Henr. Palmat.) D. de cranio militis quondam venerei poſtea epileptici tandem apoplectici defuncti. Ingolſtad. 4. cum Tab. aen.

1776. Gehler (Jo. Car.), reſp. Jo. Gotth. Gutſch, D. de eclampſia parturientium gravi morbo quidem neque adeo funeſto. Sectio prior pathologica. Lipſiae. 4.

— Hofmann (Franc. Ant.) D. de epilepſia. Vindobonae. 4.

1777. Gehler (Jo. Car.), reſp. C. A. Geriſcher, D. de eclampſia parturientium. Sectio poſterior therapeutica. Lipſiae. 4.

1780.

1780. Siegwart (J. A.), reſp. J. A. Rueff, D. ſiſt. caſum puellae poſt menſium ſuppreſſionem epilepticae et poſtea, ſub fluxu earum difficili, hyſtericae, cum epicriſi. Tubingae. 4.

—— Tournay (J. A.), reſp. J. F. Holandre, D. de epilepſia. Nanceyae. 4. epitom. in C. G. Gruner's neueſt. kritiſch. Nachr. v. klein. mediz. Schrift. Th. I. Jenae. 1788. p. 18.

1781. Brown (Tipping.) D. de epilepſia. Edinburg. 4.

—— Cappel (L.) D. de epilepſia ex tumore nervo vago inhaerente. Helmſtad. 4.

—— Perfect (W.) Caſes of inſanity, epilepſy etc. London. 8.

—— Turpin (Phil.) D. de epilepſia. Edinburg. 4. recuſ. in Car. Webſter Syſtem. medic. pract. T. II. p. 147.

1783. Melleret D. de epilepſia. Monspeliae. 4.

—— Münch (J. H.) Obſervation. practicae circa uſum Belladonnae in melancholia, mania et epilepſia. Gottingae. 8.

1786. Brückmann (C. P.) Enarratio Choreae S. Viti et epilepſiae, quae per fontes medicatas et thermas Embſenſes curatae ſunt. Francof. 8.

—— Gay D. de epilepſia. Edinburg. 4. german. verſ. in Heinr. Tabor's Auszüg. a. d. beſten engl. mediz. Streitſchriften. B. I. Heidelberg. 1792.

1787. Millar (Franc. Xaver.) D. de medicamentis antepilepticis. Argentorati. 4.

—— Raümert (Car. Benj. Andr.), praeſ. P. J. Hartmann, D. ſiſt. varias epilepſiae medendi methodos. Francofurt. ad Viadr. 4.

1788. Henning (Frid.), praeſ. Car. Frid. Rehfeldt, D. ſiſt. Analecta hiſtorica ad theoriam epilepſiae. Gryphiswaldiae. 4.

—— Mithof (Hect. Burch.) D. de ſede irritamenti in epilepſia, adſperſis practicis analectis. Gotting. 4.

—— Rehfeldt (Car. Frid.) Progr. (ad Diſſ. meam) morbi ſingularis epileptico-cataleptici opio potiſſimum ſanati hiſtoriam exhibens. Gryphiae. 4.

1791. Douglaſs (Adam.) D. de epilepſia. Edinburg.

1792. Feurſtein (Jo. Henr.) D. de epilepſia. Gottingae. 4.

—— Maurer (Fr. Guil.) Comm. de medicamentis antepilepticis. Marburg. 8.

1793. Rumpelt (Car. Aug. Ferd.), praeſ. C. C. Krauſe, D. ſiſt. pathologiam epilepſiae. Lipſiae. 4.

1795. Berger (Franc.) D. de remediis in epilepſia uſitatis. Francofurt. ad Viadr. 8.

1796. Nürettein (François Tolyot de) Obſervations nouvelles ſur la Surdité, la cécité, l'epilepſie, l'apoplexie, ſuivies d'un nouveau regime propre à ces differentes maladies. Paris, l'An. III. de la republique. 8. Verſ. germanica jam promiſſa a libraria Raſpiana (Norimbergenſi). v. Intell. Bl. d. Allg. Litt. Ztg. 1797. n. 79.

1797. De l'Epilepſie en general et particulierement de celle, determinée par des cauſes morales par J. L. Doullin-Dubreuil. à Paris. 8.

Additamentum.

Loco terminorum, in Append. I. p. 72—91. ſaepius occurrentium „*epileptico-furioſis, epileptico-fatuis*" rectius legitur: *epileptico-maniacis, epileptico-melancholicis.*